



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6159/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6159/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6159/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6159/A/1

C.E. RAPPAPORT
LIBRAIRIE ANCIENNE
ROME

373

6159

A/1

L. XXXIII

E.

59

9/1

27092

17/10/11

C.E.
LIBRA
R

PH

COA

BI

di

M

C

In

AP

PHARMA-

COPOEAE, IACO-

BI SYLVII MEDI-

ci Libri tres, his, qui artem

Medicam, & Pharma-

copoeā tractant exer-

cētque, maximè

necessarij.

INDICE copiosissimo, quo quidem
hucusq; caruit, adiecto.

REM MAXIMAM SIBI




PROMITTIT PRUDENTIA.

LVGDVNI,

APVD GVLIEL. ROVILLIVM.

M. D. XLVIII.





V T RECTE est uete-
 rum sermone celebrata
 sententia. Quam quis-
 que nouit artem, hanc
 exerceat unā atque ex-
 colat, & totus in ea uer-
 setur, sic rectè nūc pro-
 nuntiari posse mihi persuadeo, quā quisque exer-
 cere artem constituit, hanc accurate prius perno-
 scat. Id quod si hodie diligentius obseruarent ho-
 mines, non tam multi repente fierent medici, nul-
 lādum medicinae parte illis probè peruestigata,
 nullius adhuc morbi curatione apud praeceptores
 obseruata. Cum tamen esset è re ipsorum: sed ma-
 gis etiam aegrorum, si nullum omnino affectum su-
 sciperent curandum, quem non antè obseruassent
 à praeceptoribus curatum. Quam rectè cū aegris
 ageretur, si hac etate qui medicinam faciunt,
 si essent antè sub praeceptoribus institui affectus
 cognoscere, illis occurrere, futura prænuntiare.
 Non mediūsfidius per hominum mortes, experi-
 menta sic agerent imperiti adhuc, & rerū omniū
 suarum rudes medici: tam quæstus auidi, ut quid
 eos deceat ignorent, quid famam perstringat ne-
 sciant, ut interim animæ detrimentum taceam.

Vbi enim medicas nescio quas præceptiunculas
 memoria didicerint, ac medicamentorum certas
 quasdam scripturas, se medicos profitentur. Illis
 est satis scire antidotū, catholicum uerbi gratia,
 humorum omnium redundantiam uacuare, cum
 ignorent, quibus, & quanta singulorum mensura
 constet, quæ singulorū sit facultas, quæ horū cum
 illis sic mistorū: eademque in cæteris medicamen-
 tis cōposuis utuntur, ignoratiæ impostura. Quid
 per deum immortalē hoc hominis portēto, se me-
 dicum mētiente, est reipublicæ pestilentius? quod
 nota censoria dignū magis est facinus? Cur leges
 cessatis in hos carnifices, ut meriti sunt, animad-
 uertere? An nondum extant quæ hanc capitalem
 inscitiam puniant, & nouo uindictæ exēplo coër-
 ceant? aut si hæc peccādi licentia impune permit-
 titur, cur non modo ex typographorū prælis, sed
 omni omnium hominū ordine in medicinam non
 conuolatur? Sed Deus optime maximē nobis lar-
 gire meliora, & indoctis his carnificibus ignoran-
 tiæ suæ consciētiam oppone, ut facinorū tam indi-
 gnorum pænitiētia confusi, in ordinē suum redigā-
 tur. Iam ab hac arena explosis circulatoribus
 istis, rem medicā sincerē tractaturo nō soli phar-
 macopæo necessariā esse hanc medicinæ partem
 quæ simplicia deligit, ad compositionē præparat,
 & denique fæliciter cōmiscet, docere aggredior.

si

5
si enim pharmacopœi fides tibi suspecta est, ue-
lisque ob id ipsi simplicia deligenti, præparati, mi-
scenti, adesse, quid ex hoc studio emolumentum conse-
quere, nisi hæc tu ut ille pernoscas? imò quam tibi
infamiae notam imprudens inuris, dum ignarus ho-
rum simplicium medicamentorum, tanquam asinus
quidam ad omnia eius rogata auribus motis uelut
annuis. Quid quod tibi sæpe etiã uolens pharma-
copœus illudit, & mea sententia iustissimè, dum co-
ryli nucamentum pro pipere longo ostentat, dum
centaurij magni radicem pro rha pontico, dum
acorum palustrem nostrum pro Indico & uerò por-
rigit, sed uitia hæc tolerabilia sunt. Pro Hellebo-
ro autem nigro, Arabum napellum, aconiti genus
quibusdam, hodie propè ab omnibus pharmacopœis
substitui quis ferat? an non communis est utrique
medicorum & aromaticorum ordini ignorantia &
culpa? Venia dignior est impostura, cum aristo-
lochiam clematitum nobis frequentem pro duabus
alijs rarioribus supponunt: indignior cum scammo-
nium crudum pro cocto miscent, aut largius quam
scriptura medicamenti postulet, medicamentis im-
miscent, aut etiã cum alicuius ex tithymalis lac
miscent pro scammonio. Quæ errata ceteraque
omnia in medicamentorum mistione committi soli-
ta si uellem persequi, longior Iliade nostra proce-
deret oratio. At ut donec medico ad componen-

dum nihil opus esse diligenti ista in simplicibus
 medicamentis deligendis, parandis, & miscendis
 exercitatione, iam pharmacopæo commissa: ad
 pernoscendum autem compositi uires, omnia hæc
 illi ad unguem sunt pernoscenda: si enim unius sim-
 plicis improbitas totam sæpè cōpositionē uitiat,
 ut abundè in methodo medicamenta cōponendi
 docuimus, an parui esse tibi debet singulorū sim-
 plicium delectus, si item præparationis ratio sim-
 plicium uires auget, minuit, abolet, nouas acqui-
 rit, ut libro secundo explicauimus: quā tu horum
 ignarus facultatem toti medicamēto tribues? Si
 denique mistionis modus ex eadem materia un-
 guentum, ceratum, emplastrum efficiat an tibi
 est negligendus? Crede mihi absurdissimus est, ac
 sæpè ridiculus, qui medicinam facit, harū rerum
 ignarus, non dico quoties medici imperiū enume-
 rata simplicium turba subscribāt, fiat emplastrū,
 uel aliud, cum tamen ad hanc medicamenti for-
 mam scripta illa simplicia nunquā ueniant. Quæ
 res medicum pharmacopæo ignorantiæ suspectum
 meritò reddit. Præterea multos me uidisse tam
 barum rerū imperitos, ut cum in officinas diuer-
 tißent pharmacopæorū, non modo simplicia usu
 ipsis quotidiano celebrata non agnouisse, sed ne-
 que composita medicamēta illis propè continen-
 ter in ore & calamo uersata nouisse mollia ne
 esse

essent, an solida, an non, id est ignorantia rerum
 maximè necessariarum crassissima? Quam ne
 exuant plerique à medici dignitate alienum pu-
 tant in medicamentarias officinas diuertere, ibi
 aliquādiu sedere, quæ cōponuntur obseruare, quæ
 consuetudo, ut in Gallia Narbonēsi est antiquis-
 sima, utinam hīc saltem nunc inciperet ac proce-
 deret, spectarent medici quā fœdè frequēter la-
 buntur ob compositorum iniquitatē, & fortasse
 sua dignitate, si sciētia id minimè possent sua, in-
 doctos, aut improbos pharmacopæos à parua cō-
 positione deterrent. Hæc prolixius à me scri-
 pta quàm rei natura postulet, fortasse ineptus
 aliquis calumniabitur: cū tamen res ipsa lon-
 gissimam efflagitet orationem, quæ profligata
 multorum ignorantia, omnes medici nomine di-
 gnandos in id studium impellere posset, ne post-
 hac esset accusationi locus. Faxit Deus, ut quis-
 que quam exercet artem pernoscat, & medicus
 nihil eorum ignoret, quæ ad morbos citò & tutò
 curandos utilia, uel necessaria esse consueuerunt.
 Porro medicū omnia hæc intelligere oportet, nō
 ut in opus pharmacopæorum euadat (nisi si quan-
 do horum desyderio cogatur aliquid huius artis
 moliri) sed ut componenti pharmacopæo possit
 non modò adesse, sed etiam præesse, nec huius
 discipline ignarus quotidie describat simplicia

quæ in emplastrum cogi iubeat, cum ex his quid-
uis potius quàm emplastrum perfici queat, quo-
modo cum amphora cæpit formari, currente ro-
ta cur urceus exit?

*Viue, uale lector, siquid scis rectius istis,
Candidus imperti: si non, his utere gratus.*

DE PHARMACOPOEI
officio.

QUANTUM plurima cum medico
habet cõmunia pharmacopæus, pruden-
tiam natura insitam, medicamentorum absolutam
cognitionem, diligentiam in his omnibus quæ
suarum sunt partium maximam, probitatem: ta-
men non pauca ipsi propemodum propria uiden-
tur, quæ tamen aliquando & medicorum fuerunt
cum ipsi medicamenta parabant, id quod Gale-
num fecisse passim scripta ipsius loquuntur. Eius
generis sunt medicamentorum delectus, ratione
& experientia summa quæ sitis: deinde seruandi
hæc modus, & tempus quo uigent, aut iam uiri-
bus effæta sunt ac exanimata. Item qua ratione
unumquodque sit utendum, siue illud ipsum per
se, siue cum alijs coquendo & terendo, uel alia ra-
tione preparando. Sit prætereà doctus gramma-
ticam, ut compositiones ueterum, & scripturas
med

medicorum quotidianas intelligat, in quibus si
 quid interdum hi scripserint largius aut parcius,
 aut ingratius quam ægro huic competere conie-
 ctet pharmacopæus, medicum amicè admoneat.
 Volumus præterea pharmacopæum artē omnē
 medicamenta deligendi, præparandi, & compo-
 nendi callere, cultu mediocri contentum, bila-
 rem, facetum, diligentem in rem ægrorum: non
 avarum, non libidinosum, non ebriosum, non con-
 tentiosum. Quæ iterum illi cum medico sunt cō-
 munia, ut Hippocrates docuit libro de medici
 officio. Quibus animi & corporis, & fortune do-
 tibus si præditus erit pharmacopæus, nihil incon-
 sulto medico perito, cuiquam propinabit, præfer-
 tim magnarum uirium, sed neque quantūuis par-
 uarum, cum horum uires nesciat: & plerunque
 auxilia, hæc quamuis, ut uidetur, imbecilla, ta-
 men quantitate, qualitate, tempore insalubria,
 magnorum sæpè morborum sunt occasio, & legi-
 timam curandi rationem peruertunt, dum sub
 his curatum corpus remedia iam maiora, sed ido-
 nea non feret. Nihil etiam uel amore, uel odio,
 uel metu, uel pretio, uel ignorantia peccabit: ne-
 que uenena abortum facientia, exoleta, adulte-
 rina, aut suppositiua unquam exhibebit: sed me-
 dicum doctum consulet quodnam simplex, aut
 compositum illius pænuria uolet substitui. Non

augebit medicamento alicuius ualentis quanti-
 tatem, ut uacuatione hinc largiore sequita di-
 catur medicamenta habere præstantiora. Quam
 uellem huius ætatis pharmacopæos ad hanc se
 uelut canonem conformare, & medicos ad suum:
 Non esset cur hodie tam neglecta iaceret medi-
 cina, etiam multorum probris lacerata. Deum
 optimum maximum supplex oro, & obtestor, ut
 aliquando id studium in mentes medicorum &
 pharmacopæorū immittat, ut esse quisque quàm
 uideri aut dici malit optimus, uel medicus, uel
 pharmacopæus. Quod si diuinam illam gratiam
 neglexerint, faxit Deus, ut regia censura in
 eos aliquando animaduertatur, qui ar-
 tem prius exercent quàm pernoue-
 rint, hominum corpori tam sa-
 lubrem, cùm rectè obitur:
 tam insalubrè & per-
 niciosam, cùm in-
 scienter tra-
 ctatur.

DE MEDICA-
MENTORVM SIM-
PLICIVM DELECTV
RITE FACIENDO,
LIBER PRI-
MVS.



vos tres libros his
mensibus proximis
sum pollicitus ad mo-
dū rectè medicamen-
ta componendi perti-
nentes, præstare ag-
gredior. Primum sci-
licet, de accurato me-

dicamentorum simplicium delectu: Alte-
rum de legitima ipsorum præparatione:
Postremum, de modo miscendi medicamē-
ta componi idonea. Quod verò ad primum
laborem mihi propositum attinet, quan-
quam rectè à Mesuæ tradita est methodus
medicamenta purgātia deligēdi, & quam fa-
cilè ad alia quoque medicamēta deligenda
transferre possit lector non indoctus: tamē
paucis visum mihi est eā methodū illustra-
re, & planiorem reddere locis aliquot com-
munibus, à Mesue post Dioscoridē, & Gale-
num obseruatis, nostro autem cōmentario
lat

latius effusis : quanquam & à me non pauca in hanc rem sunt dicta initio methodi medicamenta componendi : sed tamen quæ nunc trademus, neque bis dicta, neque ociosa facile intelliges, si ea legeris attentius. Delectus itaque medicamentorum simplicium, ut aliarum rerum plurimarum præcipuæ sumitur ab ipsorum substantia, quantitate, qualitate, actione, situ, & tempore. Quædam enim ipsorum præstantiora sunt, si crassæ sint substantiæ: alia, tenuis: nonnulla, densæ: alia, raræ. Sunt quæ magis leuitas commendet, quædam grauitas. Nec desunt quæ friabilia magis probamus, alia fractu & pulueratu contumacia. Adhæc glutinosa quædam, alia fluxilia. Aspera item nonnulla præponimus, alia læuia. Postremò hæc mollia aliis præstantiora, illa verò dura iudicamus. Hæc enim propria qualitatum tactilium nomina substantiæ per se incomprehensibili & indicibili tribuuntur, quòd eius crassamentum & ex elementis mixtionem primæ sequuntur, & omnium post sapes (qui etiam ad has referri possunt, cum gustatus quoq; Aristoteli & Galeno quidam tactus sit) maximè demonstrant. Ad eandem plenius declarandam non leuiter conferunt sinceritas, impuritas: hepatis, ferri, aliarumq; rerum nobis notarum, in substantia similitudo. Prætereà substantiæ
tri

triplicis in vnoquoque, si obseruari queat, copia, penuria, mediocritas.

Quid autem hæc nomina qualitatum tæctricum medico significant, licet abundè sit explicatum libro secundo nostræ methodi medicamenta componendi, hoc loco tamè paucis perstringere non fuerit alienum.

Crassum seu *παχυμερὲς*, quod ægrè in te *Lib. 10.*
nues partes comminui potest. *simp. ca. 3.*

Tenue seu *λεπτομερὲς*, quod facilè in partes tenues comminui potest, quod in ficcis significat in puluerem tenuissimū: in liquidis verò, quod pròptè latius se spargit, & corpus quaquauersum citò imbuat, ipsumq; velut vanescit, vt aqua vitæ, oleum terebintinæ, & oleum ipsum aquæ colatum.

Densum proprie quod poros, id est meatus, paruos per se totum habet.

Rarum propriè quod poros per se totum *Lib. 2.*
habet magnos.

Densum per metaphoram & abusiue est *sanit.*
coactum in se, vt aqua, terra. Rarū verò est *tuende.*
laxū, vt ignis, aër, quanquam hæc elementa sint vnita, & ex similaribus natura, partibus consent, nec vllos tales poros habeant.

Graue quod mole exigua, pondus magnum exhibet nobis, vel stateris, qualia sunt aquea, terrea præsertim densa.

Leue quod mole etiam magna pondus
ex

Lib. II.
Meth.

exiguum præstat nobis, vel stateris: vt igneū & aëreū corpus, præsertim rarum. Aqua autē quæ cito calefit aut refrigeratur, Hippocrati leuissima dicitur: non tantum propriè vt definiuimus, sed etiam per abusum, quod hippochondriis non sit grauis, nec in his diu immoretur ob essentiæ tenuitatem: quæ facit vt cito alteretur, promptè in corpus distribuatur.

Lib. 7.
Meth. in melle.

Γαιόχερρ, id est, lentū & glutinosum in solidis corporibus quod fractu est contumax, humore partes terreas glutinante multò, & tētioni cedētē, vt in sparto, salice, coris, tendonibus, ligamētis, quæ tusa latefcūt magis. Friabile quod promptè friatur, & in puluerem abit, etiam digitorum compressu, vt amyllum, cerussa, caphura.

Lib. XI.
Meth.

Lentum autem in humidis est quicquid ægrè dissolubile adhæret, seu quod dū trahitur, aut digito vel alio tollitur, continuitatē longissimè seruat: non intercisum, nec abruptum, vt oleum, mel, adipēs, pituita.

Ἐνζῶνικερρ, id est, detergēs, quod tantū abest vt adhæreat, vt etiam quæ adhærent detergeat. Alibi autem in Methodo, ipsi glutinoso in humidis opponit Galenus fluxile & liquidum. Asperum non solum tactu inæquale, sed etiā gustatu partes inæqualiter siccans, cōtrahens, humore terreo integens: qu

quale acerbum, austerū, lene, lubricum, & æquale, in humidis verò quod linguæ, faucium, asperæ arteriæ, dētiū inæqualitatem corrigit, vel replendo, vel modice tergēdo, & laxando: quale dulce & vñctuosum.

Molle quod cedit nostræ carni, Durū cui cedit nostra caro. De vtroque plura libr. 2. sanit. tuendæ, & lib. 5. simp. cap. 4.

Ad crassum reducitur terreū, lapidosum, arenosum, astringens, opacum, crudum.

Ad tenue, aëreum, igneum, coctum, vstū, amarum, acre, perlucidum.

Ad densum, solidum, coactum, compactum, vnitum.

Ad rarum, laxum, fungosum, solutum.

Ad graue, plenum, distentū: & si vis densum, succulentum, bene habitum, probè nutritum.

Ad leue, inane, foraminulentum, fungosum, rugosum: & si vis rarum, exuccum, emaciatum, marcidum.

Ad glutinosum, pingue, gummosum, resinum, mucosum, tenax, sibi fluendo continuum.

Ad fluxile, liquidum, pinguis expers.

Ad læue seu lene & politū, vel foris tantum enode, spinis carens, depile, vel etiam intus, æquale, sibi vbique simile, homœomeres, ac simulare.

Ad

Ad asperum foris, spinis armatum, & his
lōgis, breuibus, rectis, hamatis: hirsutū, lanu-
ginosum, muscosū, capillarū. Vel etiā intus
inæquale sibi, partibus quibusdā dissimile,
anomœe mores ac dissimulare, grumosum.

Ad molle, tenerum, carnosum, succosum,
fungosum, mucosum, pingue, lētum, & viti-
lium coriiq̃ue modo flexile, humidum.

Ad durum, firmum, osseum, lapidosum, li-
gnosum, exuccum, solidum, aridum, friabile,
rigidum, inflexile, fractu contumax, vege-
tum, adamantinum, refertur.

Secundo loco cum quantitas sit duplex
multitudo & magnitudo, ab vtraque notæ
etiam sumuntur: quibus intenti, hoc eligi-
mus, illud reiicimus. Numerus enim singu-
laris, dualis, multiplex, vel aliter pluralis, ra-
dices, stipites, ramos, folia, flores, fructus, se-
mina, cortices, & reliquas plantarum partes,
atque adeò plantas totas, vel optatiores red-
dit, vel contemptiores ac minus salubres,
quod in colocynthide planta & fructu, &
aliis quibusdam rectè Mesues commemora-
uit, & in multorum aliorū delectu clarè ap-
paret, tum ex nostris simplicibus, tum ex hoc
lib. i. Pharmacopœiæ.

Magnitudo autem latius patet, non mo-
dò quia magis ad deligendum pertinet, sed
quia eius nomine interdum sola longitudo
ven

venit: vt Aph. vlt. lib. 2. Potest etiam latitudo sola intelligi, vel etiam sola profunditas: nonnunquam longitudo simul & latitudo, vel longitudo & profunditas, vel latitudo & profunditas, vel tria simul: quo significatu ferè accipimus. Huc pertinet, quod in horum singulis contrarietas est, ratioq; maioris & minoris in infinitum extenditur. & longum, breue, latum, angustum, profundum, elatum, symmetrio sui generis collatum, aliud magis & minus alio dicitur, idque paulò vel multò magis vel minus. Et inter hæc contraria, præter dicta, est mediocritas quædam indiuisibilis, alia maioris & minoris ratione diuidua.

Ad huius loci communis vastitatem pertinent nomina mēsurarum nobis notarum, digiti, & eius parui, maximi, medii, pollicis, palmi, dodrantis, pedis, cubiti, & aliorum plurimorum. Hinc dicimus deligendum hoc illud vel fugiendum, quod magnum est, enorme, procerum, vastum, corpulentum, bene habitum, exiguum, gracile, strigosum, rugosum, marcidum, (nam hæc etiam quantitatem consignant (& item quod est præditum magnitudine digiti, pollicis humani, manus, palmi, dodrantis, pedis, semipedis, dimidii cubiti, cubiti vnus, duorum, trium, quatuor, quinque, seu digitali, pollicari, dodrantali,

b

pedali, semipedali, bipedali, tripedali, cubitali, bicubitali, tricubitali. In quo sermonis genere magnitudo lōgitudinē potius declarat, quanquā crassitiē & profunditatē significare possit: quarū alterutra dum nobis apertius significanda est, exprimitur, vt humani digiti, parui, indicis, pollicis, cubiti, baculi, vnus, duorum, &c. vel digitali pollicari, cubitali, &c. crassitie vel lōgitudine. Id quod in profunditate similiter facimus frequenter, vtranque dimensionem crassitie vel nominē comprehendimus, dicentes, hoc tunc esse vsui, quando est crassitie digiti, pollicis, cubiti, baculi. Est quando altitudo quoque exprimitur, vt pro tensorum vtrunque hominis brachiorum altitudine est Solanum manicon Dios. & phœnix herba sedigitalis seu senum digitorum.

Eodē modo in contrariis, paruitate, breuitate, angustia & gracilitate, maioris & minoris ratio exercenda est.

Ex loco enim fertili plantæ & animalia, auctiora & pulchriora euadunt: eadem ob id vel deligenda vel interdum fugienda. Scillam nanque enormem (qualis terra feraci prouenit) Galenus damnat: improbat & strigosam flacidamque: bene habitam verò, & magnitudine mediocrem commendat.

Qui autem locus communis in qualitate est,

est, notarum ad deligēda medicamēta neces-
sariū est foccūdisimus. Hinc probamus aut
improbamus medicamentū hoc, illud: cali-
dum, frigidū: humidū, siccū: principio, me-
dio, fine: ordinis primi, secūdi, tertii, quarti.
Ad hæc, hac vel illa præditum facultate, se-
cunda, tertia, & sapore, odore, colore, has
qualitates primas consequentibus.

Sapore quidem vel nullo apparente, seu
aqueo & fatuo, vel gustum astringente, seu
acerbo austerōve vel acido, vel dulci, vel
unctuoso, vel nitroso seu salso, vel amaro,
vel acri (ad quē feruidus linguam erodens,
causticus, id est, vrens reducitur: vt ad dulce
melleus, suavis, iucūdu) vel ex horum qui-
busdam misto vt vinoso, medicato, vel rei
alicuius notæ vnicū saporem, & ob id insi-
gnem, sed fere inexplicabilē nactæ, vt sapo-
re aloës, piperis: hoc illud est præstātius, vel
deterius. Sed dum sapore medicamenta ex-
ploras, præsertim acria, aromatica, amara,
falsa, ne gusta eodem tēpore multa, vt non
tibi imponat gustatoria qualitas linguæ ab
his tradita: quam tamē aqua pura gargariza-
ta, aut papyrus mansa delere putatur.

Odore verò, iucundo, suauī, bono, ingra. *Gal. lib. de*
to, fædo, terro, acerbo, austero, acido (tot *nat. boni.*
enim sunt differētiæ odorū, quot saporum,
sed nominibus non designatæ) odore item

croci, bituminis, cucumeris, vel alterius cogniti, & odore eximio præditi, sed indicibili, & qui in ullam prædictarum differentiam rectè conferri possit. Sic odore vinoso, aromatico, medicato, illud hoc commendante, iucundo. Hoc illud esse debet, nõ debet hoc grauitè odoratu, halitu, terram, hircum, picem, resinam pineam, bitumen, olente, viroso, aspero, est melius vel peius.

Colore denique nullo insigni, vel albo pallido, rufo, flauo, rubro, viridi, liuido, nigro, vel horum medio, vnde hoc illud λευκόν, ὑπ᾽ ἄχρον, ὑπὸ πίρρον, ὑπὸ ξανθόν & similia Græcis dicuntur, vt latinis subalbum, suppalidum, subrufum, subflauum vel albicans, pallescens, rubescens, flauescens, vel in album, pallidum, rufum, flauum, inclinans (vel ex horum quibusdā misto, vnde χρυσᾶχρον, ὠχρὸ πίρρον, ὠχρὸ ξανθόν, πίρρὸ ξανθόν & similia Græcis sæpè dicuntur: nobis ex albo pallidum, ex pallido rufum, vel in pallido flauum, ex rufo pallidum, vel pallidum in rufum, inclinans, vel cum rubore albescens, cinereus, ad ceruleum vergens, & similia. Sed id illustrius apparet in semotis coloribus quàm natura propinquis, hunc verò naturæ in coloribus propinquitatē ordo nobis Galenum lib. 1. cris. sequutis seruatus ostendit. Albo enim pallidus vt situ hic est proxim⁹, sic

Colorum
differetia
& in his
do gal. lib.
1. Criseon.

fic natura & aliis similiter.

Ad album verò reducitur color lacteus, niueus, fulgore & nitore alabaſtri.

Ad pallidum, cinereus, plumbeus, buxeus.

Ad rufum, melinus. i. mali cydonii, fuluus, rutilus, igneus.

Ad flauum, aureus, luteus, croceus, diluti, aquæ croci color.

Ad rubrum, roſeus, ſanguineus, puniceus, purpureus, vermiculus.

Ad viridem, herbaceus.

Ad liuidum cæruleus, glaucus, cæſius nō nullis dictus, ferrugineus, & interdum cinereus, plumbeus, buxeus, hæc enim ambigunt vt in ſuis in artem medicam Galeni commentariis apertè demōſtrat Martin⁹ Akakia medicus longè doctiſſimus.

Ad nigrum tenebroſus, opacus, terreus, bituminosus, fuliginosus.

A figura quoq; nō leuis eſt ad medicamēti delectū cōiectura, quòd hæc ſint vt tēda vel vitāda, quæ figura ſunt elegāti, ſpecioſa, circinata ſeu rotunda & circulari, trigonia ſeu triquetra & triangula, quadrata, quadrangula, multangula, mucronata ſeu acuta, obtuſa, recta, obliqua, tranſuerſa, ſolida, fiſtuſoſa, ſpōgioſa, multifida. Alia item figura, forma, ſpecie, aſpectu, effigie, imagine, modo, ritu, oculi, oculi bubuli, capitis taurini, cornu

caprini, caudæ scorpionis, pulicis, ricini animalis, vitulinæ naris, citrorum polypi piscis, testiculorum canis, vel alterius, capillorum, linguæ, linguæ bubulæ, auriū muris, delphini, pennarum auis, geniculata raro, crebro fructicosa, iuncea, tuberosa, bulbosa, fibrosa, capaxa, pomi, pyri, cotonei, glandis, oliuæ.

Horum autem vel omnium vel plurimorum exempla postea leges frequentissima in particularium delectu, & in notis à similitudine sumendis.

Probantur præterea aut reprobantur nunc similia, nunc dissimilia, vel inter se, & in aliqua plantarum specie, ut absinthium ponticum sit simile santonico: abrotonum mas, dissimile foeminæ.

Vt in aliquo genere superiore propinquo sumitur similitudo aut dissimilitudo qualitatum quarūdam prædictarum, atque aded substantiæ & quantitatis, & actionis, ut in herbarum genere, absinthium seraphium est deligendum simile abrotano, sapore amaro, & foliorum habitu: vel in toto plantarum genere, ut chamædrys, carnepitys herbe sunt similes quercui, pinui arboribus. Vel in genere diuerso, ut aloë optima sit similis hepatis: ascyri folium cribri modo foraminu lentum, ambitu serratum viticæ foliū, illud

in

in arcum flectitur, vel anchoræ modo est, vel crescentis lunæ ritu incuruum: venenosum, gibbosum, dorso, elato: galeri, petasi, pileoli, lanceæ, lanceæ cuspidis, cultelli, securis, acetabuli, vasculi, calathi, disci, clypeoli, fusi, pali, clauæ, pistilli, iunci, festucarum, fœni, vitiliū modo formatū, inflexile, virgatum, velut lineis intersectū alarū cauis binis, pluribus, virgis arborescentibus specie capituli rotundi, verticillorum, pedū lecti, stellarum, tomentosa lanosaque pube obducitur dictamnium, bullæ in dipsaco spinosæ, flos comicis personis hiantibus similis, radice hoc esse debet crebro geniculata vel geniculis duobus tribus crebris dissecta, turbarum modo in se inuicem infartis radicibus, stipitibus cōdylorum modo tuberculis quibusdam excrecentibus.

Horum nihil negligendū est ei, qui probè velit medicamenta simplicia deligere, quibus singulis aliqua ex dictis insunt accommodatissima ad ipsa cognoscenda & deligenda non mediocriter pertinentia, quod exemplis, quam verbis pluribus probare maius erit operæ precium.

Quartò plantarum & aliorum simplicium medicamentorum delectus sumendus est à situ & loco, non modo generali & regione, vt castoriū sit ponticum, cuminum,

Aethiopicum, glycyrrhiza cretica, sed etiā à particulari, in singulis regionibus, loco nēpe calido, frigido, humido, sicco, horum medio. Plantæ enim calidæ in locis calidis valentiores euadunt: præhumidæ locis siccioribus castigantur. Quæ ratio in animalibus quoque recipienda est. Sub loco autem & cælum, & flatus ventorum comprehendas oportet. Ob id ad locum calidum reducimur apricum, æstiuum, inter tropicos aut proximè ipsos, insolatum, qui in meridiem sit apertus austro perfletur, montes habeat septentrionibus obiectos, vt Galenus docet in secessu Tabiarum.

Ad frigidum vmbrosus, nemorosus: arboribus, sepibus, & aliis stirpibus confertus, quercetis, frutetis, dumetis defensus, muscosus, saxosus, montosus, opacus: parietibus, arboribus vel aliis: & item polo alterutri proximus, in parte Alpium aut Pyrenei Septentrionem spectante situs, niuosus, glacialis, aquis niuosis & glacialibus riguus, borea & aquilonibus perflatus, soli aduersus obiectu montium.

Ad humidū, quod in aquis viuit aut versatur, & ipsis dulcibus, salis, fluentibus, torrentibus, pigris, rapidis, stagnantibus, paludosis, paludibus æstate siccatis, lacubus, radicans, sine radice innatans, aut prope aquas
eas

eadem & scatebras, fontes, canales, fluuio-
rum ostia alueos in conualle aquosa, loco
viliginoso, pratis, puteorū parietibus & mu-
ris aliis humentibus, saxis rofidis, stillicidiis,
fossis vrbium. Hinc fluuiales, marinæ, pra-
tenses, aquaticæ plantæ aliis sui generis alio
loco educatis præstantiores sunt, vel dete-
riores pro varia ipsarum natura, & expetita
nobis earundem facultate.

Ad siccum, editus, montosus, tumulosus,
cliuosus, saxosus, petrosus, scrupulosus, to-
phaceus, pumicosus, salebrofus, sabulosus, a-
renosus, argillaceus, præruptus, scopulosus,
promōtoris altus, asper, tenuis sterilis, per-
flatilis, in semitis, viis, itineribus, in aggeri-
bus viarum & murorum, in ruderibus, &
ruinis, aut circa ruinarum rudera, domus in
parietibus, muris, murorum crenis & minis,
in tectis recentibus, vetustis. Quanquā ho-
rum quædam aliquando humectata esse pos-
sunt, vt petrae littorales, testæ pilcium, qui-
bus muscus marinus innascitur.

Ad medium horum seu temperatum re-
ducitur locus regionū temperatarum, ver-
nus, & magna ex parte cāpestis, planus, pin-
guis, fœcundus, cultus: aruum, in segetibus,
tritico, hordeo, leguminibus, vinetis, hortis.

Ad locum item & situm connexio redu-
citur & vicinia. Plātæ enim maleficæ & ipsa

rum fructus sunt innocentiores, si multæ simul ex eodem loco venenosam, sed sibi familiarem substantiam trahant, & multi fructus malefici ex vna planta: ob id thymelæam, colocynthidem, scillā in loco aliquo solam rectè damnat Mesues, præfert quæ multas congeneres simul nutritas habet, & colocynthidis fructum si vnicus erit aut paucus improbat, numerosum præfert. Rationabile enim est, vt plantas benignas si pauce sint, vberiore succum benignum trahere, & ob id salubriores esse: sic maleficas venenosam loci malitiā exhaurire, & in se transferre: quem & largiorem & vehementiorem pauca, quàm multæ in se trahant necesse est. Sublimis quoque situs, infernus, dexter sinister, antiquus, posticus quidam est, sic misy, chalcitis, sory, situ diuersa, metallicam substantiam indicant & facultatem diuersam & tartarum in summo vase vinario melius, quam in lateribus, & cadmiabotrytis melior aliis, & pompholix, spodio præstantior: sic densi fructus quia conferti & compressi malè nutriuntur, malè coquuntur, malè diffiantur: contrarii, contrà: laxi enim & rari partus plantarum, & animalium, vberius alimentum trahunt, ob id meliores sunt, si nobis salubre est id alimentum: peiores si in salubre, vt in colocynthide Mesues

pr

probè docuit. Et plantarum partes humi
repentes rectis aliis meliores, vel contra: &
in orbem circumacta radix, vel altera alteri
insidens, vel sibi inuicem implexæ radices,
& partes mutuo contactu inhærentes, dissi-
ta, superficialiæ, profundæ. Cum verò tem-
peramentum medicamento, vt aliorum, sic
causa facultatis, & facultas actionis, & actio
operis ipsius, vt docet Gale. lib. de faculta.
natura. & lib. de vsu partium, quæ ex na-
turali cuiusque potentia, deligendi ratio
sumi potest, ea nobis ab actione tanquam
sensu notiore sumitur. Ab actione igitur fa-
cultates, primas, secundas, tertias, quartas
consequente, delectus medicamentorum su-
mitur: estq; hæc nota maximarum virium.
Quoniam tamen de omni genere harum fa-
cultatum nobis abundè est dictum initio
lib. 2. nostræ methodi medicamēta compo-
nendi, necesse non putavi huc ascribere. Ha-
rum autem differentiarum & notarum, vel
plurimarum, vel omnium, vel saltem qua-
rundam, in singulis simplicibus medicamen-
tis exempla plurima tibi Dioscorides suppe-
ditabit, non pauca Galenus, & qui post eum
de materia medica scripserunt.

Adde quòd vt tota substantia nobis ali-
mentum est familiare, sic plantis suum, quò
fit vt non omnis ferat omnia tellus, non
sol

solum quia calidior, frigidior humidior, ficcior, aut per coniugationem, quam ipsius plantæ vel animalis naturæ conueniat: sed quia in ea alimentum plantæ & animali cognatum desideratur.

Nec tantum hæc in plantis totis, sed ipsarum partibus singulis sunt exploranda, (vt idem de animalibus, & ipsorum partibus, & terreis corporibus tibi persuadeas) quales sunt radices, trunci, caules, culmi, festucæ, rami, virgæ, furculi, germina, fermenta, viticulae, adnata, capreoli, spinæ, cirri, pediculi, folia, flores, fructus, semina, siliquæ, vascula, capitula, calices, umbellæ, corymbi, comæ, spicæ, pappi, ligna, cortices, succi, liquores, lachrymæ gumosæ, & resinose, & si quæ sunt eiusmodi.

Quintò & vltimò tempus in deligendo medicamento multiplex obseruandum est, ætas scilicet, pars anni qua collecta sunt & reposita, aëris constitutio serena, pluuia, ventosa: his viuentibus aut repositis: pars diei varia: duratio & seruatio longa breuis. Quæ alia tempus indicent diximus lib. 2. nostræ methodi.

Virtus enim alia, vt & temperatura, est neophytis & teneris: alia adultis & senescentibus, vis item alia euphorbio recens collecto, atque alia veterato. Plantæ item calidæ,

dæ, siccæ, si ær sit calidus, succus, sunt meliores. Ob id plantas Italicas aromaticas Cre-
ticis non cedere dicit Galenus, si aëre non
fuerint pluuiæ educatæ. In singulis tamen
partes deligendæ sunt, omnium prestantissi-
mæ & maximè medicamentosæ, si his viri-
bus egetur. Est enim quando ignobiliori-
bus & imbecillioribus est opus, ob affectus
ægri, aëris naturam. Præstantissimæ verò,
tum ex prædictis conditionibus, tum ex his
quæ in singulis particulatim dicendæ sunt
coniectantur, ratione eadem quæ in plan-
tis dicta est, in animalibus quoque & corpo-
ribus terreis seruata. De tēpore verò colle-
ctiōis Dioscoridis verba hæc sunt: Imprimis
curandum est, vt quæ in vsum reponenda
sunt medicamenta, suis temporibus singula
demetantur. Ex hoc enim fit, vt quædam vi-
ribus magis valeant, alia sint inefficacia. Pri-
mum itaque cælo sereno plantæ legantur.
Magni enim refert inter colligēdum, si, vel
squalores & siccitates, vel imbres infestent,
quemadmodū si loca quibus hæc prodeunt
sint montana, excelsa, perflata, frigida, sicca.
In his enim locis vires habent longè valen-
tiores: contrā verò quæ in campestribus, ri-
guis, opacis, cæterisque locis à vento silen-
tibus, plerunque degenerant, & minus va-
lent viribus, præsertim si nō suo tempore le-
ga

gantur, vel vitiata, & præ imbecillitate languentia, ignorandum nanque non est, multa pro soli & cæli natura ac tēperie, citius aut tardius adolescere: nōnulla vi propria, etiā hieme frondere & florere. Sciendum prætereā est, quædam in herbaceis medicamentis, vt veratrum vtrunque, multis edurare annis: alia post trimatum inutilia. Quæ verò herbæ sunt fruticosæ vt stæcas, trixago, polium, abrotanum, seriphium, absinthium, hyssopum, & alia id genus, dum semine prægnantia sunt, demetenda. Flores verò antequam sponte sua decidant. Fructus autem dum maturi sunt, vt semina dum siccaricœperunt, priusquam defluant, herbarum & foliorum succos elicies, cum primum cauliculi germinant. Lac & lachrymæ excipiuntur caule inciso per summum adolescentiæ vigorem. Radices & liquamenta corticesque ad recondendum eximantur, cum primum herbæ suis foliis exuuntur. Si puræ sunt & nitidæ, siccentur & reponantur loco non vliginoso: quæ autem terreno aut luto sunt sordidæ, aqua prius abluantur. Flores, & omnia iucundum odorem reddentia, articulis tiliaceis ædium parte siccissima reponantur. Est quando chartarum inuolucris & folliculis suis semina utilius & innocentius seruantur. Liquidis medicamentis den-
fior

fior materia, argentea, vitrea, cornea con-
uenit: fictilis etiam modo rara non fit: & li-
gnea, præsertim è buxo: ænea verò vasa ocu-
lariis medicamentis, & liquidis, & his omni-
bus quæ aceto, pice liquida, aut cedria cōpo-
nuntur. Adipem autem & medullas stanneis
vafis, seu plumbo albo recondi conuenit.
Hæc Diosc.

Finē labori propositio imponemus, vbi
locū Mefuæ, quo quædam medicamēta pur-
gantia cælo & solo simili meliora euadere
scribit, sed sine exēplis explicauerimus: sum-
pta ab animalibus analogia. Nā vt animalū
naturæ, hoc est téperaturæ, & ætates, & mor-
bi calidiores ad hiemem, regionem frigidā,
victus rationem refrigerantē, tanquam con-
trario excessu frigido, illorum caliditatem,
immodicam corrigentia præsidia bene se
habent, ad æstatē verò, regionem calidam,
victum calefacientem, ceu intemperaturam
augentes causas, malè: & contrā naturæ, æta-
tes, morbi frigidiores, ad æstatem calidam,
regionem, victum calefaciētem, benè se ha-
bent, quod ab his contrariis illorum attem-
perato recessus corrigatur, malè verò ad
hiemem, regionem frigidam, victum refri-
gerantem, tanquam affectus illos propter si-
militudinem aucturas causas, & simili ratio-
ne humidiora hæc ad causas siccantes & sic-
cio

ciora ad humectantes melius habent: sic plantæ in plantis apparet, quibus ut animalibus insitum est alimento familiari nutriri, quibusque ut animalibus consueta victus ratio naturam seruat, si est victus illarum naturæ similis, aut nouam facit, si dissimilis. Ob id plantæ intemperatiores, id est, calidiores, frigidiores, humidiores, sicciore, solo & cælo & alimento ipsis contrario emendantur, & ad temperaturam mediam, quoad fieri potest, inclinant: nisi quas multum calidas, frigiditas, humiditas, siccitas expetimus, tales enim solum & cælum & alimentum simile conseruant: mirum ni etiam intendant. Quæ verò animalium temperatura est omnium extremorum media, iniuriisque omnibus omnium maximè resistit, illa similibus temperatis seruatur, quod Galenus dilucidè lib. prioribus sanitatis tuendæ demonstrauit. Sic plantæ temperatæ cælo & solo temperato conseruatæ, meliores euadunt, nisi ad effecta alia, has calidiores, frigidiores, humidiores, sicciore requiris. Tunc enim solo & cælo dissimili, & à sua natura temperata diuerso, hoc est, calidiore, si calidiores vis: frigidiore, si frigidiores: humidore, si humidiores: sicciore, si sicciore expetis, emendantur: & calidæ siccæ calido sicco solo & cælo. Ob id Creticas plātas plurimas ad thiriacam, & ali

alia medicamenta, & Italicas si solum & cælum sicca fuerint, præponit Galenus: tamen in his est quodam prodire tenus, sed non datur vltra. Nam eadē ex India aut Aethiopia fuerint deteriores, licet illi tractus plantas quas dā habeāt eximias, vt Aethiopia cuminum, Trogloditæ myrrham, India nardum & malabathrum, & alia plurima, quæ inde largo prouentu Lusitani navigationibus ad nos cōuehant. Quæ igitur ad methodum simplicia deligēdi pertinent: vbi ex locis prius dictis memoria tenebis, eandem in particularibus ipsis exercere oportet, ordine illo, quem in simplicibus seruauimus. De radicū itaque delectu primū dicamus, in quibus vt aliis plantarum partibus, propter eā quod nostrates communem quandam deligendi rationem sustinent, de his etiam cōmuniter scribemus: de exoticis verò singulatim, tū quod hæ sunt cariores, & ob id ab exteris adulterari solitæ: tum quod hæ, quia infrequentes magis, etiam exercitatos fallunt.

Radices autē omnes incipiente foliorum *Tempus*
defluuio legēdas, & cælo sereno, cēsuit Dio- *colligendi.*
scorides, cui in quibusdā Galenus & Auicenna & Mesues cōsentiunt, in aliis diuersa sentiūt, vt post leges. Sunt cōtra quibus placet magis, radices esse legēdas priusquā in cau-

lem, folia, florem, fructum, semen, vis plātæ propè tota erūpat. Defluentibus autē foliis, eas esse fœtis animalibus similes, hoc est, velut semianimes ac multū imbecillas, nisi si quæ tantū habebāt viriū, vt etiam earum satis retineāt arefacto caule, vt scilla, quō valida animalia etiā fœta adhuc robusta permanēt: nisi dicas etiā in illis quæ viua & veteri radice repullulāt, saluā vitalē plātæ velut sanguinē per caulē priusquā arescat in radices, licet nō totū, refluere, vt in arboribus fit, alio quouis tempore colligi possunt, quæ hominum cultu & satione crebra in omnē anni partem vegetæ incidunt, quales ferè sunt hortenses, alimentosæ, vt apii vulgaris, buglosi vtriusque, betæ, lactucæ, intibi, oxalidis, raphani, napi, pastinacæ, sisari, cari, panacis, cæpe, porri, allii: & præter has erraticæ, dauci, gingidii, caucalidis, ari, dracūculi, cyclamini. periclymeni, cotyledonis: nam hæ quinque, vt bulbosæ quædam, aliæ etiam æstate ficeatis foliis, plenæ sunt, & frequenter autumnō regerminant, alimentum pinguis & crassi copia.

Quæ verò solius naturæ sponte crescūt, aut semel à nobis tempestiue feruntur, aut plantātur, ferè sunt optimæ, solo aut vere, aut (vt dixi) autumnō, paucissimæ æstate, aut hieme. Quia & hæ quas multis anni partibus

bus communes diximus, sunt præstantiores cum tempestiue satae adoleuerunt, & vigēt: aliis verò temporibus ignauiores, quando vt quadam & holitoris opera & irrigatione coguntur adolescere, sub cælo sibi parum propitio: quale æstium est, ac autumnale, & hiemale. Sic vere ipso, quando primùm germinare incipiunt, nobis leguntur in an- num, enula, althæa, iris, acorus, symphytum, ruscus, asparagus, petroselinum, apium, fœ- niculum, bryonia, cyperus, rubia, saxifraga, valeriana, eryngium, tormentilla, pæonia vtraque, polypodium, gramen, lilium: nisi recentibus aliquādo sit opus, sed quæ omni- no erunt imbecilliores, quam si quo tem- pore recentes colligi debent, in vsum ve- nissent. Omnes tamen integræ sunt, si fie- ri potest, vellendæ & vnaquæque in solo & cælo suæ naturæ familiari, quod expe- rientia confirmat. Nam tunc bene habitæ sunt, nec enormes ob alimenti copiam: nec strigosæ, & marcidæ & tenues, & rugosæ ob eiusdem inopiam. Mox aqua lauantur sunt, & radiculae purgandæ, multæ etiam elignan- dæ: quædam verò crassæ & magnæ etiam in taleolas secandæ, posthæc siccandæ in so- le, vëto, interdum igni, vt in siccatione lib. 2. dicemus, nisi recentes sint vtendæ. Igni au- tem præcipue siccantur, quando cælum est

nubilum, aut hiems, aut quando mox siccatis opus est. Adde, quod in his & aliis plantarum partibus non solum tempus colligendi legitimum est obseruandum, quale multis radicibus est plenilunium natura humidissimum, sed etiam repositio commoda & duratio. Non enim sunt reponendæ nisi exquisitè siccatae, ne putrescant: nec loco humido, puluerulento, non perflato, reponendæ.

Radices supra tres annos non seruantur Auicennæ. Quæ enim crassæ & densæ substantiæ sunt tandiu seruari possunt, vt radix bryoniæ, rha pontici, peucedani, mei, aristolochiæ. Quæ verò tenui & rara cōstant substantia, vt asari, apii, petroselini, saxifragiæ, dictamni, tormentillæ quotannis sunt mutandæ. Radices autem legendas cum folia cadunt, etiam censet Auic. canone. 2. & Platearius in Aristolochia. Quædam tamen aliis temporibus saladino leguntur, vt veris fine, aut æstatis initio, acorus, gētiana: aut mense augusto quādo etiam spina alba, vulgo bedegar, ruscus, bryonia, cyperus, iris, enula cāpana, dictānus vulgaris, pæonia, glycyrrhiza, vt septembri peucedanum.

Octōbri cyclaminus, recēs & siccus efficax. Decēbri eryngium iisdem leguntur.

Efficaces autem illæ quoque seruantur annum vnum, pæonia vtraque, peucedanum.

Duo

Duos, meum, iris, cyperus, maior & minor dictamnus.

Tres, acorus, chelidonium, enula, saxifragia, valeriana, pyrethrum.

Decem, costus, cenanthe, rha ponticum.

Daucus autem asarum & aliarum radices multę recentes sunt meliores: recondita autę prope omnia, quia sunt essentię tenuis, parū diu seruantur efficacia, pręsertim puluerata.

Asari radix ampla, spissa, odore tenui, sapore acri, & parum astringente.

Eryngii radix eligenda ampla, alba, tenera, *Mesues in simpl.*

Radix satyrii plena & recens, non flaccida & emortua ad diasatyrion. *Idem initio Anti.*

EXOTICAE verò radices sic deligantur. *Ibidem.*

Acori radix similis ireos radici. i. complicata in obliquum, geniculis intercepta, candi- *Dios.*

da gustu acri, & modice amaro, odore iucundo, calida, sicca ordine tertio, densa plena carie non exesa, qualis à Colchide & Galatia affertur: quę à quibusdam galanga maior vocatur, quod sit vtraque crebro geniculata, & odore aromatico: sed hæc in idis magnitudine, illa cyperi.

Vulgaris acorus huic diuersissimus tota sua natura, nō usurpandus, nisi medicus ad refrigerandum & siccandum imperauerit.

Quod si qua huius generis in locis sicciori-

bus educata & calidioribus naturam acori prædictam aliquid induerit, vtraque acorus esto, ille indicus, hic nostras imbecillior.

Dios. Gal. Agaricus foemininus rectis intus venarum
Mesues. discursibus constans, sapore initio dulci, mox amaro, tandem etiam subacri & subastringente, leuior, rarior, mollior, albior, breuior, friabilior, splendidior quam mas, in fracturis suis, filosus neruorum modo. i. grauis, densus, durus, niger, lignosus, longus, interdum rotundus, sed vbiq[ue] cōpactior & obscurior, superficie nō densa, sed rara, tota foemininus prætereā, sed de vero & radice semiuliginosa & semiputri gignitur in Agaria Sarmatiae regione, & inde appellatur: hodie ex albis metitur.

Hæc autē επιφαυεία, id est, superficies seu facies summa seu cum Mesue pars superior quanuis tota vndique superficies intelligi possit, tamen quæ pro situ in arbore variior est, agarici pars superior, vti à Mesue rectissimè dicitur, eapotentior videtur, quia magis aërea, & ob id leuior rarior, &c. cum aëreū ob insitam leuitatem sursum feratur, vt in eodem terrenum & aqueum deorsum: siue autē ea pars superior sola, siue etiā tota eius superficies optima est non est nobis purgantibus agaricum excidenda & abicienda quorundam more. Nec ita superficiem ad viuū
 int

intellige, vt sola velut cuticula fit vtilis, sed illæ partes quæ subsunt quo ipsi optimæ sunt propiores, eo meliores.

Aristolochiæ clematidis longa radix nobis est perfrequens, longa, rara, rotundæ verò in agro Nemausensi plurima, etiã hic crebrescit, Effodienda est messibus, & desquamato terreno seruanda. Legendã vtranque plenilunio, vt alias propè omnes quidã contendunt: sic enim pleniores cum sint, siccando minus flaccescunt, alio tempore lectis magna sui parte siccando vaporantibus, & marcescentibus. Eligenda vtraque bene habitata, & si est sicca, minus alterugis striata, carne multa, firma, odore & sapore vegeto, sed suo, non puluerulenta dum frangitur, nec fitu obruta, nec carie aut terredinibus exesa. Quæ bonitatis note reliquis propè plantarum partibus sunt communes. Pontica autẽ & Cretica est præstantior. Behen accipiantur Armenia, calida, humida, odora, rubra *Serapio.* potius quàm alba: quæ verò hodie in Ita- *Manar-* lia & prouincia in odoræ reperiuntur radi- *dis.* ces, & pro behen supponuntur, vel aliæ sunt ab Armeniis, vel saltem his minus efficaces. Harum loco placerent magis radices eryngii, Behen rubrum folio lapathi rotundi prope Burdegalam locis aquosis plurimum, ac inde in alias Galliæ partes transportatur:

album in Prouincia crebrius.

Dios.
Gal.

Bryoniae radix foris cineritia, intus albicans, ampla, consummata, colligatur veris initio.

Hor. Ma-
nardi.

Calamus aromaticus, calidus ficcus, ordine secundo, partium nonnihil tenuium, fuluus, intus albicans, odore fragrantissimo, dense geniculatus arundinis modo, cætera mollis tactu, lentus in frangendo, cōfractus autem in assulas dissilit, non totum raphani modo rumpitur, fistula intus plena araneorum, casiae gustu, leuiter astringens, & cum quadam, sed minima acrimonia amarus, in mandendo glutinosus, ex India deferitur, terredinibus facile tentatur. Qui verò in officinis est, nō calamus, sed radix est, neque ea calami, sed plantæ alterius: neque ex India videtur afferri, quia vili venditur, & sæpè recēs multum cernitur. Ob id inter radices eum recensui, iustius inter ligna locandum: si verus habeatur, triennio seruatur.

Dios.
Gal.

Centaurii magni radix, acris, astringens, subdulcis, subamara, rubescens, crassa, grauis, solida, tripedalis (si integra est) succo prægnans dum recens est ex solo pingui & aprico Licye Peloponesi, & aliarum multarum regionum, annos decem seruatur. Radix autem centaurii parui, medicamentis est inefficax.

Ibidem.

Cof

Costus subamarus, modicè astringit, acer
adeò & calidus vt vlceret, candidus, leuis,
eximia odoris gratia recens, abunde plenus,
densus, ficcus, à terredinibus non exesus, Ara-
bicus. Post hunc indicus, tertius in bonitate
Syriacus, grauis, colore buxeus, odore fe-
riens. hodie Lugduni frequens est Arabi-
cus, non tamen quem Arabici scriptores dul-
cem & amarum soli inuexerunt. Costi nigri
mentio fit Dios. in rha pontico.

Dracūculi radix legenda vere, aut æsta- *Mesues*
tis initio, ampla, cōpleta, ex loco libero, hæc
etiā nostras est, rarò externa huc cōuehitur.

Dictāni radix Dioscoridi calefacit, aliis
folia magis celebrātur calida, odorata, rotū-
da, parua, densa, lanugine vtrunque intecta.
Cretica metitur æstate & autūno. Quæ ve-
rò radix dictāni ab officinis supponitur al-
ba, tenuis, elignata, propè inodora, minimū
amara, nullo exiguo ve caloris sensu, pseu-
dodictamni fuerit potius, aut herbæ nescio
cuius, qua abiecta, potius pulegio vtēdū est.

Doronicum, radix parua, foris subflaua, *Serapie*
intus alba, dulcis, calamo aromatico similis
colore & figura.

Helleborus albus radicib⁹ nititur multis, *Dios.*
tenuibus, ab oblongo & exiguo capite ex-
euntibus, cæparum modò fibratis, optimæ
sunt cādidæ, friabiles, carnosæ, mediocriter

extentæ, nec iunci modo mucronatæ, nec in frangendo puluerem emittētes : suntq; medulla tenui, gustu feruēte, nec tamē id vehemēter, nec saluā subinde ciens. Quæ enim confer tim eam cōtrahunt, strangulant. Laudantur ex montibus & asperis, Cyrenaicæ, Galaticę verò & Cappadocicę & Italæ sunt periculosiores. Omnis albus est periculosus Mesuæ, non item Græcis autoribus. Eidem minus acer & mordax, nec statim initio albus quam niger, sed amarior est ac diutius seruari potest quam niger, cætera nigro similis.

Mesues.

Cortex radicū fibrosarū, asari colore, fractu facilis, medius crassi tenuis, antiqui recētis, grauis & leuis, aut potius leuior quā grauior, legitur vere & estatæ Mes.

Diosco.

Helleborus niger radicibus coheret nigris tenuibus à capitulo cape simili, cōfibratis, vt albus, quarum est vsus. Optimæ sunt corpulētæ, plenæ, in quibus sit tenuis medulla, acres gustu, & feruentes, in collibus asperis, & sitiētibus locis, vt Anticyra, Helycone, Parnaso, Aetolia. Addit Mesues fragiles, leues, asperitatisq; expertes, leuiiores quā grauiiores, tenuium & crassarum, recentiu & vetularum medias. Salubrior est albo, colligitur vere & æstate.

Mesues.

Esule minoris radicis cortex eligendus
ten

tenuis levis, fractu facilis, rubescens cassie fistule modo post sex acollectur menses, ex loco libero collecta initio veris. In fine veris autem, lac eius colligendum est.

Galanga est radix subrubra, vel rufa, geniculata, intorta, grauis, sapore acerrimo, linguam admodum vellicante, calida sicca gradu tertio, odore & figura quadam cyperi. Unde quibusdam cyperus Babylonicus dicitur, in dicta priscis, alba, odoris, & saporis gratia carens, puluerabilis multum abiicienda.

Gentiana notis tantum communibus niti- *Adua-*
tur, ex Iura monte in Gallias totas distri- *rius.*
buitur, colore foris buxio, intus crocante, *Serapio.*
amarissima (ob id aloë Gallica dicitur) dura, parum rugosa, fragili cotumax, in hortos Parisienses translata, minus efficax adolescit.

Glycyrrhiza quamvis in Galliis passim luxuriet, laudatur tamen Galeno magis Cretica, aut saltem Hispanica, vel ex locis aliis minus humidis: colore est foris buxio, ligno- *Dios.*
lento & fractu cotumaci, intus multum croceo, si timque mansa extinguente, sapore subacerbo, dulci, quibusdam melior est nigricans & lenta, quam buxea & fragilis. Improbatur intus alba vel nigra, exucca, vetus, fragilis raphani modo, & inter frangendum puluerem edens: quæ nota in omni partem plantæ, si præter naturam adest vetustatem prodit.

Herm

Hermodyctylus Mesuæ probatur radice rotunda, ampla, foris & intus multum alba, mediocriter dura, ex loco edito lecta, calida & sicca initio gradus secundi: laxa verò, rara, levis, est imbecilla: rubra & nigra, mala. Quæ in officinis est, affirmatur mihi ab his qui legerunt frequenter in Gallia Narbonensi & Prouincia, esse folio nigro, porraceo, flore per autumnum croci sine croco tamen, foris nigra radice: quæ res declarat esse colchicum, innoxium tamen aut saltem innocentius experimur: forte quia siccatum est, nisi recens nobis vsurpatur.

Iris illiryca veteribus propè sola laudatur, parua, densa, frangi contumax, subruffa, intus albior, amara, sternutamenta dum tunditur ciens, odorata. Florentina tamen sola nobis hodie inculcatur, cum Gallica alba purgata laudetur Galeno lib. 8. c. ph. part. Ex locis apricis & siccioribus Illiris lecta ad me missa Venetiis à Marti. Grego. medi. præstantissimo in horti mei partem editam, & soli meridiano apertâ trāslata, iam pulchrè repullulat. Mesuæ verò laudatur radix ampla, dura, densa, velut in nodos breues collecta, ex albo rubescēs, odore violæ nigræ aromatico sapore, acri & mordaci, flore purpureo potius quàm albo, veris initio collecta.

Na

Nardi spica cū radice dodrantali, digi-
ti parui crassitudine, astringēte, subacri & le-
uiter amara, odorata, calida primò excessū,
ficca secundò. Mihi Lugduno delata est à
Ioanne Horneo Parisiis. Pharmacopœo lō-
gè peritissimo, & fidissimo, latinè doctissi-
mo, Græcè & Hebraicè mediocriter institu-
to, cum costo acoro, & aliis non paucis.

Pyrethrū radice est longa, pollicari cras- *Dios.*
situdine, gustu feruidissimo & igneo, à quo
nomē habet, quæ mansa pituitā largā elicit.

Polypodium radice dulci, austera, digiti *Dios.*
parui magnitudine, multū ficcante, sed sine *Gal.*
morsu, probatur subdulce, subausterum, gu- *Mesues.*
statu ad postrenum subamaro, & nonnihil
aromatico, solidum, cirris seu nodis plenū,
ex rubro nigrescens, colore intus herbaceo
pistacii modo, recens, quercum & arborum
aliarum glandiferarū truncis innatum: aliis
murale & saxosum magis probatur, nisi lo-
ca sint vliginosa & vmbrosa.

Rha ponticū radix nigra, costo nigro fo *Dios.*
ris, cētaureo magno intus similis, sed minor,
ruffior, fungosa & laxa, aliquātū leuis, sine
odore, quæ mansa colorē reddit pallidū, ad
crocū inclinātem, terredinibus non exesa.
Diosc. In quo præter hæc legit Serapio,
astringēs, si plusculū mādatur, subacris, &c.

Rha indicum & proximum ipsi rha bar- *Raued.*
bar

sceni Me- barū, laudatur subnigrū in rubrū inclinans,
sue dici- graue pro raritate sua: confractū, ex rufo &
tur Gal. glauco alternat, & croci modò tingit, recēs,
anti. lib. i. nō adulteratū, astringēs amarū cholagagū
 calidū ficcum ordine secūdo, seruatur annis
 tribus, quatuor, in psyllio milio vel oblitū
 cera sola, vel ea cum terrebinthina.

Scilla sit bonæ magnitudinis (nō tamen
 admodū magna & enormis) benè habita &
 nutrita, alba, recēs ex terra sumpta, cū folia
 eius & caulis exacte aruerint, seu quādo tri-
 ticū metūt, quia tūc potissimū viget. Huic
 pancratiū simile gustu & viribus, sed imbe-
 cillius. Mesuæ præfertur, quæ sapore est dul-
Gal. lib. 8 ci, acri, amaro, squammas delibrata, splen-
simpl. dens ex loco libero propè aliàs educata.

Turbith Arabibus laudatur, cortex al-
 bus, gūmosus lactis crassitie, vacuus, arūdi-
Mesues. naceus, fractu facilis, recens, foris autē cine-
 ritius & planus, ex locis ficcioribus.

Zingiberis radix sit cādida, odorata, pi-
 peris sapore & viribus, nisi quòd tardius ca-
 lefacit: sed diutius, vti longum piper. Dāna-
 tur teredinibus exesum, puluerulentum, te-
 ctorio quouis circūlitum ad pondus & ma-
 gis ad exesionem tegendam. Terram meri-
 tam & columbinum, quod vocāt, malè zin-
 giberis loco supponūt, quāties puluere eius
 est opus: licet pondere, colore, & reliqua
 nat

natura radices sint diuersæ.

Zedoaria radix aristolochiæ rotundæ æmula, sapore, & colore zingiberis, calida sicca gradu secundo, eadem Serapioni dicitur zurumbeth: sed zurumbet sine, h, radix est diuersa.

HERBARVM DELECTVS.

HERBÆ propè omnes sunt nostræ, quamquam harum quædã ex aliis regionibus sunt meliores, vt absinthiũ ponticum, chamædrys, chamepitys, scordium, Cretica chamædrys, cãpæstris potius quàm suburbana, calaminthe môtana melior quàm domestica: tamen si nostrum hoc solum & cælum habeant persimile externo, vires quoque non ita dissimiles fortiantur, qua ratione plantas Italas Creticis non multũ cedere scribit Gal. si pluuium non fuerit cælum, & herbæ acres digerentẽsque, quæ humores prauos afflictis partibus infixos vehementer digerent, ex ficcis & maritimis locis eligantur, in empla. *Ad Boet. in initio li. bro. 6. compos. pharm. secund. genera.*

Portò ex herbis plurime solũ virides in vsum recipiuntur, dum hæ vel harũ succi in syrupos coquantur, & in apozemata, clysteres, fots, cataplasmata, & alia id genus, in quos vsus postremos quouis tempore leguntur: in syrupos autem, vel formata

ali

aliam toto anno seruandā sunt legēde, quādo sunt efficacissimæ, cum scilicet florēt, aut etiā semine iam plenæ sunt vt fumaria, calaminthe, & aliæ ex sequētibus, in syrupos, vel alia cōposita diu seruanda recipi solitæ. Nā fumariam florentem veris initio, semine autem plenam veris fine legit Mesues.

Quòd si herbæ nec caulem, nec florem, nec semen edunt, vt adiantum omne, asplenium, legēdæ in foliorū vigore: quādo scilicet maxima & virentissima sunt, quædā verò dum florent, aut semētescunt, quia lignosæ sunt, & exuccæ: ante id tēpus in vsum trahuntur, vt beta, brassica, cichorium chōdri-la, eupathoriū, lappatha, plātagines, verbascum, verbenaca. In quo viriū vigore etiam sunt colligēdæ quæ ficcātur, & in vsus medicorū varios anno etiam toto seruātur, vt absinthium omne, adiantum omne nobis (quibus enim abūdat virens, & vigēs vsurpatur) anethi coma, betonica, carduus benedictus, cichoriū, cētaurium parū, calaminthe, mentha, chamædris, camæpitys, eupatorium, eufragia, fumaria, hyssopi coma, mar-rubium, maiorana, organū, poliū, pulegiū, ruta, rosmaris, saluia (licet hæ duæ etiā sine floribus sint efficaces) scordium, splenium, thymum, thymbra, verbascum: aut saltem cum vigent folia magnitudine, odore, colore,

Aneti &
hyssopi co
ma floru-
lenta est.

rè, præsertim quæ cacumini sunt propria. Absinthium autè vere legit Mesues, ad succum & aquam inde stillandam, flores eiusdè æstatis initio, hic autè æstatis fine, vel etiã autũno. Eupatorium quoque legitur, & ex eo succus exprimitur in fine veris Mesuæ. Siccatur autè in vmbra magis, nisi quæ sunt caule crassiore, aut folio humidiorè, & ob id apto putrescere. Vbi probæ sunt siccata, reponuntur, vt radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quotannis mutandæ.

Adiantum omne eligit Mesues bene habitum, virentibus foliis: quod autem gracile est immodice, & folio flauescente examinatum est.

FLORVM DELECTVS.

FLORES vt plantarum partes reliquæ legantur cùm maximè vigent, cælo sereno: non autem vt Bulcasis & indocti alii scribunt hoc vel illo mense: nam quibusdam regionibus & cæli cõstitutionibus celerius aut tardius plantarum partes perficiuntur, vt capparis in gemma, rosa expandi cœpta legitur, reliqui ferè aperti: sed haud ita pridem, & ex quibus vis nondum exhalauit, nec folia tenuentur, & sint decidua. Siccantur sole vel aëre calido, magis, minus, pro varia ipsorum natura. Quidam siccandos volunt, donec ex ponderibus decem vnicũ supersit,

d

minus autem ex montanis floribus quam ex campestribus minuitur. Reponitur ut alias quotannis mutantur quamuis sphœrnæ humi etiam decennium seruari possit: chamæmelum item diu vegetum est, ob fortem partium suarum mixturem. Quam virium constantiam etiam tum validus odor demonstrat. Flores absinthii, chamedryos, chamæpityos, hyssopi, anethi, eufragiæ, fumariæ, maioranæ, origani, roris marini, saluiæ, thymi, verbasci in herbis ipsis commemorati sunt, reliqui nunc dicentur.

Balaustum flos siluestris punicæ, cytino flore satiuæ punicæ est astringentior, præsertim quod ex acerbis punicis est. Vterque hic flos punicæ, est ab arbore auellædus quo loco tunc granatum nullum igitur. Nani qui cecidit, sæpè id illi ob alimentum inopiam, augescere & protrudente fructu contigit, aut ob vermiculum, aut aliam causam: ob id infirmior est, qualis agnoscitur facile: quia vna parte nigricat, foliorumque capillamentorum ipsis non hæret, ut in eo quem auulseris, qui prætereà in umbilico ipso, ut foris rubet. Hispana, rosæ modo lata, & breuia præstantiora sunt Narbonensibus longis angustis.

Caryophyllum laudatur, fragili cōtumax, odoratū, ex plano tumidulum, recens, quod

vng

Unguibus compressum humorem quandam
remittit, acre, & aromaticum, calidū siccum
gradu secundo, aut etiam tertio. Annos
quinque seruari potest, loco tēperato: nam
in humidiorē putrescit, sicciorē arefcit, &
rugosius euadit ac imbecillius, vt quod in
eo est enormius, quod barbari antophillum
vocat, interpretaturq; antefolium natum,
vt vox sit illis composita ex latina præposi-
tione, & Græco φύλλον folium.

Crocus Dioscoridi optimus ad medica. *Lib. I. an-
menta, Corycius, recens, oblongus, integer tid.*
plenus, non fragilis, flauissimus, & qui cum
humore tritus, suo colore manus saturet,
nec fitū nec cariem redolens, subacer. Gale-
no autem Corycius, à Coryco antro in quo
nascitur, licet aliis sit procerior, non tamen
aliis robore odoris aut diuturnitate est præ-
stantior. Eligendus verò est non procerior,
sed odoratissimus & flauissimus, & lōgo tē-
pore in vigore suo persistens. Præstantissi-
mum igitur aliquem crocum apto quodam
ædium loco repositū obserua sæpè, vt per-
noscas. Nam id colorem odoremq; pristi-
num diu seruabit: adulterati verò odor &
color citò vanescit. Hæc Galenus.

Centaurii parui flores ex pallido flauos
initio æstatis legit Mesues. Nostrates au-
tem sunt purpurascens.

Epithymum Arabum seu thymi cassutha amplexicaulis, cum ramulis thymi lecta minus citò marcescit, & à thymo esse non herbis aliis congeneribus cernitur. Sic flores cæteros & fructus cum ramis legendos Galenus docuit. Ex thymo autem montano est præstantius, quàm ex hortensi Cretense rum præferitur à Mesue.

Epithymū Græcorū quid reuera sit, nōdū planè cōpertū habemus, nisi sit flos satireiæ, Picardæ vulgò dictæ, perpetuò virentis.

Hyssopus colligenda Mesuæ quādo incipit florere.

Nymphææ flos tam albus ex stagnis, quàm luteus ex fluuiis, vere legitur, cū apertus est: siccaturque luteus ob paruitatem, integer, albus, conspurcatis aliquot externis foliis purgatus, & cauliculo capillamentisque crocatis. Luteus verò ferè hic in aquam etiā cum albo distillatur, rarò ficcatus seruatur. Narbonenses alba sola vtuntur.

Rosæ sunt præstantissimæ quæ longè omnium suauissimæ sunt, & aliis rubicundiores, quales ex montanis, non autem conuallibus leguntur, siccandæ loco sublimi meridiano, quo solis radii penetrent, rosas tamen non tangant. Nam albæ, incarnatæ mofcatæ, quāuis recentes odoratissimæ sint, tamen siccatae sunt inodoræ: rubræ cōtrā re-
cent

centes parum odoris reddunt, ficcatae iucundissimum & diuturnissimum iaculantur. Ex agro montoso petroso Pruini urbis, vnius diei itinere à Parisiis dissitae in vniuersam propè Galliam omnium praestantissimae conuehuntur, in territorio tamen Parisino non insuaues praesertim vico cui fons Naia, dum nomen etiam vulgò est, larga manu luxuriant fabulosis vinetis, quae Vrbi toti satis esset possint, vt Pestanas & alias priscis celebratas rosas non desideremus. Rubras admodum foliis paucis & planis praeditas praefert Mesues. Rosae tardius collectae parum diu seruantur, & citò nigrescunt, tempestiue lectae biennio seruantur: cum igitur mediocriter sunt apertae, mox integrae insolentur, saepè mouendae, deinde folia auulsa vase terreo claudantur, ne odor aut color pereat. Si quo die sunt lectae sol non luceat, rarae disponantur, ne se corrumpant densatae. Similiter alii flores siccentur.

Schoenanthum seu schoenu anthos ex Arabia rarissimè huc ad nos transfertur, sed eius iunci tantum calami, si deferantur flores, solo odoratus vigore deligantur. Nam odoris illius gratia citò vaneſcit. Gal. lib. i. antidotorum.

Stoechas etià exotica est, ex Creta enim Gal. lib. i. habitior & melius nutrita, ob id melior. Pe Antid. titur, multa tamè nobis domestica ex insu-

lis: stœcadibus Mafsilię afsidentibus, quibus
& nomen ipfa est sortita. Prouenit etiam
multa in Arabia, vnde Arabica cognomina-
tur, & à Mesue præfertur, flore præsertim,
pòst foliis: fit amara, modicè astringens: spî-
ca ex purpureo cærulea, odorata.

Stœchas verò citria seu flaua Dioscori-
dis heliochrysum, & Galeni amaranthus co-
ma floris aurea, densa in Gallia Narbonēfi
& Aquitania, agro Burdegalenfi plurima &
præstantissima gignitur, odore abrotani ma-
ris, & etiam sapore, sed minus amaro.

Mesues.

Viola nigra vulgo martia & quadragesi-
malis, à Mesue laudatur quæ prima floruit,
neq; vim suā calore solis resolutam perdi-
dit, nec pluuia obtudit vel diluit & dissipa-
uit. Quæ iam diu aperta est, aut pluuiam sen-
sit, aut in filuestribus nascitur, odoris gratia
caret, ac viribus.

Flores vix annum seruari possunt effica-
ces, præter chamamelum, stœchadem, cro-
cum, & alios paucos, qui annis post duobus
aut tribus, coloris & odoris gratiā retinent.

DE SEMINIBVS.

SEMEN à fructu quantum differat, abun-
de in nostræ methodi lib. I. docuimus.
Semina verò deligantur matura omnia, be-
ne habita, plena, & corpulēta, & quæ naturæ
sue vires proprias habeāt efficacissimas, &
odo

odorē, saporē, colorē, sui generis perfectissi-
mū, si odoris, saporis est particeps. Multa e-
nim sunt inodora & insipida, nō modo semi-
nū, sed aliarū quoq; partiū genera: Sint præ-
tereā, si fieri potest, delata ex regionibus, in
quibus celebratissima crescūt maiorū no-
strorū testimonio. Sintque recentia, aut his
proxima. Quæ enim diutissime fuerunt re-
posita semina, & alia, vires habent imbecil-
liores. Vbi autē pulvis ab ipsis diuidēdo ex-
cidit, terminū excefferūt lib. i. alimētorū.

Amomum candidum vel fuluum, simpli-
ci tamen colore nō vario, laxius, in vua par-
ua seminis tamen plena, diffusum, nō astri-
ctius coherēs, sit prætereā odoratū, nares vul-
nerās, acre, mordax recens, non cariosum.

Amomū Scythicū laudatur lib. 8. com. phi.

Ami Illyricum vel Aegyptium.

Anisum Creticum.

Cuminū Aethiopicū, deinde Aegyptiū.

Ligusticum ex Ligusticis alpibus vnde
illi nomen.

Seseli Mafsikiense, alterum Aetiopicum,
tertiū Creticum Dioscoridi laudatur.

Sinapi Alexandrinum.

Thlaspi Cappadocicum vel Creticū, sed
maius & minus rotundum est præstantius
Galeno. Vtrunq; nobis est, à Bursa pastoris
herba frigida astringente, diuersum.

Dios.

Cardamomum eligi debet frangēti contumax, occlusum, plenum, fartumque, gustu acre amarumque, odore caput tentans, exaltans: quod tale non est, exoletum iudicatur. Hæc Diosc. Nigrum passim cognominatur Galeno, Nasturcio minus calidū, sed suavis & fragrantius eidem dicitur. An verò semen quod hodie noster Ioannes Horneus Lugduno aduexit, minus & planius grano paradisi, colore & sapore propè eodem, in filiqua breui triquetraque largissimum, sit verum cardamomum, affirmare non ausim ob historiæ ipsius obscuram breuitatem: tamen tum ipsum, tum granum paradisi, & quod cardamomum minus vocant profuerunt officinæ, semina sunt non indigna recipi in antidota, ob virium in ipsis aromaticarum excellentiam.

Cnici semen sit amplum, plenum, medulla pingui, album, angulosum, læue Mes.

Psyllium elegit Mesues absolutum, amplum, tam graue vt aqua mergatur.

FRUCTVVM DELECTVS.

EX FRUCTIBVS quanquam non pauci nostrates in medicamenta recipiuntur: quia tamen externi quidam præstantiores habentur, ipsorum quoque bonitatis notas paucis attingere fuerit operæpretium.

Am

Amygdalæ tā dulces quam amaræ, probantur flavissimæ, plenæ, integræ, non confractæ, nec erosæ, tamen leues, duræ & ficcæ quantum illis datum est, ob id fragiles, intus albissimæ. Ex his dulces, sapore delicatæ, propè indicibili in castaneā tostam & panis purissimi bene cocti qualitatem inclinātes: odore, ante esum nullo, aut perquā exiguo, inter edendum autem iucundo.

Improbantur albescentes, nigrescentes, rugosæ, molles, tortiles, fractu contumaces, & quæ fractæ à candore illo ad pallorem recesserunt, aut nigrorem, oleosæ natura aut vetustate, odore rācido, sapore ingrato aut oleagino: quem omnibus vetustas affert. Ex quibus tritis etiam si plus olei exprimatur, tamen olei amygdalini probatissimi dotes non assequitur, quod ex prioribus extrahatur, excorticatis cultello potius, quam aqua calida, vt in oleis dicemus.

Anacardus, seu cum Paulò & Actuário anacardion, sit plenior & habilior, fuscus, refinæ in cortice multa, acri, nigra, nucleo intus albo: quo in melle cocto fit mel anacardinū. Hoc etiam tuso potest oleū exprimi, sed longè diuersum ab eo quod coctis in aqua corticibus supernatat, & conchis colligitur ad confectionem anacardinam.

Myrobalani citrinæ sint, flauæ, multū in

d s

Mesues. viride inclinantes, densæ, graues, in fractu-
ris gommosæ, amplæ, cortice crasso, denso,
os paruum complectente.

Ibidem. Cepule ample sint, & quo maiores eo me-
liores, subnigræ, in rubrū inclinātes, graues,
ob id in aquā prōptē mergi, cortice crasso.

Ibidem. Indæ, sint nigræ, magne, graues, substātia
dēsa, sine ossibus. A quibus cōditiōibus quā
to longius abscedunt, tanto sunt deteriores.

Ibidem. Emblicæ, magnæ, graues, carne multa,
densa, ossibus exiguis, rara verò carne quæ
sunt, spiritu & vigore carent.

Ibidem. Bellericæ, magnæ, graues, carne multa
& densa.

Notæ igitur in his cōmunes aliorū fru-
ctuū & præcipuæ sunt, vt sint bene habitæ,
& corpulēte, carne multa & firma ac dēsa, &
ob id osse exiguo, qb^o os datū est. Nā Inde
sunt exosses. Quæ verò notæ aliæ à calore
ducūtur, & ossis figura, minoris sūt momēti.

Balanus myrepfica sit ampla, vetus, corti-
ce læui, tenui, pleno, medulla læui, pingui.
Parua verò ex albo nigricans, vetus, plena
medulla alba, læui, pingui, est innocentior.

Conii seu strobili vulgo pineoli, pleni,
recentes, albi, sicci, quatenus illis datum est.
Vitentur flauī aut etiam pallidi, oleosi, ran-
cidi. Id quod his citò, vt ferè sexto mēse ac-
cidit, nisi prius saccharo intecti hoc vitium
eff

effugiant: præsertim si prius ex furfure frīgantur, & sic probè siccentur: deinde cribro purgentur, quod remedium est, aliis quoq; seminibus condiendis, ne aut citra condituram, aut etiam condita rancescant.

Cupressi pillulæ, vulgo nuces, sint perfectæ recentes, ob id molles, feminis plenæ, etiam in ipsis hiatibus.

Cydonia seu cotonia sint bene habita, flavescentia, odorata, matura cum minus astringendum & refrigerandum est: cū verò magis, ante maturitatem colligantur.

Eadem ratio est struthiorū, quæ nos cydonia fœminina vocamus, aliis maiora, minus acerba, carnosiora.

Citrium & aranciū malū, & quē vulgus limonē vocat, sint magnitudine quodq; in suo genere mediocri, odore valido & incundo, cuiq; suo cortice tenui, raro: colore in limone pallido, in citro flauo, in arantio rubescente: quamuis & arātia virida etiam per maturitatem inueniantur: carne intus multa, firma, & succo odorato, acido, interdum dulci, est quando ex vtrisque misto.

Colocyntidis medulla cortice ablato fit pilæ mediocris in speciem conglomera-
ta, Gal.
vehementer amara, matura, ampla, rara, ob id levis: & quāto leuior, tanto melior: alba admodum lenis, eadem fœmina, autumnole

legenda cum flauescit abeunte iam virore.

Mesues.

Cucumeris agrestis fructus præfertur absolutus & maturus, & virore deposito flauus, amarus. Ex quo succus albus, subpinguis, Elaterium dictum, quomodo sine valenti

Dios.

compressione extrahatur, docet Dios.

Mesues.

Carpobalsamum sit flauum, plenū, grande, graue, mordax gustu, & feruens in ore, modice opobalsamum redolens.

A&.

Cassia fistula, seu nigra, seu cathartica, id est purgatrix, eligatur foris & intus nigra, ampla, collucens, grauis, plenior, & quæ concussa clausis intus granis non strepat: pulpa intus pingui, splendens, succulenta, non fistulenta, nec putri: sapore prunorum delictato: calida humida primo gradu. Vtendi tantum tempore extrahenda: nam extra cannas, vt semen, sanguis, lac, extra propria conceptacula, prompte corrumpitur, & in vasis seruata peior euadit.

Cubebæ sint corpulentæ, plenæ, graues, acres, minus tamen quàm piper, subamaræ, admodum aromaticæ, subdulces, annis decem seruantur.

Coccum gnidium ex thimelæa eligendum, cni folia magna tenuia sint, quæ in locis liberis crescit propè alias multas thimelæas, foliorum vsum celebrat Mesues non granorum.

Da

Daſtyli nobis, vt Græcis vulgaribus hodie dicuntur, fructus palmæ, à digiti figura. Probantur magni, flauī, parum rugoſi, molles, pleni tamen, & carne intus multa, ſubdura, ad nucleum candicante, ad corticem rubeſcente, non pertuſi, non vermiculoſi, & qui concuſſu nihil aut minimum ſonent, ſapore viſoſo. Deteriores ſunt graciles, flacidi, duri, quia excarnes, excuſſo pediculo pertuſi: iidem ferè vermiculis ſcatentes.

Ficus paſſæ ſeu caricæ habentur præſtantiſſimæ, quæ in calathio ſpartaceo digitis, aut pugnis vtrinque preſſæ, ſic illis mollitiæ ſua cedūt, vt mutuos partium dictarum motus ſibi propè obcurrētes ſentias, odore ſunt iucundo, non calorem putredinoſum, aut vermiculoſum referente.

Hæ verò ſi particulatim explorentur, pediculo ſunt breuiſſimo, colore in candidum vergente, molles, tractanti facilè cedentes, cute tenui, molli, ſucco intus & ſemine flauo, & plane melleo ſapore, odore ante eſum & inter edendum iucundo, graues, paruæ. Si Maſſiliotides (quæ etiam ſaporis gratia cæteras longè antecellūt, ſiue albicātes tantum ſint, ſiue intus & foris albe, ſed flauo ſemine) maximæ: ſi externæ ſint, quales Hiſpania mittit muſto merſas, vt dulciores ſint, poſt ne cohæreant farina aſperſas.

Vit

Vitiosæ sunt duræ, tum in massa, tum per se singulæ, vermiculosæ, graueolentes, foris nigræ, intus rubentes, vel alio præter naturam colore præditæ, cortice crasso, duro, sicco, intus alieno colore, odore, sapore. Quædam tamen sunt nigræ Prouincialibus & Narbonensibus dictæ, foliis nigrantes, intus tuberrimæ, omnium delicatissimæ dum recentes sunt: nam siccatae liquefunt, aliæ eiisdem cineritiæ, aquosiores quàm vt ficcari possint: hominibus ingratae, auibus expetita.

Galla omphacitis, id est immatura, laudatur parua, seu magnitudine mediocri, nodosa, grauis, solida, nõ perforata: minus utilis magna, rotundissima, polita, leuis, laxa, perforata, flaua, aut saltem rufa. Gallia Narbonensis & Lugdunensis præfert rosmarinas vulgo dictas, omniũ minimas, graues solidas, asperas, pretiosissimas.

Iniubæ zizipha vel zinzipha Græcis dictæ laudantur recentes, amplæ, oblongæ, passæ, tamen tensæ, carne intus multa, succulenta, laxa, dulci, vinosa: plenæ, graues: sapore dulci & delicato: nucleo paruo, foris rufo ac verius rubentes, intus pallidæ aut albescentes. (Nam foris albæ nobis nondum visæ) osse prunorum rotundiore, paruo intus nucleo, dulci. Improbantur vetustate nigri-

cantes, leues, siccae, puluerulentæ, friabiles, excarnes.

Myxæ, myxa, & myxaria, vulgo sebesten, à mucoso lentore, quo abundant dictæ prædictis affines, sed dimidio minores, acuminatæ, parum rugosæ, graues, nigrae, carne multa ex rubro nigricante, firmiore, glutinosa, dulci & subacida, osse prunorum Damascenorum inæquali, nucleo intus exiguo dulci.

Malum punicum cortice seu corio integro, rufo, duro, & denso, graue, maturum, granis intus rubris vel roseis, succo prægnantibus vinoso plenissimum.

Myrti baccae recentes, plenæ, succulente, odorate, grandes & bene nutritæ.

Nuces auellane præferuntur ligno solido non pertuso, rubente, rotundo: corpulente, graues nucleo intus si concutientur sonante: si fracta nuce gustetur, gratissimo, & sapore castaneam referente: foris flauo, intus albicante, pleno duro.

*In Gallia
Narbonē
si quatuor*

His proxime sunt, france vulgo dictæ, hoc est legitime, oblonge, ligno simili, se muria cute intus nucleum vestiente rubentissima, dies alicarne dura & firma rubente. Infime sunt quot ut itē syluestres, ligno & nucleo candicante. Improbantur, leues, perforate, quia vermiculose, vetustate oleagine, rugoso nucleo uantur.

&

& exucco.

Nux moschata sit grauis, oleosa, odorata.

Nux indica aquam intus dulcem habet, si recens est. Quæ quidem vtenda, nõ cortex,

Oliuæ halmades, seu colymbades, quæ in sua muria conditæ innatant, præstantiores sunt magnæ, ouales figura, pallidæ aut rufæ, plenæ, solidæ, carne multa, densa, subamara & subdulci: osse intus paruo longo, nucleum delicatissimum complexo. Quæ verò enormes aduehuntur, acuminatæ, carne multo largiore, sapore sunt minus delicato, vt armeniaca. Insita non insitis corpulentiora multò sunt, sed saporis iucunditate multò inferiora.

Gal.

Opiantes & rha, & ribes vua legenda matura, plenior, acinis paucis, bene nutritis potius quàm densis, & paruis & strigosis.

Piper longum sit, corpulentum, integrum, recens, linguam tarde, sed diu commordēs. improbatur perforatum, vel adulteratum.

Mesues.

Piper album ex hoc productum acrius longo, & nigro maximum, plenissimum, graue non rugosum.

Piper nigrum, alio maius, cortice tenuiore, & minus rugoso, graue admodum.

Pistacia sint recentia, nucleo intus herbaeo, sapore iucundo.

Thamar indi præferuntur subnigri, seu
fu

fusci, lucidi, molles, recētes, pingues ceu vil-
lis quibusdam, & radiculis intertexti, dulca-
cidi, seu ex dulcibus acidi, & vinoso sapo-
re. Improbantur sicci, carne prunorum ad-
ulterati: in quibus nigredo est obscura, &
prunorum odor & sapor.

Pruna passa, vel acida sunt, vel dulcia,
vtraque sint ampla & plana: carne intus mul-
ta, succulenta, firma: osse exiguo, foris vel
melle aërio incrustata, vel nigra, sed citra
ablutionem: non rancida, nec fitulenta, nec
puluerulenta.

Damascena & armenia magis ad aluum
subducendā, & dulcia alia humidaq; sunt eli-
genda Mesuæ quā acida, vel horū media.

Senna folliculo (cuius præcipuus est vsus) *Mesues.*
fit subnigro, in viride inclinante, modice
amaro & astringente, à natura completo, re-
centi, semine intus amplo compressoque.
Deterior est subalbus, nondum iustæ ma-
gnitudinis, aut maturitatis. Folia secundū
tenent locum si viridia sint, & plena, non
subalba, aut tenuia: surculi inutiles purga-
tioni, ob id abiiciēdi. Mirum est hodie tam
oblitos sui & Mesuæ pharmacopolas, vt fo-
lia pluris & faciant & vendant quā folli-
culos. Nostras verò hortensis senna ineffi-
cator est orientali, vt vocant, tamen non
inutilis vsu quotidiano exploratur.

Vuæ passæ, pingues, carnosæ, cortice tenui sunt præstantiores libro. 2. alimentorum nobis sunt Damascenæ. Corinthiæ vulgares.

Damascene sunt deligendæ amplæ, fuluæ, transparentes, carnosæ, seminibus paucis, paruis, sapore vinoso.

Corinthiæ omnium minimæ sine seminibus, colore purpurascente, sapore delicatissimo, rare, & præciosissimæ.

Vulgares huc afferuntur, vel ex Prouincia capfulis abietinis, vel ex Hispania calathis spartaceis. Prouinciales omnium post dicta duo genera Damascenas intelligo & Corinthias præstantissimæ, præsertim quæ prunellatæ vulgo indigenis vocantur, opinor quod acino sint pruni amulo, hoc est nigro, sed quem ros caruleus intexit. Non incelebres fuluæ, Picardatæ iisdem dictæ, Damascenis toto habitu proximæ, nisi minores essent, & carne parcior, minusque solida. Ambæ in palmitibus siccantur intorto pediculo, hæc si pinguescant immodicè & ob id digitis hæreant, farina aspersa vitium indigenæ tegunt. Qui dolus est frequentissimus in Hispanis omnium ignobilissimis. Quas enim habet Hispania optimas sibi seruat: viles in alias septentrionis regiones transmittit.

Del

DELECTVS LIGNORVM.

Dios.

A GALLOCHVM lignū, sit maculatū,
odoratum, gustu astringens, & sub-
amarum, cute verius quā cortice aliquan-
tum versicolore, halitum mansu commen-
dans, suffimentis expetitur thuris vice, eius-
que modo in igne liquecens, sed tardius,
& aquæ iniectum mox subsideat, & bullu-
las edat. Xylaloë dicitur Aetio & Actuario,
id est lignum aloës arboris, non herbæ, cu-
ius tamen succum nigredine & amaritudi-
ne pauca, & succo intus gummoso nonni-
hil repræsentat: vnde opinor illi nomen
hoc accessit. Crudum vbiq̃ Mesues re-
quirit, quod enim à quibusdā est expedien-
di odoris gratia, vim amisit. Quod verò Dios.
ostendunt officinæ, verius est aspalathum:
quod si optimum sit, graue & detracto
cortice rubens aut purpurascens, densum,
odoratum, gustatu amarum: alterum de-
terius candidum, lignosum, inodorū, Sunt
tamen qui eius loco oliuæ arboris matri-
cem substituant.

Lignum Gaiaci, siue ebeni species est,
vt mihi videtur, quia ebenum toto habi-
tu & viribus à Galeno scriptis refert, siue
aliud lignum sit, eligatur colore fuscum
& flauum, cortice ipsi ligno firmiter hæ-
rente, densum, graue, bene habitum ex

arbore ætatis mediæ, si potest recentissimum (quo enim recentius, eo est succulentius & vegetius) aut alioqui gummosum, ac in eo nõ excorticato rami mediocres præferuntur, si verò vetustus est trūcus, (modo nõ fit putris aut cariosus, vel aliter vitiat, ut sæpe videmus) quia ob crassitiem & duritiæ dissolutioni sui magis resistit, pinguior manet quàm rami, cortex verò siccior. Contrà verò recentis cortex internus pinguior, & succulentus magis, quia alimenti plantæ vehiculum ferè fuit. Eligatur item sapore dulci, amaro, acri ex insula meridiana sancti Ioannis, temperata, irrigua, iefinosius: ex insula autem sancti Dominici in zona torrida aridius.

Paulus sanctus quibusdam videtur ramus gaiaci, cui lignosarum fibrarum implexu vario, matrice nigra hodie in ebeni locum substitui solita, viribus denique proximus est, sed valentior si recens est: imbecillior verò & ob tenuitatem citius exicatus, si verus, ut in aliarum plantarum ramis, & præcipuè surculis. Aliis diuersus videtur quòd albescat magis suo cortice, & aliis quibusdam de causis. Iudicium his permitto, qui arbores ipsas cædunt, viribus certè ambo sunt proxima.

Santalum citrinum, optimum, & maximè

mè aromaticum, sed inuentu rarum etiam Plateario.

Album pessimum, rubrum medium bonitate est: frigida omnia gradu tertio, sicca secundo. Quæ tamen sunt in officinis acris sapore linguam mordent, præsertim citrinum, ob id non vtenda.

Xylobalsamum probatur recens, sarmen *Dios.* to tenui, fuluum, odoratum, opobalsamum non nihil spirans.

Calamus aromaticus, quæ officinæ ostendunt, radix videtur & rei alterius quàm calami, tamen viribus proximis pollere odor & sapor indicant, subalbus, odore & sapore aromatico, non puluerulentus inter frangendum, triennio seruat.

CORTICVM DELECTVS.

CINAMOMVM deligatur tenuium par *Galenus* tium, odoratissimū, seu indicibili qua *locis uarijs.* dā suauissimi odoris gratia super alia omnia præditum, gustatu acre, & valde mordax, admodumq; calidum non tamen adeò vt molestè rodat, mansum verò rutam oleare videtur, color illi est lacteus, cum giluo & cyaneo mixtus, seu cineritius, virgultis gracilibus, nodis frequentibus, læue, confrigifacile. Leptocinamomum. i. tenue cinamomum pro optimo vocatur Actuario. Quod verò cannellam vocamus, vel casia

est, vel pseudocinamomum, quanquam principum cinamomorum sex ipsi sint differentiarum generales, annos triginta seruatum sit imbecillius, nec putes diutius seruari posse integris viribus toto habitu corticisque tenuitate.

Casia quo cinamomo est similior, ac odore & gustu proprior, eò est præstantior. Est autem rufa, rosam, expirans, & vinum olens, gustum dulcem præferens, & aromaticum modo vehementer odora, vnde casia syrinx, id est fistulosa & casia syrinx fistula sæpè apud Galenum dicitur, à purgatrice & Aegyptiæ res diuersa, vt prius infructibus admonui, illa corticem externum, quem & fistulam dicunt, odoratu & gustatu valentem habet: quod autem intus est maximè imbecillum, ob id inutile.

Macis sit rufum aut flauum, aromaticum, odore suauis, sapore subacri, & minimè amaro: quoque recentius & succulentius, eò melius, ne putes cum quibusdam annos decem efficax seruari. Succus ex hoc expressus gummi hæderæ figura, quam ipsum macis est valentius. Macer hodie desideratur.

Tamaricis cortex sit verus ex Gallia Narbonensi potius quàm ex fonte bellæ aquæ paradiso regia propè Melodunum. Hic cum sit nostras & passim luxuriet, vel lippis & tōlorib

ribus notus est, vt cortex radicis capparis.

Thuris cortex fit crassus, pinguis, odora- Dios.
tus, recens, læuis, non scaber, sine membra-
nis, adulteratur misto cortice pini aut nucis
pineæ, sed hi sine odore fumant non incen-
duntur, sed thuris cortex ardet, & cum odo-
ris fragrantia vaporem iaculatur, ferè in gle-
bis thuris mistus inuenitur.

SVCCORVM DELECTVS.

OLEVM ex oliuis maturis expressum
colore rufo, purum, perlucidū, tenue,
odore exiguo sed grato, sapore dulci, sub-
acri, & indicibili, recēs, aut non ita vetustū,
nisi vetusto egeatur. In quo trigenarium tri-
mo, & quadragenarium quadrimo est plu-
rimo valentius, vbique crassius, graueolen-
tius, calidius, acrius.

Oleum virgo quod vocatur, est præstan- Dios.
tissimum: paucum fit, ob id pretiosum.

Oleum omphacinum ex immaturis vuis
expressum ad viride inclinat, recēs fit, odo-
ratum, morsus expers, sapore acerbum. Hu-
ius penuria ablutum capiendum est.

Vinum deligitur varium pro scopis me-
dicorum variis. Colore autem, odore, sa-
pore, consistentia ferè probatur.

Acetum album tenuius ob id valentius
nigro & medio, præsertim si æquè sit acre
& vetustum.

*Mel sit
uernū aut
æstiuū nō
hibernum
Auic.*

Mel optimū sit purū adeò, vt totū perlu-
ceat, odorū, flauū, accerrimū, dulcissimūq;
gustanti & iucundissimū: consistentia nec
crassa nec liquida, sed tam sibi cohærens, vt
continuitatem suam quasi linea longissima
non intercisum seruet, si digito attollitur.
Idem coquendo paucam spumam emittit,
nec thymum immodice olet.

Album etiam colore si fuerit, modo no-
tarū bonitatis aliarū nulla desit, nihilo dete-
rius fuerit. Quin Hispani & Narbonenses
mittunt albissimū, & longè præstātissimū,
idēque prædurum, quale etiā flauum hic
præferunt liquido: quippe quod humore ali-
quo est vitiatum.

Mesues.

Aeromeli autem. i. mel aërium seu māna
Arabibus dicta, siue liquida sit, siue granu-
losa, eligatur alba, recens, dulcis, pura, & ex-
crementorum, quo ad licet expers ex plātis
odoratis & huiusmodi salubribus collecta,
qualis laricea hodie probatur, anno serua-
tur. Sola prope granulosa in vsu est, liquida,
inuentu rara, quæ in lapides incidit deterior,
& hac peior cineritia: pessima fusca cœno-
sa, antiqua, saccharo & folliculis fenne adul-
terata: sed hæc tempore mollescit, & lique-
scit, dolūque prodit.

Cera sit flauissima, odorata, pinguis, co-
acta, leuis, pura, & aliena omni materia ca-
ren

rens. Maurica tingendis flauo colore aliis
quāquam nigricat: expetitur alba, vel natu-
ra, vel ablutione: fit viridis mista ærugine:
rubea immissa anchusæ radice, cinnabrio ta-
men sæpe tingitur.

Saccarum est præstantissimum, quod du-
rum, solidum, & mutuo metarum allisu so-
norum est, ligni sicci & solidi modo, tamen
ob siccitatem & imperceptam raritatē leue,
dulcissimū, candidissimum, & niuis in mo-
rem scintillans, coharens, quale Valētinum
in metas pyramidum æmulas (panes vocāt)
coactum, paruas, ponderis libræ vnus & di-
midia, vel circiter, charissimum, & cōfectu-
ris siccis aptissimum, penidiis ob siccitatem
nimis friabilem, ineptum.

Illi dotibus istis & pretio est proximum
quod Madere appellāt, sed in metas ponde-
ris librarū. 6. 7. 8. 9. decem formatur, confe-
cturis expetitur, quia minus pretiosum, non
multò tamen imperfectius.

Tertium statuitur lentile, album quidem
sed pinguius, ob id vilius neque confectui is
siccis aptum, sed penidiis idoneum.

Quartum ex Canariis nunc dictis insu-
lis, olim Fortunatis, aduehitur, etiam intus
albicans, bonitate inferius prædictis, præstā-
tius sequenti, metis constat maximis, pon-
dere lib. 10. 12.

Quintum ignobilissimum sancti Audo-
 mari dictum, foris albidum, intus subrubrū,
 tanquam alio factum, & foris dolo tectum,
 metis equalibus, omnium glutinosissimum,
 condituris siccis ineptissimum, liquidis ser-
 uit & syrupis, opiatis, conseruis, & similibus,
 quia vilissimum, & vilitatem tegit alio-
 rum mistura. Id si mare sentit (nam eo na-
 ues ob gravitatem saburrant) rubrum vul-
 go dictum fit, quanquam sunt qui rubrum
 spumam & spurcitiam omnis saccari se co-
 quendo purgantis existimant. Ex micis ho-
 rum collisu elisis etiam metas hic quidam
 cogunt, quæ simplicium naturam sequuntur.
 Ex his quod generosissimum minimam
 coctionem sustinet ne puluerescat, ignobi-
 lissimum contra: cætera pro accessu, aut re-
 cessu variant.

Acacia nostras modo non putruerit, aut
 fitulenta euascerit, bona adhuc fuerit vetu-
 sta, nisi recētem medicus exigat ob scopum
 aliquem.

Dios.

Mesues

Aloë optima sit pinguis, glutinosa, friabi-
 lis digitis, facilè liquefcēs, ex rubro ruffa, he-
 patis modo, coacta & intus foveata, proinde
 minus grauis, bono odore, myrrham æmu-
 lante, licet planta tota odore fit tetro exi-
 miæ amaritudinis, sincera, nitida, transpa-
 rens, arenularum & calculorum expers, qua-
 lis

lis est indicat. Adulteratur Mesue & aliis, & notas istas non habet.

Elaterium, & Glaucium & Lycium si habebuntur notas ex Dioscoride require.

Glycyrrizæ succus ex Creta optimus, hoc est, dulcissimus, mollis, recens, purus, tenax, & qui contractus splendescat, nigerri-
mus, & qui linguæ subditus tandem totus eliquescat.

Hypocisthis licet quædam flava, alia vi-
rens, alia candida Dioscoridi dicatur, ante
preparationem intelligitur. In offas enim
conformata est nigra, lenta, sapore astringe-
nte, odore non ingrato.

Ladanum probatur odoratum, subui- *Dios.*
de, facile mollescens, pingue, resinosum,
quod arenas non collegit, nec squalore ob-
situm est, quale Cyprium, sed Arabicum &
Libycum est vilius.

LIQVORVM DELECTVS.

Opos est liquor ex plâta vulnerata, te-
rebrata, scarificata, castrata, sponte de-
fluens, sed suavi gustu.

Opus Cyreniacus fit acer, mordax, mo-
dice rufus, non porraceus colore, translucēs,
myrrhæ æmulus, odoratus, & qui dilutus
cito albescat. Ex Taprobana insula in ma-
ri Indico maxima hodie à Lusitanis con-
uehitur, belzoe indigenis dictus, & nobis
ind

inde belzoin. (Nam indicus etiam Mesu-
laudatur) corruptius bencoin. Assa aroma-
tica & odorata, quibus corruptæ etiam di-
citur, nomine à lasere herba detorto, à qua
planta hic liquor defluit, vt etiam assa fœti-
da à lasere Parthico & Persico, & cum Me-
sue à Medico & Syriaco, cuius liquor virus
& putrilaginem olet Dioscoridi.

Dios.

Opium dictum, quod nigri $\mu\acute{\alpha}\kappa\omicron\iota$ Θ .i. pa-
paueris, fit opos.i. liquor, vt meconiū eius-
dem succus, laudabatur olim Thebaicum &
Hispanum, nunc Apulum in vsu esse frequē-
tiore audio. Opium habetur optimum, gra-
ue, densum, gustu amarum, odoratu, sopor-
iferum, quod facile aqua diluitur, læue, can-
didum, neque asperum, neque grumofum,
quodq; inter colandū non vt cætera coeat,
& in sole diffundatur, deinde admotum lu-
cernis non atra luceat flamma, extinctum
denique odoris vim feruat.

Dios.
Mesues.

Opobalsamum probatur recens, validi
odoris, sincerū, non ad acorē vergens, dilui
facile, læue, astringens, mordens gustu mo-
dice, in laneam vestem effusum, nec maculā
facit, nec si eluatur notam relinquit, lac co-
agulat, in aqua, aut lacte celerrime liquatur,
& colore lactescit. Idem senescēs crassescit,
deteriusque habetur Diosc.

Opopanax.i. panacis heraclii radice in-
cif

erisæ, vel caulis liquor, candidus, dum recens est, dum aruit, colore foris croceo, aut subflauo, intus candido, odore graui, seu cum Mesue odore bono, sed succo amarissimus, læuis, pinguis, friabilis, tener, facile in aqua liquefcens.

Damnatur niger admodum, & mollis.

Dios.
Gal.

Euphorbium sit lacteum, causticum, & vrens, tenuium partium vel orobi magnitudine, sarcocollæ modo emicans, vel in ouillis aut hedinis ventriculis exceptum & concretum, vitreum, translucens, acre, recens, albisimum, vbi calore multo & igneo egetur: vbi modico, luteum & vetus. Recens enim albius est, & calidius, & leui gustatu os accensum diutius sic tenet, vt cætera gustata euphorbium resipiunt. Color autem hic caducus est, & citò euanidus, fitq; vetustate cineritium, pallidius, aut flauius, & modice calidum. Bimum aut trimum adhuc mediocri viribus est, & interdum quadrimum: quinto autẽ aut sexto anno exoluitur, procedenteq; tempore totum elanguescit, ne putres cum vulgò annis decem posse integrum seruari, etiã cum milio, lentibus, fabis. Recens verò quia viribus est violentis, nõ vtendum, nisi medici optimi consilio, præsertim sumendo remedio. Mesue verò optimũ est leue, fragile, pallidum clarum acerrimum, odor

odore mordax, annotinum, nam recentius igneum est & venenosum.

Galbanum laudatur ligno purū, aliquid tamen seminis mistum habens, odore graui, sapore abominabili, pingue, in Ammoniaci aut thuris similitudinē chartilaginosum, humidi & aridi medium.

Ammoniacum probatur purū, ligno, arenis, terra, sordibus, bene coloratum, odore castorii, sapore amaro, prædensum, & in thuris masculi similitudinem minutis glebis chartilaginosum.

*Gaib. I.
Antid.*

Sagapenū laudatur perlucidum, foris rufum, intus candidum, acre, odore porri, seu medio inter laseris liquorem & galbanum, quibus adulteratur, galbano albiori est simile. Nam spumosa, cohærens, albior, leuisque pars galbani in sagapenum degenerat. Altera defior, & multo quàm aliud galbanum constrictior, sit galbanum optimū, sagapenum resipiens, eaque tanquam præstantissima vtendum, si verum est, vino aut aqua statim soluitur, adulteratū non liquefit. Mesuæ verò optimum sagapenum censetur ex albido rubescens, odore porri, non omnino laseris, nec galbani, quibus adulteratur, spissum, sed tamen leue, facile in aqua resolubile.

Ibidem.

Scammonia vel scammonium ex Myrra

A6

Afiatica deferitur laudatissimum, hoc est, nitidum, rarum, fistulis tenuibus, fungosum, leue, taurino glutini, vel gummi colore simillimum, & clarum linguam parum vehementer vrēs, lingue saliuosæ tactu vel humoris alicuius albescens in fragmētis, & lactescens, tenerum fractu ac pulueratu facillimum, odore bono sed suo, non autem foedo. Syriacum & Iudaicum graue & densum improbantur: tamen Antiochenum Mesues commendat: si verò linguam vehementer exurat, thitymali succo vitiatum iudicatur.

RESINARVM DELECTVS.

MASTICHE laudatissima fulgore quodam ignis splendida, candore ce *Diosc.* *Gal.* ræ Tyrhenicæ, ampla, retorrída, friabilis, stridens friando, odorata, minimum acris, Chia, idest ex Chio insula, calida sicca ordine secundo, parum astringens.

Deterior est viridis & nigra, Aegyptia dicta aut pontica, bitumini nigredine sinu-
lis. Est autem lentisci arboris resina.

Terebinthina resina ex terebintho arbo-
re defluens, optima est alba, vel cærulea, vel
colore vitri, perlucida, odorata, terebinthū
olens, subamara, chia, asperæ arteriæ & ori-
mordax, liquida. Huic primatum inter re-
sinas dat Diosc. secundas tribuit mastichæ, cō-
tra

tra Galenus, ob id eam statuimus primam.

Hodie ex Cypro insula & liquida, & per-
ficcationem coactior aduehitur non cōtem-
nenda. Huic proxima est larix dicta seu la-
ricea ex larice arbore, in qua mannā ferē
colligunt: larici bonitate & tota natura est
affinis abietina, quæ hodie prope sola pro te-
rebinthina, ab omnibus officinis supponitur
magno errore, cum sit multò inferior tere-
binthina. Quod si Galenus nō modo tere-
binthinam exigebat, sed Chiam tanquam
omnium præstantissimam requirebat, qua
nō dico ignominia sed pœna multādi sunt
rhopopolæ, qui sciētes abietinā pro terebin-
thina vendunt, vsurpantque non sine medi-
corum id permittentium infamia & culpa.

Præter has picea, pinea, strobilina, cypa-
rissina, Dioscoridi & Galeno memoran-
tur, & liquida è pinu & picea, quæ quod
olim à Colophone vrbe Asiæ minoris pete-
batur, colophonia vocabatur: nunc nescio,
qua ratione fecem terebinthinæ distillatæ
solam vocent Colophoniam.

GUMMIUM DELECTVS.

GUMMI ex acacia Aegypti spina, Ara-
bicum, vulgo dictum, & gummi ab-
solute, laudatur vermiculorum in speciem
cōtractum, vitri modo perlucidum, purum,
refrigerat, densat.

Canc

Cancamum Arabicæ arboris lachrima
vulgo gummi lacha, præstātius est ex Dios.
legendum.

Caphura Indicæ arboris ferulaceæ lachri-
ma, solis arabibus & græcis recētioribus co-
gnita, eligatur quæ igni vel sole ex rubro
albescit, perlucet, friabilis est. Ea enim est
melior & tenuior & durantior, eadem pa-
ni calido imposita madescit si sincera est:
arescit verò, si spuria.

Deterior est crassa, fusca, nigra, assulis li-
gni sui implicata, vase eburneo cum semine
psylli aut lini, annos quadraginta seruari
posse quidam affirmant.

Gummi oleæ Aethyopicæ corruptè elem-
mi dictum, melius est scammonio simile,
fuluum, stillis exilibus constans, mordax.

Dānatur Ammoniaco vel gummi Ara-
bico simile colore, nigricans, morsus ex-
pers. Quod proferunt officinæ est resinæ pi-
cæ aut pinus, quam Burgundicā vocamus,
colore & consistētia & odore primo, dein-
de tamen valentissimo & multis graui.

Gummi iuniperi vulgo Vernix, quia ver-
no tempore exudat & legitur, bonum est Dios.
recens, perlucidum, pallidum dum vete-
rauit, flauescit, & fit friabile mastiches mo-
do: quam toto habitu multum mentitur:
In vsu frequentiori tamen est scriptoribus

& pictoribus quam medicis, præterquam in suffitibus, qua autē ratione non video, cum ipsum vt & thus caput grauet, & vapore crasso & calido repleat.

Myrrha arboris Arabicæ lachrima eligenda, recēs, squallore & situ obducta, levis, tota concolor, & quæ contractas vnguium modo & læues venas ostendat, glebis minutis, amara, acris, odorata. Omnibus antefertur Troglodytica ex Aphrica, viridis, perlucida, mordax, odoris gratissimi, nullo vitiata liquore. Post hanc secunda est tenuis, bdelii modo facilè sub digito mollescens, odore grauiuscula, apricis nascens. Mala, nigra, aut colore picis, grauis, retorrída, maturitate maximè exoleta.

Omnium pessima, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginē vergens, & viribus eius proxima. Ob id adulteratur gummi macerato aqua, in qua myrrha maduit. Vera enim est rara inuentu, præcipuè sincera. Nā in optima myrrha opocalpason inuenitur ab optima myrrha diuersum, vt in nostris simplicibus abunde docuimus: propter quod & alia, myrrhæ in fune disparum tutus est vsus.

Myrrha stacte, id est, ex myrrha recente, pingui, & solo lætiore nata exudans & stillans, cum ex aqua pauca tusa, deinde machin

china exprimitur, colore pallido, amaritudine præcipua, odoratissima, pretiosissima, minima portione efficacissima, multò rarior ipsa myrrha. Nam quæ styrax liquida vulgò dicitur, si verax esset, myrrha fuerit facte: sed cum odore sit teterrimo, à myrrha alienissima res est.

Quod stillis illis expressis manna myrrhæ superest, vulgò quoque styrax rubra dicitur.

Bdellium lachrima arboris Sarracenicae vel Sembrachenicae cum Hermolao, optimum est carens cortice, ligno, sordibus, ut taurinum gluten, translucens & clarum, odore vnguis marini incensum, gustu, amaro, intus pingue, & si tactu subigitur mollescit.

Scythicum est atrius, resinofius, molliès magis. Arabicum resinofum, liuescens, lucidum, magis siccans, nisi recens sit & humidum, & tundendo facile mollescens. Indicum, sordidum, nigrum, grandioribus glebis in offas conuolutum.

Adulteratur gumi, sed id minus est amarum, & minus suffitu odoratum.

Styrax lachrima arboris Syriacæ probatur flavus, pinguis, resinofus, sordescens, albicantibus grumis, acer admodum, & amarus, quamplurimum in sua odoris fra-

grantia permanēs, & qui subactus melleum reddat liquorem. Deterior, niger, furfurosus, friabilis, cano situ obductus. Adulteratur multis modis Dioscoridi, sed dolus his notisprehenditur. Pretiosissimus erat & paucissimus Galeni ætate, qui ex Pamphilia in calamis & in arūdinibus afferebatur. Vnde opinor quiuis alius calamites hodie quoque dicitur. Accipe autem quod calidissimum, & odore & gustu valentissimū est.

De styracis duobus aliis generibus supposititiis in myrrha diximus.

Sarcocolla arboris Persicæ lachrima, polini thuris similis, rufa, emplastica, subamara sine morfu siccans Mesuæ. Item valentior est flaua quàm alba, & quo amarior, eò melior.

Diosc.

Adulteratur gummi misto, puluerata etiam suspecta est adulterii. Vera enim rara est inuentu.

Succinum vel Electrum est lachrima ex pinei generis arboribus exudans autumnō, ex Germania septentrionali & insulis maris Germanici, larga mitti solita, incensa pinea aperte olet, charabe vulgò & embra dicitur: medicis in vſu raro.

Ambar verò seu ambrū seu ambra Arabibus & Græcis recētoribus est odoramēti genus cineritio colore. Arabica, subalba. Indica,

ca, rufa, pinguis, odorata, succinū orientale dicta Hermolao. Nigra omnium pessima.

Thus lachrima arboris Arabicæ, pinguis, albius, emplasticiū, flavius, est siccius, & antiquatū magis. Quod fœmininū vocāt resinofum magis est ac molle, citò ardēs: quod masculū, primū albicat, tandē etiā rufescit & flauescit. Perlucidū est, si præsertim guttarum formā retinet. Adulteratur resina piceæ & gummi, sed thus ardet, gummi non inflammatur, resina in fumum abit.

Mannam seu maluam thuris Græci propriè vocant micas thuris, ex magnis fasciculis concussu elisas cum fragmentis quibusdam exiguis corticis thuris arboris.

Tragacantha laudatur alba, perlucēs, gracilis, lævis, sincera, subdulcis. Saliua, in ore diu lentescit. Quæ verò est antiquata, magis pallescit primum, deinde rufescit, tādē etiā flauescit: quod lachrimis prope omnibus commune est: fitq; tragacantha hæc annis amara, ob idque calidior, dulciū cæterorū more. Ob id etiam vulgus tragacantha flavam antidoto aureæ Alexandri, antidoto Hadriani & diacucurme maiori & aliis quibusdam cōpositis miscent, quæ calida sunt præsertim vbi cocta sunt, & vt dicūt fermētata, post annum scilicet dimidiū: aliis verò frigidis aut tēperatis albam aut pallidam.

METALLICORVM ET TER-

reorum delectus.

AVRVM & argētū indice lapide explo-
ratur & probantur, colore scilicet fla-
uo in lapide relicto. Igni quoq; & aliis ex-
plorantur fabris aurariis.

Lithargyros auri omnium optima, præci-
puè foliata, aureo colore. Liquatur vt cera
sed non mox, vt lib. sequente in liquatione
audies, materiæ solius in emplastris rationē
obtinēt, seruatur vase vitreo, plumbeo, stan-
neo, argenteo, siquidem aliam omnem ma-
teriam exedit, & defluere facit Diosc.

Lithargyros argēti & plūbi deterior. Est
autem horum metallorū se igni purgantū
vitium, seu feruescentium spuma.

Arsenicum, id est auri pigmentum opti-
mum est, aureo colore, nulli materiæ per-
mixtum, crustosum, & in squāmas tanquam
bracteolas fissile, Alterum globosum, glan-
dis effigie, pallidum, & colore sandaracha
imitans, vtrunque causticum est. In eisdem
metallicis fodinis quibus sandaracha gigni-
tur, in Ponto & Cappadocia.

Sandaracha arsenico affinis natalibus &
natura, quin & in eam arsenicum vstione
degenerat: ob id auri pigmentum & arseni-
cum rubrum quibusdam dicitur, probatur
colore rufo, saturatior ceu cinnabaris ru-
bro,

bro, sulfuris virus redolens, friabilis, aliena materia carens, causticū est. Ne ergo post hac sandarachæ nomine gummi iuniperi accipias in compositionibus Græcorum.

Aes vstum probatur rubrum, & quod tritum colore cinnabarim imitatur, nigrū vero plusquam decet exustum est. *Dios.*

Squamma æris laudatur crassa, rufa præfertim si aceti respersu æruginem cōtrahat. *Ibidem.*

Flos æris ære fuso & aqua effusa exilit subito, milii effigie & numero, optimus est brevis, grauis, splendens, cum teritur rufus, friabilis, adulteratur æris squamma aut limatura, sed hæc dentibus dilatatur.

Diphryges quasi bis coctum, est perfecti æris velut fex subsidens & cohærens imæ fornacum parti, ablato ære visitur, acre est vt æs vstum, præfertur quod saporem æris & æruginis habet, astringens & vehementer siccans linguam, quod exusta ochra sibi non vendicat, quæ tamen diphrygis vice venditur, adulteratur enim ochra vsta.

Scoria est metallorum omniū velut ster- cus, scoria plumbi optima est, densa fractu contumax, cerussam plane repræsentans, nihil plumbosum habens, ad luteum colorem accedens, vitri splendorem imitatnr.

Aerugo est æris velut rubigo, acris est &

mordax & caustica.

Flos æris Guidoni & sæpè idiotis aliis male dicitur.

Aerugo sincera cōpressu digitorū diffunditur, dentium quoq; appressu cedit, lævis est ac æqualis & sine asperitate post fossilē præfertur rasilis nobis hodie sola in v̄su.

Sori, chalcitis, misy, & ex transmissa per hæc aqua & siccatha, chalcāthum acria sunt, & vrendo escharas inducunt.

Sori in fodina infimum, crassissimum, lapidosius, vehementius compactum, in humore nō liquefit, friando nigrius ceu melanteria apparet ac scintillat vt misy, in multa foramina dehiscit, olfactu & gustatu virus olet, subpingue astringens est.

Misy summum grumosum & frustulosum magis est durum, auro simile, & friando auri colorem repræsentans, & stellæ modo splendens, ægre liquefit. Cypriū ad ocularia medicamenta optimum, ad cætera remedia Aegyptium efficacius. Diosc.

Chalcitis situ & natura horum media, æri similis, friabilis, non lapidosa, nec inueterata intercusantibus oblongis venis splendētibusque promptissimè liquefit.

Chalcanthū optimum est molle, concretum, graue, cæruleum, translucens, quale est stillatitiū cōcretitio & coctili præstantius.

Me l

Melateria præstat sulfuris colore, lævis, pura, æquabilis, aquæ contactu confestim nigrescens, misyos modo caustica. Diosc.

Cadmia fornacaria melior est botrytis, id est, racemosa, in summo fornacis ærariæ affixa, densa, modicè grauis, in læuitatē magis inclinans, colore spodii, & quæ fracta cinerulenta & æruginosa est.

Cadmia, lapis calaminaris vulgo dicitur, cuius puluere æs rubrum pallore tingunt & augent etiā hodie fabri ærarii. Is alieno sapore madeti est, & in farinā tritus, aceto subactus, in sole ficcatus coit in lapidē, in igne manet & fuliginem edit luteam vel æream, quæ lapidi cuidam in lapidum fodinis inuenito à nonnullis male pro cadmia supposito non conueniunt. Diosc. Id quod dum fit, pompholyx seu fuligo quædam alba, tenuis summæ fornacis cameræ adhærens parietibusque ac tectis & spodos illi persimilis, sed grauior, in pauimentum recidit. Vtriusq; magnam nobis copiam suppeditant fornaces ærariæ Parisiis, in via diui Martini, propè Budæi, piè vita functi, ædes.

Cerussa olim Rhodiaca Corinthia, & quæ Puteolis in Italia fiebat, cæteris albior, leuior, tenuiorum partiū, ad emplastra alba maximè commendabatur.

Sulfur viuum est optimum præsertim si

f s

nitedulæ seu fulguris modo splendeat & perluceat, nec sit lapidosum, vñtum verò est melius virens ac præpingue.

Sulfur enim ignem expertum, quo virentius, oleosius, pinguius, eo melius.

Alumen scissile non in fila tantum, sed digitis friabile, vulgo plumæ, omnium substantia est tenuissimum & pretiosissimum, aquæ innatat linguæ, & cuti integræ mordacissimum, igni liquatur vt alia alumina: quibus notis tribus ab amantho lapide proprio supponi solito facilè secernitur. Liquidum maximè crassarum est partium & vilissimi pretii, quia in omnibus regionibus inuentu est facile, crustè & lateris figura: quia facilè opinor liquatur, liquidum dicitur.

Rotundum & astragali figura in medio est amborum.

Gypsum vtendo seu vt vocant coquendo, vt petra in calcem vrendo coquitur, fit emplasticum: vñtum verò prætereà vt cùm in fornace & camino lapides iungit, aut calcinatum vt vocant, minus est emplasticum.

Spuma nitri, aphrolitrum, nitrum videri desierat, nec probo salem petrae ipsorum loco medicamentis misceri: mallem nitrum candidum, quod mihi ex agro Nauarrae datum est, minimum, salsum.

Nitrum præstatius est album rubro permi

mistum, lucidum in fracturis laminosum, fragile, læue, spongiosum, salsum, mordax, naturale.

Sal fossitius, vulgo sal gēma, quibusdam videtur, sed Mesuæ sal naphthicus, omnium valentissimus, secundo loco sal gemma, tertio mineralis, infirmissimus est marinus.

Sal armeniacus, Ammoniacus quoque Dioscoridi & Galeno dici videtur, subacer est ac leuissimus.

Stimmi vel stibium vulgo antimonium, *Dios.* optimum, splendidissimum, & modo nitedularum emicans, confractu crustosum, terræ & sordium expers, friabilè.

Chrysocolla laudatissima est armeniacæ, colorem porri quàm similitimum redens, *Dios.* pura, terræ & calculorum expers.

Cyanus, in cuius fracturis velut stellæ quædam aureæ scintillant, vnde lapis stellatus Mesuæ dicitur, & vstione fit ceruleus magis: probatur maximè saturatus colore nominis sui Diosc. Mesuæ verò est colore viridior & ceruleus, maculis aureis interceptus, grauis, metallorum expers.

Armenius lapis præfertur læuis, perquam æquabilis, calculi expers, colore cæruleo friabilis *Dios.* colore ex viridi obscurus, terreus, & indus, maculis viridibus & nigris distinctus, attactu læuis, & asperitatis expers

no

nondum exacte lapis, sed friabilis & pulueratu facilis Mesf.

Ochra eligenda leuissima, & omnino lutea, friabilis, non lapidosa, vritur & lauatur vt cadmia. Diosc.

Lapidum in medicamentis Græcorum rarissimus est vsus.

Iaspidem viridem Gal. omnem iaspidem medicamentosum tradit Diosc.

Arabes quoq; compositis quibusdam cardiacis saphyros, hyacinthos, granatos, sardines, margaritas commendat. De his Albertus magnus, Serapio & alii plerique multa prodiderunt, quam vere æstimato.

Diosc.

Hæmatites probatur friabilis, saturato colore, niger, durus, & suapte natura æqualis, nulla forde admista, nulloque zonarum discursu.

Diosc.

Magnes ferrum prompte trahat, sit colore ad cæruleum vergente, densus, nec admodum grauis.

Lapis iudaicus metæ striatæ forma, tener & friabilis.

Corallus lapis Actuarius dicitur, aliis arbor lapidosa, ruber & niger est Diosc. Nobis etiam albus & aliter coloratus. Visus mihi foris albus, intus ruber.

Sigillum Lemnium, in placentulas quasdam exiguas formatum characteribus turcicis

cis signatum, colore nunc pallido, nūc rufo, sapore parum astringente.

Bolus armenia colore ochra id est pallida vel lutea, prōptissime in summū lauorē cal-
cis modo soluitur pistillo, aut quouis liquo-
re, arenosa substātia caret. Tā callide hęc vt
figillū Lēniū & alia pleraq; adulterātur ho-
die vt pro veris recipiēda nō sint, nisi ab eo
qui collegerit, fides sinceritatis fiat.

PARTIVM AB ANIMALIBVS

sumptarum delectus.

SANGVIS hirci quadrimi, bene habiti,
aliquandiu nutriti vino albo & herbis,
calculum frangentibus, vt fœniculo, fœfeli,
lauro, augusto mēse iugulari, medius effluēs
eligatur: nā primus tenuior, postremus cras-
sior putatur. Vase vitreo receptus, linteo ra-
ro tectus, sole ficcetur.

Sanguis draconis veterum, hodie ignora-
tur. Qui verò ostenditur, factitius est ex hir-
ci sanguine, bolo armenia, & succo sorbo-
rum vel aliis.

Lac vaccæ, capræ, asinæ iuuenis, aliquan-
diu post partum exercitæ, & bene pastæ præ-
fertim idoneis sibi pascuis, verum largius
sed humidius, aut autumnale partius ficius,
& butyro diu seruando aptius, sit autē qua-
tenus lacti datum est, dulcissimum, albissi-
mū.

num, cōsistentia mediocri, si vaccinum est: tenuiori, si asininum vel caprinum.

Serū lactis capræ iuuenis nigræ, salubribus alimentis nutritæ paulò antè scetæ præfertur Mesuæ, secundas tenet serum lactis ouini.

Adeps ex animali florente autumno lectus, reponitur vel incuratus, lotus, ficcatus in vmbra, vel exemptis pelliculis fusus sole vel igni, in vase duplici.

Alii tosto in veru animali cadētē excipiūt.

Medulla vt adeps sumatur à fine æstatis, ad hiemis initium, ex florenti animali: & reponatur loco sicco & edito, & septentrionē spectante: reponatur cum foliis lauri ficcis, ne putrescat, aut situm ducat. Recens etiam tenerorum animalium vsurpatur.

Cerebella passerum verè & autumno captorum reponuntur, cum vitello oui & melle, vel sole aut cinere ficcata legitimum.

Cornu Rhinocerotis eligatur.

Mumia Serapionis, cum sit Dioscoridis pissasphaltum, id est pix & bitumen, ex horum notis noscitur. Quod verò nobis hodie est mumia, liquamen est hominū aloë, myrrha, & si datur balsamo in sepulchrocōditorum. Carnes enim cum humanis ossibus retorridæ ad nos afferuntur.

Cunicam interiorem ventriculi gallinarum

rum quia inutilem confirmat Galenus, de Dios.
illa ne labora.

Iecur lupi si potes florentis, & bene habi-
ti, aut etiam teneri potius, & recens quam
siccatum est præstantius. Potest tamé sicca-
tum in multos dies seruari, vt pulmo vulpis.

Renes seincorum, qui crocodili sunt ter-
restres, siccati seruentur, corpulenti & non
strigosi.

Castorium elige, id est castoris testes, Dios.
qui ex vno principio committuntur, & qui-
bus est intus liquor cerosus, friabilis, odore
gravi, & virus olente, gustu acri & morda-
ci, recens tamen melius veteri quibusdā est.
Nigrum auté foetidū, rancidū, die vno neca-
re sumptum affirmat Auicenna de venenis.

Oesypus, id est succidarum lanarum pin-
guitudo seruetur purus, ex ouibus integris
non scabiosis. Hyssopus humida ineptè vul-
go dicitur.

Ambra quam habeat originem ignora-
tur adhuc: præstantissima tamen fuerit rara,
leuis, habitu rha Barbari, sed fusca magis in-
terdū & cineritia & alba, odoris gratia mul-
tū commēdabilis, nigra autem reiicienda, &
quam vulpes deuorarint & vomuerint.

Moschus melior est subflauus quā nigri-
cans, & qui pelui humectatē immixtus leuior
euadat, quam qui grauior. Ex Catay tamé
nig

niger præstantissimus hodie affertur. Ferrugineus fere est noster, non quem Auicenna probat citrinus, Alexandrinum vocans, est odore in opum Cyrenaicum inclinate sed valentiore, præter summam aliam in eo fragrantiam glebulis exiguis constat, seruaturs melius pyxide plumbea cera obturata per se, si autem odoris gratiam perdidit, repone vase vitreo aperto, & suspende in cloaca, sic enim recuperabit, si Plateario credimus.

Diosc.

Cantharides probantur in frumento inuētæ, versicolores, & quæ luteas in alis trāsuerfas habēt lineas corpore lōgo, crasso, præpingues. Sed inertes ac imbecillæ quæ vnius sunt coloris. Capiātur vere, & phiala feruentur: necentur autem vt iubet Diosc.

Mesues.

Gallus ad ius purgatorium eligatur, rufus, plurimum annosus, sed tamen adhuc ad motum, pugnam, coitum, alacer: & in dimicando validus, macri & pinguis medius hoc est bene carnosus præparatio autem eius ex Mesue repetenda.

Vnguis odoratus, Blatus Bizantis Actuario, blatta bizantia vulgo, conchylii tegumentum est odore castorium referente, ad suffitus idoneum, ipsa enim testa mox liquatur igni bituminis modo, quod etiam improbe ipsa olet, quidam albicantem odoratam.

tam magis commendant.

Vniones seu margaritæ ex quodam concharum genere auulsi, sint corpulenti, integri, non perforati. Sunt qui à natura perforatos præferant, quod per foramen excrementis sint purgatæ.

De viperarum delectu lib. 4. nostræ methodi in theriaces compositione, quantum satis est diximus.

Ladanum sit nigrum, molle, glutinosum, graue, odoratum, friabile autem vetustate elanguit.

Ex prædictis aromata sunt, amomum, cinamomum, casia, calamus odoratus, nardus Gallica & Indica, partes, balsami, crocus, folium, folium malobathri, ladanū, aspalathū, xylaloë, macer & recentioribus Ambra, moschus, vnguis odoratus, caphura, cubebæ, doricum, galanga, caryophyllum, macis, nuxmoschata, santalum triplex, cornu monocerotis, cedoaria. In his quæ odorata magis sunt, in suo genere sunt præstantiora. Saporem autem si explorabis, permulta continenter ne gusta, sed vel os interea ablue, vel papyrus mande, vel tempus interpone, donec prioris aromatis sapor exoleuerit, vt non prioris reliquæ iudicium tibi falsum afferant posterioris aromatis. Hæc cū sint essentia tenuioris, celerius examinatur, præfer-

tim aëre calido, parum fideliter operculata & inuoluta, aut etiam iam comminuta. Ob id vtenda cum vigentissima sunt, nondum verò cariōsa, foraminulenta, exoleta, exaninata, emortua.

Ex his item purgantia sunt agaricum, colocynthis, cucumer agrestis, helleborus vterq;, tithymali, daphnoides, opopanax polypodium, sagapenum, sarcocolla, dracunculus, scammonium, euphorbiū, cassia fistula, myrobalanus quintuplex. Hermodactylus, lapis cyaneus & armenus, manna, rha barbarum Thamar indi, turbit, senna, & alia quædā Mesuæ & aliis tardita.

Quæ maiore cura & studio sunt deligenda, reponenda & seruanda: & quæ vi malefica sunt prædita, castiganda, vt libro sequenti dicemus.

Adulteria, quod in primis ad delectum conferant, ob id in hunc librum reieci, eaq; simplicibus ipsis dolo mētītis ascripsi, ne longius lectori disquirenda essent: fusius tamen hæc ipsa persequi non placuit ob dictas à nobis causas libro. 3. methodi medicamenta componendi, vnde in hunc librum si qua de adulteratorum notis desiderabis, transferre potes.

Super est in hoc etiam primo describere analoga quæ vocant, & antiballomena, quod

quòd hæc ambo non parum ad medicamen-
torum delectum commodare existimem,
vt libro sequenti agamus tantum de multi-
plici paparatione medicamētorū simpliciū
ad compositionem vtili, vel etiā necessaria.

Cum nomē alicuius simplicis medicamē-
ti commune multis scribitur sine additione,
quod ex illis intelligēdū sit, quia insignius
vel rei propositæ aptius, vt ammi, anisum,
anethum, apium, cnicus, cuminū, gith, lybisti-
cum, nasturtiū, psylliū, fesceli, staphis agria,
semine sunt efficaciora. Ergo apiū, animi,
anisum, anethum, id est semen. Adhæc, ani-
sum Creticum, ammi Illyricum, melius.

Aloë optima qualis Gal. Indica, Mesue suc-
cotrina.

Acetum ex vino: Nam ex hydromelitæ, cer-
uisia, & aliis fit, sed inefficacius.

Agaricum, album & scemininū, & qui notas
omnes optimi agarici à nobis prius scri-
ptas habeat, & in cæteris similiter.

Agnus, flos aut etiam semen.

Alumen scissile, quia præstantissimum.

Aristolochia rotunda. In vnguentis verò cle-
matitis.

Amomum scythicum, & cum notis scriptis.

Balsamum, opobalsamum.

Bryonia alba, potior quam nigra.

Buglosum vtrunque, id est, folia & flores.

Casia vel cassia in libris Græcorum, nostrū
vulgare cinnamomum, quæ in libris Ara-
bum cassia lignea dicitur.

Cassia verò fistula ponitur quando medica-
mentum Arabum est purgatorium.

Cardamomum, minus.

Capparis, cortex radiceis.

Coriandrū, Cuminum Aethyopicū, semē.

Centaurium, in purgantibus, minus: in aliis
maius.

Calaminthe montana: quia efficacior do-
mestica.

Costus cum reuera vnius sit generis ambi-
guitatem nō habet: Radix autem eliga-
tur: Nam dulcis costus arabū ignoratur.

Cypressus, pilulæ eius seu nuces recentes.

Cinnamomum, optimū & cum notis ante
scriptis.

Daucus, agrestis. Nam satius est pastinaca,
alimentum potius quàm medicamentum.

Helleborus albus Galeno, Niger Mesuæ.

Eruca, silvestris quia efficacior.

Epithymum Atticum Græcis. Arabicū Ara-
bicis compositionibus vsurpandum.

Fœniculus, semen: sed in colyriis, succus fo-
liorum aut radicum.

Galla, solida: quia efficacior, quā perforata.

Granatum, acidum.

Gummi, Arabicum. Id enim omnium per-
fec

fectissimum.

Gluten, ichthyocola his, aliis taurocolla,
aliis mastiche intelligitur.

Hyssopus, montana hortensi melior. Cili-
ciam Dios. creticam alii laudant.

Hyoscyamus, albus seu album eius semen.

Iris, radix ireos, Illiricae. Graecis, neotericis,
florentinae.

Lupinus, amarus, Nam dulcis esculentus est.

Laurus, folia.

Ligusticum, semen.

Lactuca, semen: sed in victus ratione, folia.

Lapathum, oxylapathum efficacius rotundo.

Lithargyrus, auri, quod aliquando tamen
exprimitur.

Mastiche, Chia: aliis etiam Aegyptia.

Marrubium, album praestantius nigro.

Mel apum, Alterum aëromeli, seu manna.

Margaritae, solidae meliores pertusis, nisi
etiam sint flavae, obscurae: quia tunc soli-
dis sunt pares.

Medulla ceruina in valenti medicamento:
in mitiori, vitulina.

Nuclei pini: aliis oliuae, dactyli Auicenne.

Nux iuglans, vsualis vulgo & communis.

Nasturtium, semen.

Oleum, olium, ex oliuis expressum.

Ozimum, in arabibus Caryophyllatum.

Opum, Thebaicum, Tamen Apulum etiam

hodie celebrari audio.

Petroselinū, Macedonicū: & in hoc astreoticum, à loco in Macedonia vbi crescit optimum in præruptis: & huius maxime semen.

Pruna, si aluus deicienda est, dulcia: si astringenda, acerba vel austera.

Papauer album, semen.

Piper album, quia acrius.

Pix liquida in suppurantibus & tergentibus medicamentis, sicca: in ficcantibus epuloticis, glutinantibus.

Pæonia mas, seu ipsius radix, vel semen.

Polypodium quernum, murale alii.

Polium, in antidotis, minus seu montanum quia acrius, amarius, ob id efficacius.

Quatuor emollientia, malua, althæa, viola nigra, acanthus.

Quatuor semina frigida maiora, melonum, cucumeris, cucurbitæ, citruli.

Quatuor semina frigida minora, lactuæ, portulacæ, intybi, cichorii.

Quatuor semina calida maiora, cumini, cari, anisi, fœniculi.

Quatuor semina calida minora, apii, dauci, ameos, amomi.

Quinque radices vreticæ, id est vrinam mouentes, apii, petroselini, asparagi, graminis, rusci seu apii, veri & eleoselini.

Ref

Resina, Galeno mactiche: Dioscoridi terebinthina.

Ruta, folia ruta agrestis, sed fere à Grecis exprimitur, aut alio nomine vocatur scilicet molybesa hermolao.

Raphanus, siluestris radix.

Rosmarinus, flos aut folia.

Rhus cortex fructus, sumach dicti.

Stoechas, stoechados Arabica: flos.

Styrax calamites, si habere possit, aut saltē calidissimus & vegetissimus.

Santalum, flauum, quia odoratius.

Spica nardi Indica.

Sulfur viuum, & igni non exustum.

Tragacantha alba, in frigidis compositionibus: rufa in calidis miscetur.

Tres flores cordiales, violarum, buglossi vtriusque.

Thymū Atticū, aut ex locis editis & ficcis.

Viola nigra, seu purpurea: vulgo martia & quadragesimalis: recens si haberi potest, folia: si emolliendum est, flos: si corroborandum, semen: si purgandum.

Viscum quernum, ipsius baccae recentis, aut recentis summa germina cum foliis & cortice.

Zizipha seu iuiubæ, recentia & bene matura, aut saltem integra, non putria aut vetustate exucca.

In summa, intelligantur omnia suis notis
prius dictis omnibus absoluta inter quas
etiam ratio regionis vbi medicamentum
educatum est habebatur, Ob id,

Alumen, Milesium	Anisum	} Cre- ticū.
Agaricus, Ponticus	Thymum	
Castorium, Pōticum	Daucus	
Misy, Cyprinum	Amaracus	
Nitrum, Berenicium	Glycyrriza	
Sinnon, Syriacus	Origanum	
Cuminū, Hispanū &	Dictamnus	

Aethiopicum

Meum, Hispanum & Macedonicum

Aristolochia, Pontica vel potius Cretica

Phu, Ponticum

Erugo, cerussa, æs, æris squamma, ex Puteo
lis vrbe Italiae.

Lithargyros, optima Romana & Sicula.

Antiballomena seu medicamenta in locum
alterius desiderati supposititia, magis cō-
sentanea rationi sunt loco

Aquæ pluuiæ, aqua fontana pura,

Acaciæ, succus & caro prunellorū agrestiu.

Asari, acorus vel carpesium.

Abinthii, Abrotanum.

Acāthæ Arabicæ seu Aegyptiæ herbæ (quæ
succha dicitur Serapioni) acantha leuco-
nostras, eidem dicta bedegar.

Alicacabi, semen solani.

Asp

Asphalthis, pix liquida Brutia.
Aethyopicae oleae lachrimae. i. gummi elem-
ni, gummi acacie seu gummi Arabicum.
Anchusae, hyacinthus.
Amyti, sicca farina.
Arsenici sandaracha.
Amygdali amari, absinthium.
Aristolochiae cuiusvis, una ex tribus.
Adipis vulpini, ursinus.
Adipis ceruini, anserinus.
Aluminis, salfositius.
Balauftii vice, malicorium.
Buccinorum, ostreorum testa vsta.
Balsami liquoris, myrrha stacte vel caphu-
relæon.
Cinamomi loco, casiae optimae, vel carpe-
sii, vel amomi, vel seminis cardamomi,
sabinæ duplum.
Casiae, seu casiae corticis, cinamomū etiam
ignobile, nisi optima casia requiratur
quæ cinamomo est proxima, vel nardus
indica, vel malobathri folium.
Chamæmeli florum, duplum foliorum &
radicum,
Costi, pyrethri dimidium, vel baccæ cedri,
vel radix helenii vel ireos.
Cimoliae terræ, retrimētum ferri & molæ.
Cerusæ, spodium, pompholix.
Caphuræ rei incognitæ & sapore ingratae,

santala alba & rubra.

Cardamomi maioris, minus : Calaminthe
omnis, metastru, pulegiu similia sunt facul
tatibus: ob id inuicem sunt antiballomena.

Croci, crocomagma.

Cyperii, iuniperus maior.

Cumini semen, ruta vel agni.

Colocynthidis, semen ricini.

Capparidis radicis corticis, cortex radicis Ta
maricis vel ericæ.

Dictamni loco, saluia, vel nepitha, vel pule
Doronici, caryophylli dimidiu. (gium.

Dauci, pastinaca.

Elaterii vice, succus folioru cucumeris agre
stis.

Ebeni, lignum gaiaci.

Eupatorii Mesuæ, asari & absinthii ana di
midium.

Folii loco, folium caryophylli, vel nardus
indica, vel casia, vel macis.

Ferruginis, squamma ferri.

Fimi palumbis, fimus columbæ.

Fellis suilli, fel perdicis, vel piscium.

Gentianæ loco, asari & radicis capparidis ana
dimidium.

Glycyrrhizæ succi, puluis radicis.

Gnidii cocci, semen lathyridis.

Galbani, sagapenum.

Ammoniaco loco, propolis.

Her

Hermodactyli, folium anchusæ, & dimidium bdellii foris admouetur dolentibus iuncturis.

Hederæ, gummi persici.

Iridis Illyricæ loco, helenium odoratum.

Lapidis Afsii, gagates.

Lapidis phrygii, magnes, pyrites.

Libystici seminis, semen dauci.

Lanariæ radicis, radix Veratri nigri.

Lycii, succus radicis centaurii magni.

Mellis loco, saccharum.

Malobathri, casia, nardus Indica.

Myrrhæ, smyrnium.

Myrrhæ Troglodyticæ, calamus odoratus.

Marrubii, melissophyllum.

Mespili tricoccia, id est, azaroli, mespilum nostras quinque ossibus præditum.

Nasturtii seminis loco, folia eius sicca.

Nucis moschata, spica nardi.

Nardi syriacæ, iuncus odoratus seu schœnanthum.

Opopanacis loco, ammoniacum, galbanum, sagapenum, bdellium.

Opii, meconium.

Ozimi caryophyllati, melissa in affectibus cordis.

Olei laurini, oleum cedrinum, vel cicinum.

Olei omphacini, ablutum oleum dulce.

Olei rosati, violatum, amygdalinum.

Ole

Olei cicini seu ricinini, raphaninum.

Opobalsami, apocalpason, vel myrrha^{sta}-
cta.

Orizæ, farina hordei.

Oesyti, medulla cerui.

Omphacii, succus rhois, id est sumach, vel vi-
num austerum.

Piperis longi loco, album.

Piperis albi nigrum optimum, id est grauif-
simum.

Petroselini Macedonici in Theriaca, alte-
rius regionis petroselinum.

Pompholygis, spodium & antispodium.

Rubiginis loco, scoria ferri.

Raphani feminis, succus.

Rosarum, flos ipsarum.

Rhois coriarii, rhus obsoniorum.

Staphydis agriæ loco, pyrethrum.

Struthii in sternutamētis helleborus albus.

Spodii antispodium aliquod, pompholix.

Styracis, castorium, nisi odor quæritur.

Salis indi, saccharum candefactum.

Sagapeni, ammoniacum.

Spumæ nitri, nitrum, aphrolitrum, modo
non sit in corpus recipiendum.

Sulphuris viui, coctum & vstum.

Satyrii, semen crucæ, scincus.

Sinapis, cardamomum, vel cardamum.

Scammonii, ricinus.

Stib

Stibii contusi, squamma æris, stannum
vstum.

Sepiæ ofsis, pumex.

Scillæ, pancratium.

Terebinthinæ loco, larix seu laricea re-
fina.

Thapsiæ succi, cardami vel erucæ semen fo-
ris, adhibetur.

Veratri albi loco, nigrum.

Vini salerni, quoduis fuluum, tenue, per lu-
cens, odorum vehementer.

Zingiberis loco, pyrethrum foris adhi-
betur.

Quia autē ratione pro desideratis istis,
alia hic ascripta supponi possunt: ita & con-
trā si quod horum suppositiorū desidere-
tur & aliorū est potestas, in horū vicem po-
nētur, potest quiuis alia multò plura pro va-
riis locis & effectibus & hominū propieta-
te facere antiballomena, sed nolim pharma-
copœo licere vel clementissimum mutare
sine docti medici consilio, ne audaculus fiat
etiā in aliis. Quomodo enim pluris est rex
ipse quam prorex: sic maiorū est virium &
cōpositioni propositæ aptius simplex quod
à maioribus est ascriptū, quàm quod illius
pœnuria supponitur. Sit itaque religiosus &
formidolosus in his permutationibus, tam
medicus quàm pharmacopœus.

De

DE MEDICA-
MENTORVM SIM-
PLICIVM PRAEPARA-
TIONE, LIBER
SECVNDVS.



AE C pharmacopœæ
pars vilis & hominis
eruditi ingenio indi-
gna nemini debet vi-
deri, cū medicamēto-
rū cōpositorū faculta-
tes propemodū totæ
ab hac proficiſcātur.

Quæ enim vis, q̄s vsus ſimpliciū medicamē-
torū citra triturā, coctionē, infuſionē, & alia
plæraq; poſt dicēda eſſe poſſit? Quæ miſtio
ad cōpoſitionē omnino neceſſaria ſine his
præparationū modis fiat? Quā autē faculta-
tes nō ſimpliciū modò, ſed etiā cōpoſitorū,
variēt, vel ſola præparādi ratione tā apertè
poſteā cōdiſces, vt neq; teſtibus, neq; demō-
ſtratiōe lōga opus ſit. Quoq; difficilius fuit
rē à nemine haſtenus notatā ceu nouā exci-
tare, & in hominū manus & animos ponere:
eò mea ſentētia erit & præclarius. Quāquā
enim Hippocrates, Galenus, aliiq; celebres
medici, vt interim empiricos taceā, leuiter

ſum

simplicium medicamentorum quorundam praeparationem attigerunt, & nonnullos se priores medicos de praeparandi ratione quaedam scripsisse testetur Galenus: tamen nullus hodie extat quem sciam, qui hac de re aliquid memoria dignum absoluerit: praeterquam quod pauca quaedam, sed tamen legi dignissima, de quatuor praeparandi generibus, tritura, coctione, vstione, infusione, Mesues in sua methodo deligendi medicamenta purgatoria & castigandi perstrinxit. Nam quae seruator nescio quis partim ex Dioscoride deprauauit, partim ex indoctis collegit quis ferat?

His nos rationibus commoti ex Hippocrate, Dioscoride, Galeno, aliisque permultis quorundam simplicium praeparationes passim dispersas, in ordinem congesimus, multas ipsi & inuenimus, & experti sumus, & a doctissimis hac aetate pharmacopoeis didicimus. Quae dum a nobis stilo mediocri scripta legis cadide lector, tecum reputa nos rudibus introducendis haec scribere, quorum captui seruire malui res nudas docere, quam singulorum rationem prolixius afferre: quauis & id ad rem propositam felicius absoluenda, plurimum pertinere videatur. Porro praeparationem exequi statui medicamentorum simplicium tantum, non aliarum etiam rerum per quas omnes, praeparationis ratio & virtus spargitur: ut

nihil à natura gignatur, augeatur, aut alio quouis modo moueatur citra præparationē: nihil artestā mechanicæ, quàm aliæ omnes tentant non adhibita prius præparatione aliqua, per quam ars sæpè naturam vincere videtur.

Medicamenta præparare est, ipsa per artem vsui vel cōpositioni cōmodiora reddere, hoc est vel mitiora, vel valentiora, vel gratiora, vel salubriora, vel magis miscibilia, & vt paucis dicam, meliora vel ad vtendum vel ad componendum. Quædam enim vbi à nobis sunt præparata, etiam citra cōpositionem mox vsurpamus. Plurima autē præparata antè vsum ad cōpositionem veniunt. Ad præparationis quoq; vim (de qua paulò post dicam fusius) reducendum putamus cum vnā medicamēti facultatem nobis in præsens noxiam tollimus, vel optatā detegimus, vel nouam acquirimus.

Lib. 9.
simpl.

At verò medicamēta omnis generis metallica inquā plantas, animantia, vel ex iisdē sæpè alimēta, paramus interdum adhuc viuētia frequētius emortua. Terrā enim lemniā (quæ dum adhuc in colle est ex quo effoditur, velut in matre viuere videtur) sacerdos Dianæ dum sumit sparso tritico & hordeo piamēta ritu patrio faciens præparare videtur, vt hinc magnam virium suarum parte,
nisi

nisi etiam vires suas omnes consequi putetur. Nonne arsenicum in sandarachā & fori in chalcitin, chalcitis in misy promptius in vena ipsa transibit si specum ipsum soli meridiano aperueris? Ratione eadē vomica hydragryri si in solem erumpat tenuior euaserit, & sulfur in vesuuio vel alio mōte vstum minus quidem oleosum sed tenuius euadit. An non longa & asperrima hieme, qua ventres ac viscera terrae plus calidi habēt, metalla omnia largius gigni & plenius augeri recipimus? Nam & mihi aureae quaedam velut arbores in durissimis quibusdam lapidibus visae sunt, & velut quaedam arbores ex auro & argento rudimenta, vt non ambigā quod docte Augerellus in chrysopoeia scripsit, metalla in momenta gigni, nutrirī, augeri, perfici, etiam si puteus Hannibalis, & metalla Iluæ Tyrtheni maris insulae inexhausta, & alia pleraque huius rei testimonia dare, fidemque facere poterant.

In fossam super collem in Cypro pluuiā *Lib. 9.*
recepta per venam misyos, chalciteos, so- *simpl.*
reos transfusa in specum subditum, quaedam est chalcanthi preparatio aut verius generatio.

Viuentem raphanum insertis in eius radicem fibris aliquot hellebori nigri, purgatricem facimus, & fructus arborum purga-

h

Mesues in torios scarificato ipsarum cortice quo tem-
canonibus pore salua conscendit & immisso in plagas
uniuersa- scammonio ceraque super vulnus data &
libus. de ligata.

Tempus præterea expectamus idoneum
 donec matura sint vel vigetia, vel sicca quæ
 lecturi sumus, & cælum plantæ propitium,
 sæpè etiam lunæ quadraturas spectamus, vt
 efficacior sit planta tunc collecta. Dum ar-
 bores ablaqueamus, dū vites putamus, propa-
 gamus, sarrimus, decacuminamus, festuca-
 mus: harum plantarū fructus non modo vbe-
 riores, sed etiam meliores reddimus.

Lib. 3. a- Idonea victus ratione nutricis lac præpa-
li. ramus, vbi nutritius affectu aliquo laborat,
 quomodo & asininum Galenus libro. 7.
 Meth. & vaccinum recessu Tabiarum li-
 bro. Meth. quinto. Porcos, capros, arie-
 tes, tauros iuuenescitramus, vt eorum ca-
 ro sit suauior, plenioris alimenti, coctu
 facilior.

Glandulæ mammarum præsertim vacci-
 narum & suillarum dum lacte suo tument,
 meliores quam exuccæ: vnde & sume por-
 cæ recens foetæ à ganeonibus laudatum le-
 gimus.

Ibidem. Coagulum in primo ventriculo anima-
 lium lacte nutritorum ex lactis corruptio-
 ne genitum venatu animalis efficacius eua-
 dit,

dit, vt animalium prope omnium, non solum ferorum caro.

Gallum veterem venatu quoque exercemus, & meliorem ad purgandum clementer suo succo nitroso reddimus. Vulpes ætate florentes venatu multò fatigatas si bene habitas, si oleo incoquimus, multo digerentius oleum efficimus. Si verò eas vuis impinguatas post vindemias capimus, esu sunt iucundiores.

Porci segetibus nutriti firma fiunt carne, glandibus verò præsertim faginis, laxa & fluxili & prompte liquabili.

Hircum quadrimum dum mensibus aliquot antequam iugulemus, herbis nutrimus calculum frangentibus, & vino albo generoso potamus, hoc modo sanguinem eius ad calculos in renibus præsertim comminendos efficacissimum paramus.

Caneros dum Aeschrion capiebat & vrebatur post canis ortum, sole leonem ingressò, die verò lunæ eius decimo octauo, contra rabiem hac ratione efficaciores sperabat, hocque modo præparabat.

Viperas nō mox vbi latebris erepserāt, sed iam exercitas, iam consueto ante hiemē alimento recreatas, iam suo exuuio inter lapidū coagmēta deposito, velut rediuuias Galenus vult capi, sicque præparare incipit.

Pullas & capos iure & carne viperarum cum pane subactis nutriuit Matthæus Gradi. ad vsque deplumationem curaturus horum esu elephanticos.

Lib. 3. ali.

Gallinacius pane in lac acidum & serosum merso si ante nutrimus quā iugulemus, vt testes habeant gratissimos & præstantissimos, & si ante costum ne virus ex semine oleant. Sic enim boni sunt succi, valide nutriunt, facillè coquentur ibidem.

Hepar *συνάτον*, id est ficatum præsertim suum ficis ficcis multis nutritorum est præstantissimum, sic pastum iecur anseris albi, seu iecur anseris nutriti alimentis lacte imbutis suauius, coctū facilius, melioris succi.

Ibidem.

Capra aut aliud animal scammoniū aut tithymalos depastum, lac reddit phlegmogum, & quod aluo pituitam deducat.

Ibidem.

Lib. 3.

ali.

Lib. 2.

simpl.

Stercus pueri ad anginam idoneis alimentis, & sterus canis ad alia esu ossium in viuis ipsis animalibus præparamus, & alia in his generibus plurima. Sed ad hanc rem hæc sufficiant ad probandum quædam nos cum natura viuis adhuc medicamentis præparare. Cum verò hæc præparandi ratio, licet sit efficacior, tamen haud ita crebro in vsum venit, vt fortasse quis etiam præparationis nomine non esse accipiendam contendere possit: ob id de altera eius specie agamus,

mus, quæ omnino latissimè patet in singulis medicamentorum simplicium generibus. Fit autem hæc generatim quidem additione & ablatione, nunc substantiæ nunc facultatis, nunc vtriusque, particulatim verò tritura, coctione, affatione, vstione & cæteris post scribendis.

Ad ablationem verò reduci volo separationem partium nunc simul manentium, vt in tritura, nunc à se inuicem abeuntium vt in despumatione, destillatione, succorum & liquorum extractione.

In singulis autem differentiis quæ additio aut ablatio, aut additio & ablatio, vel substantiæ vel qualitatis, & eius vel vnius vel multiplicis fiat, abunde postea docebimus.

Nunc hæc omnes præparandi differentie quam facultatem habeant, & quibus modis perficiantur, singulatim dicamus, primumq; de tritura omnibus prope communi non simplicibus solis, sed etiam aliis præparationibus, postea de his quæ calore perficiuntur, deinde frigore, post hæc siccatione, Hinc humectatione & cæteris post elencho comprehensis.

DE MEDICAMENTORVM

simplicium tritura.

MEDICAMENTA teruntur, hoc est Mesues in comminuuntur, percussu vel friatu canonibus

idoneo, vt simul misceri exactius possint, vel vt facultas ipsis noua conquiratur, vel vt malefica tollatur. Quos tres terendi scopos in methodo medicamenta componendi fusius explicauimus. Terendi autem modus plurimum est varius. Primum quod plurima pistillo ferreo, æreo, plumbeo, vitreo, ligneo vel alia constante materia in mortario fere simili materia conflato teruntur: sed pistillus ferreus & æreus mortario ferreo & æreo magis feruiunt: iisdem & lapideo & vitreo mortario etiam ligneus, sed plumbeus plūbeo, vitreus vitreo est aptior.

Secundo loco multa teruntur diu ducta super lapidem durum, & marmoreum, porphyrium vulgò dictum: marinum, quem maris squammam vocant. Ducuntur autem simili lapide sed paruo & manu concepto, quem molulam vulgò vocamus, quòd molæ paruae is effigiem habeat, vt lapis suppositus, magnæ.

Tertio teruntur medicamenta quædam molis, trusatilibus vel versatilibus, vt quædam etiam mole trinarum molis, qui modus Lugduni est frequens in terendis aromatibus, quibus constant puluis minutarum specierum, & puluis selectus, quem finem vocant, & alii permulti suo cuique more commisti. De hoc non sum dictu-

rus, sed de primo praesertim, & pauca de secundo.

Nec omittendum mortarii operculum saltem simplex aut etiam duplex, quale veteribus in usu fuisse in nostra componendi medicamenta methodo commemorauimus, praesertim puluerantibus. Nam humida hoc non indigere videntur. Ad trituram quae praeparandi species reducende sint, ceu ipsi affines, posterius audies: vt quod quaedam rapaci serra comminuuntur, alia minutim conciduntur, vt promptius teri possint, vel humori cui incoquuntur vires suas tradere.

Non modo autem instrumentis variat terendi modus, sed etiam ipsius percussione vigore & tempore, & rerum terendarum situ, & connexione, & futura consistentia. Quaedam enim per se omnino sunt terenda, alia cum aliis quibusdam, ipsorum trituram saepe etiam facultatem iuuantibus: alia tum per se, tum cum quibusuis teri possunt, & hac omnia tenuissime vel crassius. Item quaedam diu terenda sunt, alia trituram breuem vti & decoctionem sustinent. Item alia valenter tundenda, alia tantum clementer frianda, ducto per mortarium molliter & nunc celeriter nunc segniter pistillo, interdum & valenter.

Prætereà attritu cuiq; moderato nō autē vehementiore aut immodico sunt verberanda. Violento enim ictu & nimis diuturno examinātur, viribusq; dissolutis lāguēt, magis tamē tenuia, rara, facultatem imbecillē aut superficiariā sortita, minus contraria.

De his autem omnibus agam singulatim, vbi docuero quibus horum modis, & quot singula medicamentorum simplicium genera terantur initio à radicibus sumpto.

*Commu-
nistritura
radicis.* Radicis si crassæ sint nec adeò siccæ in particulas sectæ, & aliis ficcioribus particulatim adiectæ, multis scilicet paucæ, pulverantur cum ipsis: si autem ficciores sunt, aut per se aut simul pulverari possunt sed ante vel cultello concisæ, aut forficibus aut manibus fractæ, nisi si quas ante ad ficcandi necessitatem consideramus in taleolas.

Diutius autem terendæ sunt quæ crassæ, duræ, solidæ, densæ, nervosæ, membranosæ, & fractu contumaces, si in pulverem molliissimum comminui consilium est. Interdum enim minus teri volumus, præsertim dum ad coctionem tantum eas apparamus. Tales fere sunt radix acori vtriusq;, omnis aristolochiæ, althææ, bryoniæ, costi, helelij, gentianæ, polypodii.

Parum diu verò terantur cōtrariæ, etiam si leuissimum pulverem requiris: quales sunt

radix calami odorati officinarū, hellebori
vtriusque, hermodactylorum, pyretri, &
mediocriter quæ in harum sunt medio ra-
dices, vt apii, asparagi turbith, behē vtriusq;,
dictamni vulgaris, doronici, fœniculi, galan-
gæ, glycyrrhizę, graminis, ireos, petroselinii,
pœoniæ vtriusque, Rha barbari.

Herbæ item teruntur, nunc virides nunc
siccæ, & ambæ vel crudæ vel coctæ, vel *Herbarū.*
crudæ semel, iterum post coctionem, idque
in vsus varios. Nam virides ferè teruntur
in succum vel cataplasma crudum, coctæ ve-
rò teruntur, vt vel in apozema exprimantur,
vel in cataplasma cernantur, præsertim
si quid durum aut lignosum sint sortitæ.
At siccæ teruntur nunc in coctionem sed ne-
gligentius: nunc in puluerem, diutius qui-
dem crassæ, duræ, densæ, lignosæ, lentæ
minus contrariæ. Quæ dum ad consisten-
tiam qua cerni possint cribro hoc, illo pro-
scopis medicorum variis, peruenerint, teri
desinunt.

Herbæ tamen propemodum omnes an-
te vel secantur, vel manibus franguntur quàm
terantur: terunturque ferè mediocriter, &
cum foliis interdum, etiam cum floribus.
Sed tunc paulò minus diu terendæ, vt &
adiatha omnia, calaminthe, maiorana. ori-
ganum, rosmarinus, thymum, præsertim cum

hæc postrema sunt florulenta.

Florum.

Flores prope omnes siccati, parum diu terendi, quia cito puluerantur, & facile puluerando exanimantur ac exhalant.

Vt crocus	Nymphææ vtriufq;
Epithymum Græcorum & Arabum	Periclymeni
Genistæ flos,	Rosarum omnium
Leucoiorum omniū,	Schoenuanthos
Meliloti,	si ipsum haberi possit.
Rorismarini,	

Si verò cum herbis ipsis expetantur, flores paulò diutius propter herbas & harum furculos, quibus hærent adhuc, terendi sunt, quam si ab his essent secreti, vt absinthii coma, anethi coma, abrotani coma, chamædrys, chamæpitis, eufragia, melilotus.

Adde quòd floris nomine hoc loco venit non modo quod in medio est, magna ex parte croci capillamentis simile, sed etiam folia id ipsum ambientia, nunc alba, vt in chamæmelo, nymphæa alba, rosa alba & moschata: nunc lutea, vt in nymphæa lutea, chrysanthemo: nunc rubra, vt in rosa rubra, in balustio: nisi quòd croci nomine tantum capillamenta (quod ea in vsu sint sola) intelliguntur: vti & Galenus sæpe in comp. ph. p. florem rosarum appellat, non folia illa ampla, sed in medio capillamenta.

Mu

Multum autem terenda sunt chamæmelum, quanquam id essentiae tenuis sit, quia tamen densum est, & odore vegeto ac diuturno: ac etiam stœchas Arabica vulgo dicta, ut etiam cum primis, ut Turbith, coëptateri, ad postremum adhuc semitrita appareat, & item heliochrysos, stœchas citri vulgo appellata, & spica nardi, in quacunque plantarum partem reponatur, etiam si prius minutissimè incidatur.

Balaustium quoque, diu teri debet ob lignosa sua folia, quod autem intus est fibrosum si per se terendum sit, promptius multò dissolvitur.

Capparis flos, siue adhuc gemma sit, siue iam apertus, siue iam in fructum seminis plenum excrevit, ferè muria conditus in usum venit, & eius loco flos genistæ aceto & sale conditus.

Si tamen siccat, mediocriter diu teretur, & flos lupi salictarii foliosus, qualis etiam ulmo est.

Caryophylla crassæ substantiæ ægre teruntur, siue flores sint, siue aliud.

Rosæ igni vel sole inter papyros siccata, forpicibus minutim confusa, per se aut cum aliis teruntur: cum aliis autem etiam citra siccationem illam, atque adeò recentes solum sectæ, quomodo & quosdam incidere non

non terere tamen, vt faccharum rosatum fiat, scribit Mesues. Cum verò specimen edis, ne ficca: sed cum aliis tere, vt vites calumniam.

Fructuum Semina prope vniuersa medio inter radi
& semin. ces & herbas modo puluerari desiderāt. Ob id cum omnia hæc simul terenda veniunt radicibus iam cœptis comminui, semina iniiciantur, quibus etiam abunde iam comminutis, herbæ minutim concisæ adiiciuntur, & omnia simul conteruntur.

Talia sunt	Eruum
Agnus, Apium	Erysimum
Amomum	Fœnum Græcum
Anisum	Linum
Anethum	Lithospermum
Ammi	Lupinus
Basilicum	Lens
Carum	Melanthium
Cardamomum	Psyllium
Coriandrum	Papauer
Cuminum quando autē	Seseli
vreticū volumus mul	Staphys agria
tum territur	Sinapi
Coccus baphica	Thlaspi
Eruca	Vrtica

Et ex fructibus pilulæ cupressi, colocyn-
 thidis medulla ficcata & minutim secta,
 Carpobalsamū, cubebæ, galla, nux moscha-
 ta,

ta, piper, & præter hos dactyli, iuniperi bac-
cæ, ficus, zizipha, mixa, pruna passa, vuæ pas-
sæ: quanquam fructus hi molles sint, purga-
ti tamen nucleo & incisi cum aliis quo dixi
ordine teruntur, si in compositionem ve-
niant: & in puluerem abeunt, si pauci siccio-
ribus multis miscentur, aut triti cernuntur
per cribrum magnum, aut cochleari ad mol-
lem medicamenti formam, vt dactyli in dia-
phœnico.

Myrobalanos verò omnes multum te-
nuerit conteri iubet Mesues, quando ea-
rum substantiam in corpus rapi volumus, &
viscera ipsa astringere, & contrahendo ve-
lut obstruere consilium est. Eadem ratio-
ne rhabbarum.

Siccata diu in sole semina cucumeris, cu-
curbitæ, melonum & similia, quæ postea cul-
tello concidi docebimus, per se in farinam
puluerantur.

Ex seminibus autem coriandrū, carda-
momum iam maius, id est, granum paradisi,
quam minus, lithospermum, & cuminum, vt
fit vreticū, & ex fructibus myrobalani Ara-
bum omnes vt nuper dixi, ac folliculi sennæ,
tam diu quàm radices ipsæ teri postulāt: ob
id cum ipsis inticienda.

Quæ verò seminum vel fructuū medul-
læ sunt oleosæ, vel cultello super papyrum
ide

identidem mutandam incidantur, vel cum saccharo purissimo & siccissimo pauco seorsum terantur. Tales sunt medulla seminis cucumeris, cucurbitæ, citreoli, melonis, bombacis, cnici, staphylos agriæ, & fructuum medullæ, amygdalarum, anacardorum, balani myrsicæ, pineorum nucleorum, pistatorum, castaneæ, auellanae.

Nux autem moschata ferè postrema iniicitur, vt in puluerè minutarum specierum. Nam si prima iniiciatur, reliqua puluerari prohibet, suo lentore oleagino.

Semina prædicta incidi solita, si humidis miscenda sunt, per se teri possunt, si siccis, cum horum multacopia semina hæc pauca teri possunt, vt succus glycyrrizæ, bdellium, succi, liquores prius particulatim concisi, possunt etiam (vt dixi) diu insolati per se puluerari.

In diaprurno quoque semina frigida maiora & similia si addantur, cum saccharo multo hæc pauca teri possunt: sic in diaphœnice amygdalæ possunt incidi, vel cum saccharo teri. Sic papaueris semen quidam per se parum prius in mortario quassant, vt verberatum excipiat cultelli. Deinde cultello, vt prædicta incidunt.

Hæ verò medullæ si cōpositis cardiacis sint miscendæ, vtendi tempore incidantur &
mi

misceantur potius quàm cum aliis terantur. Nam vix bene mensem vnum seruantur integræ, sed rancescunt, & compositum viti-
tiant, nisi parcum sit compositum, & mox
absumendum.

Succi ficcati, liquores, gummi, resinæ si *Succorum*
recentes sunt, ob id humidi & moles, electa & *aliarū*
riis mollibus, catapotiiis, vnguentis, ceratis, *plāte par*
emplastris per se misceri possunt, vel cum *tium tritu*
aliis mollita & subacta, vel aliquo hīs reme-
diis idoneo humore soluta.

Vbi verò iam paulò mediocribus ficcio-
res euaserunt, vt iam comminui possint, in
mortario, interdum quidam horum frian-
tur magis attritu blando pistilli, præsertim
calfacti clementerque ducti per fundum &
latera mortarii, quàm verberando tundan-
tur. Nam sub violento ictu lateescunt, mor-
tarioq; contumaciter hærent lentore omni-
bus communi, his tamen maiore quàm illis,
ac exhalant, exanimanturq;. Quod si immo-
dicè, ficcata sint, quanquā tunc facilius pul-
uerantur, tamen velut exanimata, & viri-
bus priuata reficiuntur.

De moderate ficcis igitur aut paulò fic-
cioribus nobis sermo est futurus.

Scammoniū igitur (est enim id aliquan-
do succus, vt etiam Mesues docuit, sed mul-
to inferius scāmonio liquore) & si qui simi-
les

les succi ad consistentiam tam corpulentam
siccando ducuntur, per se friando in morta-
ria teri possunt: sed ferè longius requirunt
tempus, & si parua sit copia, bonam sui par-
tem mortario affixam relinquūt: quod da-
mnum in magna mole negligimus, tamen
multò satius est in eo mortario prius amy-
gdalas triuisse, præsertim vetustate oleagi-
nas, quæ suo lentore liquido succos adhære
re prohibeant. Id quod pistillus oleo intin-
ctus, vel oleum paucum mortario infusum
& aliquandiu pistillo ductum per mortarii
fundum, & latera præstabit diutius & feli-
cius. Sit autem oleum vel dulce, vel amy-
gdalarum dulciū, nisi succus astringens om-
phacinum magis postularit. Id verò oleum
succos adhærere non modo prohibet, sed
virtutem ipsorum exhalare, & pollinem te-
nuissimū euolare nō permittit. Adde quod
trituram & breuiorem & commodiorem
& faciliorem reddit: Qualem vim Galenus
opobalsamo tribuit interenda Theriace.
Acacia tamen nostras etiam ficcior frangi
contumax est, vt minutim sit potius con-
cidenda, & particulatim miscenda pulue-
randis aliis.

Aloë verò cum friādo teratur, percutien-
do autem hæreat mortario, verum est Me-
sue de ipsa dictum quod friabilis fit simul

&

& tenax ac glutinosa, quod etiā digitis explorabis. His enim friabilis est, ac his haret ante & post friationem.

Succus glycyrrhyzæ, & hypocistis, & lyciū nostras pistillo calfacto siccatur & friatur, nisi admodum sint recentia & præhumida, vel minutim secta: tunc additur, cū aliis puluerisatur, cum ea sunt iā cerni apta, alioqui semitrita in composito apparent.

Ex liquoribus quoque qui sunt sicciores ac minus glutinosi, per se friari possunt, ut opus Cyrenaicus, euphorbiū, thapsia, & (ut dixi) scammonium cum oleo amygdalarū dulcium friatur, non teritur.

Opium verò cum aliis siccoribus particulatim iniectum comminuitur, ut cum humidioribus dissolvitur, quomodo opopanax, galbanum, hanimoniacum, sagapenum, si pauca quantitate multis aliis siccoribus particulatim coniiciantur, cum his puluerantur, ut in hiera diacolocyntidos sicca, alioqui humore aliquo idoneo, ut aceto, vino dissoluenda, & calfacta colantur, post percoquuntur ad competentem rei propositæ consistentiam.

Purgata eadem à lignis & cæteris excrementis pistillo calido quibusdam molliuntur ad fingenda cata potia, & emplastra: sed hoc modo ferè impuram reddunt compo-

sitionem. Vel dissoluuntur humore idoneo, & colantur per stamen. Sed tunc quantum excrementi colando sit abiiciendum coniecta, & ob id largiora quam scriptura postulabit dissolue.

Lachrimæ denique tam resinosæ, vt mastiche, terebinthina, pinea, laricea, abietina, strobilina, colophonia: quam gummosæ, vt gummi Arabicum, tragacantha, cancamum, myrrha, bdellium, styrax, sarcocolla, thus, succinum, gummi, amygdalorū amborum, cerasi, pruni, hederæ, iuniperi, multum ficcata, si iādo per se, aut cum aliis excepta mastiche & pinea, puluerantur: vt caphura quoque, sine ea sit gūmi, siue succus, siue factitium aliquid: Eadem verò lachrimæ recentes aliis liquidioribus, excepta mastiche, mistæ dissoluuntur, vel medicamenta alia paulò ficciora dissolunt.

Quod si lachrimarum aliquæ suo lento re mortario hareāt, oleo paucio ipsum prius illinendum est, vt si myrrham veram nec vetustate ita exuccam teris: nobis enim consuetior myrrha, maximè est per se puluerabilis Adde quod mastichæ ficciori ne exhalet aut euolet, aquæ rosaceæ paululum affundi potest, & aliis horum ob ficitatem maximè friabilibus. In emplastra tamen satius est mastichen & myrrham puluer

uerare.

Ad hæc gummi Arabicum & tragacantha, si prius pistillum & mortarium calefeceris, multò promptius friando puluerantur. Citius adhuc si paucum aquæ vitæ immitas.

Thus teritur solum non resoluitur quibusdam, sed aqua & aceto resolui in emplastro consistentiâ & oleo, sed tunc coalescere grumis non potuit.

Mastiche teritur cum paucò oleo in catapotis Hermetis ex trociscis colocynthidis.

Myrrha vera primo die crassius teritur, post die tenuissime pulueratur: sic bdellium, thus, vtrunque siccius, sarcocolla, styrax, euphorbium, ladanum tempore aut pistillo & mortario calido siccatum pulueratur, recens verò soluitur oleo calente, vel alio liquore idoneo.

T R I T V R A L I G N O R V M

et Corticum.

LI G N A vt agallochū, aspalathū, gaia-
lū, santala, xylobalsamū, & lignorū
cortices, vt cinamomū, cassia, cortex radice
oxyacanthæ, tamaricis, capparis, quātū radi-
ces teri postulant: stipitum eadem ratio est
& malicorii, quod est mali granati cor-

tex lignosus, sed macis: moschatae nucis cortex mediocriter diu terendum est.

Corticis autem radicum apii, petroselini, foeniculi, raphani, similiū herbarum tritura in herbis ipsis est declarata. Turbith mediocriter terendum Mesuae est.

Ne mireris, autem cinamomum omnium æque calidorum tenuissima substantia præditum, diu terendum. Id enim fit, quia interno cortice multum fibroso & nervoso est fractu contumaci.

METALLICORVM ET TER-
reorum Tritura.

Lib. 3. c.
ph. g.

METALLICA omnia quia terrestri sunt substantiæ ob id crassarum partium, in profundum, ut ad punctum nervum penetrare non possunt.

Quapropter illis tenuitatem comparamus, subigentes diu in sole æstiuo cum aceto vetustissimo, acerimo, tenuissimo (quod fit ex vino non austero) vini qualitatem, nihil vel minimum gustu referente: quæ quanto pluribus diebus teruntur, tanto sunt tenuiora, ob id melius purgāt, tenuant, siccāt.

Ex vino autem similiter trita, dein sicca ta sole, vel si aliud est tempus, igni, sunt meliora ducendiscatricibus.

Lithargyros friatur, nō tunditur, ne plumbum eius si chrysitis est parcus, si argyritis

largius late scat, quod cernendo per pannum rarissimum remanet: scoria autem eius lotionem separatur, & sic emplastra fiunt alba.

Lapis armenus si inuenitur, ad lotionem teratur in mortario lapideo, idque diu satis: sed lapis cyanus seu stellatus longiorem sustinet trituram Mesuae. Teruntur in mortario marmoreo albo prius per se vniones, corallia, ne odorem, colorem, saporem, alium trahant. Lapidum preciosorum saphyri, hyacinthi, granati, smaragdi fragmenta postea super lapidem porphyrium affusa pauca aqua rosarum, vel borraginis vel buglossi tenuissime friantur. Sic enim fit ut promptè distribui possint, nec obstruant, adhuc nullam mortarii partem terendo deradunt, quæ puluerem augeat. Qua de causa etiam Galenus simplicia ad theriacam in pila Aegyptia durissima conteri iubet. Per se etiam teretur vnguis odoratus.

Partes animalium, aut animalia tota si Tritura affatione, vel vstione, vel aliter multum sic partium catæ sint, puluerantur aliorum modo: si humida & molles sunt, paucae cum multis sic- animalis.
cioribus teri possunt, aut sine his teruntur, & per cribrum cochleari cernuntur. Quædam etiam liquari possunt, ut adipēs, me-

dullæ resypus, deinde colari.

Stercus canum, luporum, infantum ficcatum etiam puluerabile est, & cantharides repositæ & castorium ficius, sed inefficacius, & cancri fluuiatiles vsti, hirundines vstæ, lepus vstus, renes icinctoriū sicci, iecur lupi ficcatum, pulmo vulpis ficcatus.

Fel autem ferè aliis ficiioribus dissoluen-
dis miscetur, raro ficcatur.

De vnionibus qui sunt velut concharum quarūdam partes dictum prius est, & de vngue odorato. Sanguis hirci ficcatus faciliè pulueratur.

Dentes apri, lucii, elephantis limandi aut radendi, post terendi potius quàm vrendi, si vires eorū integriores postulas: sic ossa alia & cornua, vngulæ. Tamen hæc vrenda interdum, vt in vstione audies.

Ambra interdum minutim concisa iniicitur in humorem calidum, vt in eo lique-
tur, vt in Anti. diacoccu baphices interdum teritur, deinde dissoluitur affusa aqua rosarum, vt in Anti. alepto moschata, & in aliis multis, interdum prius in mortario teruntur duæ tres amygdalæ, sic moschus caphura.

Os à corde cerui, ebur, pudendum cerui, tauri, cornu cerui, rhinocerotis, & similia prius rasa, post concisa minutim cum aliis
ter

teruntur, quædam etiam vsta promptè pul-
uerantur.

N V N C A D I D Q V O D I N I T I O
proposuimus reuertamur.

*Terenda
per se.*

P E R se terenda sunt primum metallica
omnia & terrea, vt lithargyros, arseni-
con, sandaracha, æs vstum, squamina æris,
scoria æris, ærugo, chalcitis, fori, misy, me-
lanteria, chalcanthum, cadmea, pompholix,
spodium, si hæc duo non sunt satis læuia, plu-
bum vstum, cerussa, sulfur, alumen, nitrum,
sal quiuis, stimmi, chrysocolia, gypsum, pu-
mex, cyanus lapis, armenus ladi, calx, lapis
spongiæ, iudaicus, smyris, ætites, magnes,
hæmatites, ametistus, amianthus, gagates,
iaspis, sapphyrus, hyacinthus, pyropus, era-
nus, sigillum lemnium, terra Cimolia, Cre-
tica, Armenia, corallium quoduis. Potest ta-
men simul metallica multa aut terrea tere-
re, non autem cum partibus plantarum, aut
animalium. Hæc autem ferè teruntur super
marmoreum lapidem, aut porphyrium, aut
marinum, aut alium similiter durum.

Possunt tamen & in mortario teri par-
tes plantarū similiter duræ, anacardi in con-
fectione anacardina Mesuæ.

Aloë, scammonium, saccharum & sac-
charata, penidia: nam alia reddit glutinosa

faccharum, & ea teri prohibet mastiche.

Rha barbarum.

Spodium Arabum. Caphura.

Gummi Arabicum & sarcocolla.

Tragacantha, thus magis, sed tragacantha incisa etiam cum aliis teritur ne euolet.

Ambra, moschus, Schœnuanthos & festuago, crocus.

Semina pusilla, ut papaueris.

Hyoscyami, maioranæ, portulacæ, amomi vulgaris. Hæc enim si cum aliis terentur, pistillum eludunt, præsertim quæ cum paruitate sunt læuia, & propè integra manent. Illorum autem pars bona, si cum aliis durioribus & teri contumacibus terantur, euolant & exhalant, priusquam sint propè cōminuta.

Animalium partes duræ vstæ, vel rasæ vel limatæ, ossa, dentes, cornua, ungulæ ebur, spodium vulgi vel est ebur, vel os elephantis, vel alterius grandis animalis vstum, ventriculus interior gallinarum, res Galeno damnata, cerebella passerum siccata, iecur lupi siccatum, pulmo vulpis siccatus, stercus canum, & luporum & infantis, mumia, pissasphaltum Dioscoridis putata, sanguis hirci siccatus, sanguis draconis dictus, cantharides, sericum vstum, vel incisum, moschus, margaritæ, testæ ouorum, ostreorum vstæ, vel limitæ per se teruntur.

Cum

Cum aliis quibusdam sæpe ipsorum trituram, sæpe etiam facultatem, colorē, odorem iuuantibus teruntur simplicia plurima, & composita quædam, vt moschus, ambar, mastiche ficcior, & alia eiusdem generis ob ficcitatem friabilia, teruntur aqua rosacea pauca affusa ne portio tenuior euolet. Sunt qui & mastichæ oleum nucum affundunt, vt in catapotiiis Hermetis apud Mesuen.

Cummi Arabicum & tragacantha citius teruntur aqua dulci, rosata, vini, seu vitæ pauca affusa si affectus non repugnet: aut pistillo & mortario calefactis ad promptiorem ficcationem, hincque albio-
ra euadunt.

Tragacantha etiam, vt os à corde cerui, rasura eboris, cornu cerui & similia minutim concisa, etiam cum aliis ficcioribus teri potest.

Tragacantha verò & penidia si mortario & pistillo bene ficcis cum aliis terentur, minus eorum perit & exilit.

Myrobalani ficcæ quales ad nos ferè aduehuntur, affuso pauco oleo meliores redduntur, non exhalant, promptius teruntur: vix item passæ & mel cum ipsis tritum ne ventri hereant & ipsum corrugent, impediunt.

Scammonium cum oleo amygdalarum
dulcium friatur.

Colocynthis medulla prius modice pi-
stillo fracta, vel potius minutim forpicibus
incisa teritur affuso paulatim oleo pauco
dulci, vel amygdalarum dulcium, vel rosa-
to. Sunt qui ipsum pistillo vel mortario al-
linunt, alii amygdalas aliquot prius in mor-
tario terunt, alii papyro inuolutam sole ar-
denti vel igni è longinquo parum diu sic-
cant, vt crocum, rosas. Postea etiam per se fa-
cilius puluerant, vel cum aliis siccis siccata
forpicibusque sectam terunt. Aliis in troci-
schos prius fingunt, quales allandal Arabes
vocant, priusquam puluerent.

Quæ necessitas agarico adest, prius enim
ferra quadam rapaci negligenter separatur,
post cum vino albo pauco quo zingiber pur-
gatum sit maceratum in trociscos for-
matur, siccatur in umbra, pyxide vitrea
reponitur, & cum opus est friando læuissi-
mè pulueratur.

Caphura teritur in mortario, cui duæ aut
tres amygdalæ prius fuerint astrictæ, aut
in eo tritu, aut ipsarum oleum pistillo &
mortario paucum sit illitū ne terendo euo-
let ac exhalet.

Turbith quia per se tritum latefcit (est
enim gummosum si legitimum est) vbi est
mod

modice confractum, alia ei sicciora sunt miscenda cum quibus teratur, vt piper, zingiber, & cætera in diaphœnico & electario. Indo vtroq; Per se autē cum amygdalis, vel oleo amygdalino pauco teritur ne exhalet.

Sericum crudū, incisum facilē teritur mistis tribus aut quatuor amygdalis, ipsum ne subteifugiat lentore suo cōtinentibus, & pistillo sistētibus. Sunt qui papyro inuolutum sole vel igni parū siccant, post minutim cōcidunt, & cum aliis leuissime terunt.

Cinnamomum cum paucis amygdalis terunt quidem in hippocraticum quod vocāt vinum, ne odoris gratia expiret.

Rha barbarum cum amygdalis facilius *Florum.* quidē teritur, nec euolat nec exhalat, sed minus fit purgatoriū: vt crocus iura minus tingit si ex oleo teratur, id quod quibusdā pro secreto est. Crocū enim ad iuriū, carniū & aliorū ciborum cōdiementum, vel etiam ad frontes librorū tingēdas nouo quodam modo terunt. Papyro enim interpositum, vel sine hac sartagini impositum ignique admotum longule, sed parum diu, vel soli diutius siccāt, vt villosa eius natura prōptius teiēdo rumpatur. Ne verò exhalet, ac vt promptius teratur, & coloratior euadat, olei dulcis auxillum vt guttas. 4. s. in vncias singulas affundunt, vel pistillo illinunt interdū tā largit

giter vt improbè rubeat, ob idque ab archi-
pharmacis damnatur. Sed vt fit coloratior,
minus tamen tingere putatur quàm qui sine
oleo tritus sit.

Opulentis, verò cum saccharo pauco
potius teritur, si verò humorem alium
olei loco acceperit, etiam coloratior eua-
dit, sed humore in vaporem soluto flau-
riem natiuam repetit, & minus vulgo pro-
batur. Verumtamen croco nostrati hoc
mangonio ad coloris gratiam opus est, ceu
parum cocto ob soli & cæli naturam fri-
gidior. Qui verò crocus à Galeno lau-
datus est colore flauissimo, odore vege-
tissimo, etiam diu postquam seruari cœ-
pit, acquisitio hoc colore non indiget.
Crocus verò vt spica, macis, colocynthis,
sericum, rosa, & alia plurima ante trituram
inciditur.

Euphorbium dum teritur per se pului-
sculo acerrimo in nares euolante & oculos,
has partes valenter mordet, sternutamen-
toq; implacato hominem torquet, ob id ea
molestia nouitios fatigat, vt sæpe illis nares
sanguine fluant, plurimis caput vehementer
doleat. Has autè ab euphorbio noxas prohi-
bebis, si oleum paucum aut amygdalas mi-
scueris, quæ lentore suo etiam puluisculum
illigent ac retineant.

Sun

Sunt qui myrrham, bdellium, cancamum, gummi hederæ etiam ex oleo terant, ne tenuior portio euolet ac virtus exhalet, neue mortario hæreant.

Opopanax, galbanum, ammoniacum, sagapenum, bdellium, ladanum, acacia vulgaris, opium, hypocystis, asphaltum, ficior terebinthina, qualis frequens Venetias conuehitur, & alia non pauca succorum liquorum & lachrimarum genera, vel minus siccata, quam vt per se puluerari queant, vel neruosa & velut membranosa & coreacea, & fractu contumacia cum aliis ficcioribus teruntur, sed prius incisa, vel aliter in portiones paruas redacta, quantitate tamen parua multitudini aliorum ficciorum immista paulatim cum illis puluerantur, vt in hiera diacolocyntidos, & aliis compositionibus multis, sic Crocus, flores etiam recentes buglossi, vtriusque, rosarum & cæterorum. Sic Trocisci Galliæ moschata & alii, sic Dactyli intus & foris purgati, ficus, vuæ passæ, myxa, zizypha passa, baccæ lauri, myrti, iuniperi, oxyacanthæ, visci quercini, anacardi amygdalæ, auellanae, strobili, pistacia, nucum reliqua genera & glandinum, semen cucurbitæ, cucumeris, melonum, citreoli, citri, cydoniorum, Sinapis, Cannabis, Cnici, xylis, cerasi, psillii,

Lin

Lini, & similia. Sic sericum, Lana, Pili minutim concisa cum aliis siccioribus teruntur potius quàm vsta eadem per se: Nam vrendo vires amittunt priores & novas ab igne, & iis quibuscum vruntur acquirunt, ob id non vrenda, nisi medicus doctus iusserit, vti nec ebur, cornu Cerui, capræ, rhinocerotis, pudendum Tauri, Cerui, siccatum.

Hæc enim vel in longū rafa & incisa, vel etiam limata, vulgari liana, aut rapaci ferracum aliis siccioribus puluerantur.

Adde quòd quædam aut per se, aut cum humore aliquo teruntur, & cum eodem bibuntur vel aliter vsurpantur, vt vinca, coma amaranthi, cum vino, seseli, satyrion, pœonia gnaphalium ex vino austero teruntur & bibuntur.

Aristolochia rotunda ex aqua lupini cum posca bibuntur, aut cum melle linguntur, & alia per multa eius generis exempla apud Dioscoridem & Galenum in medicamentis simplicibus & compositis inuenies.

Sic bdellium salua matutina & hominis ieiuni subactum digitis in emplastri consistentiã vsurpatur, & alia alio modo in vsum veniunt cum humore aliquo trita, vt in compositis latius leges.

Ad aurium vlcera vino, vel dulci, vel aust

Lib. 3. c.
ph. p.

auſtero, vel veteri, vel medio ætate, vel aceto, & eo acido, viſoſo, acri, pro ſcopis variis ipſorum, remedia non ſimplicia ſolum, ſed & compoſita teruntur, ſic ad oculorum affectus collyria ſicca ex humore idoneo teruntur, & applicantur & in aliarum partium affectibus ſimiliter.

Clementer frianda in mortario quorum virtus attritu violento promptè exhalat, aut ſubſtãtia ſub ictu valido lateſcit & mortario hæret, aut quæ multum ſunt friabilia vt caphura, ambra, moſchus, maſtiche, myrrha, bdellium, thus, gummi iuniperi (vernitem vocant) cancamum, ſarco colla, opus cyrenaicus, euphorbium, aloë, ſcammonium, ſtyrax calamintes, bolus Armenia, terra lœnia, & terrea propè reliqua, & metallica, amyllum, ceruſſa, quin hæc duo ſæpe tãrum cribro affricamus, ſaccharum, ſanguis draconis, caſtorium, radix ari, draconis hermodactylorum Hellebori vtriuſque, turbiſſa, rhabarbarum, ſpodium, Arabum, trociſchi agarici, dum ſcilicet quæ aliquãdo humida fuerunt, iam ſiccata ſunt.

Quorum ſiqua adhuc ſint paulò humidiora, piſtillo & mortario calefactis mox ſiccantur, & ſimul puluerantur, friando continenter. Quod auxilium ſuccis liquoribus gummis, reſinis etiã mediocriter fluidis

confert: sed eò frequentius & diutius calefacienda & terenda quo illa fuerint humidiora, ut spes sit etiam oleum ipsum & terebinthinam venetam hoc ingenio pulueratum iri, atque adeò argentum viuum cum saluix succo.

Sed lapides prætiosi & metallica foelicius puluerantur super lapidem in marmoreum, porphyrium, aut marinum per molulam ducta, liquore idoneo pauco, ne puluisculum euolet, idè tidem affuso qui post eà euaporet.

Argentum viuum sublimatum & præcipitatum, cinnabrium vulgare, alumen scissile, quia cæteris tenuius sic puluerantur, vel etiam in mortario metallicorum aliorum modo.

Valenter tundenda reliqua ut quæ ob duritiam, crassitiam, lentorem, densitatē ægrè separantur ut radicum, corticum, lignorum, herbarum, seminum plurima.

Qualia sunt radices althææ, apii, asparagi, aristolochiæ, asari, asphodeli bryoniæ, behen, centaurii magni, cyperi, cyclamini, costi, calami aromatici, cucumeris agrestis, dauci, daronici, dictamni vulgaris, hælenii, eryngii, fœniculi, filicis, galangæ, gentianæ, glycyrrhyzæ, graminis, iridis, mandragoræ, nardi, petrosellini, pyrethri pæoniæ
vtri

✓triusque, polypodii, zingiberis, cortex radicis capparis & tamaricis, & alii, & ligna omnia, herbae item omnes praefertim siccae, flores chamæmeli, schœnuanthos, & eius festucago nobis consueta pro flore, spica nardi, balauftium, caryophyllum, & flores reliqui tam recentes quàm sicci, semina anisi anethi, cari, cumini, coriandri, fœniculi, fœnigræci, lini, lupini, & reliqua, folliculi senne & fructus reliqui, succi, liquores, gummi, resinae in particulas sectæ, & aliis inter terendum particulatim adiecti.

Limaturæ & rasuræ, & rapturæ ossium, cornuum, pudendorum.

Quædam parum diu sunt terenda quia rara, tenuia, friabilia, virtutē superficiali aut imbecillam sortita, quæ paucam sustinere trituram vulgus ait, viribus scilicet integris, de quorum quibusdam sic Galenus scribit lib. 4. c. ph. g.

Quæ ex succis & liquoribus, & lachrimis resiccatis proueniunt: vt myrrha, aloë, acacia, scilicet vera, & quæ his sunt finitima, *ῥυλεια* sunt, & facilè laxia fiunt, ac promptè in puluerem mollissimum abeunt, ob id non diu terenda, ne ipsorum & virtus exhalat, & substantia tenuior euolet, vt caphura, ambra moschus, & alia propè vniuersa, quæ clementer terenda scripsimus.

k

Quin & euphorbium parum diu terendum Mesuæ est, & spodium Arabum ex cannarum vstis radicibus: nam ex ebore vsto spodium, quod vocant, mediocriter terendum. Quod autem Græcis est spodium, id est cinerula, & huic affinis sed præstantior pompholyx non teritur, tantum linteo cernitur per lotionem, aut etiam sine lotionem.

Ad hæc quæ acria & facile inflammabilia sunt, vt resinæ, liquores, gummi, quædam parum diu terenda.

Nam tenuem horum substantiam calor motu accensus dissipat, & reliquum inflammat.

Sunt præterea quædam tam friabilia, vt etiam digitis attrita læuigentur: vt agaricus bonus, ari, & dracunculi radix siccata, asphodeli radix vsta, quanquam illas multam coctionem sustinere dicat Mesues. Nam recentes intelligit non ficas. Sic amyllum, cerussa, calx, ex teneriori lapide. Nam ex duriori vix hora post vna, etiam affusa aqua solui incipit, ea quæ ad lithocolam multò præstantior iudicatur, quàmquam minus multò alba est.

Quædam multum diuque terenda sunt, vt compositioni sunt apta, & quæ crassa densa, dura, lenta, virtutem profundam aut

va /

validam, & agre solubilem sortita, quæ multam sustinere trituram dicimus, viribus seruatis, vt metallica, lapidosa, lignosa, neuuosa, membranosa: quæ tamen ob scopos medici varios nunc crassius, nunc in pollinem mollissimum terenda sunt, vt cum oculis applicanda, vel vreticis miscenda. Sic enim asarum, cuminum, & alia per multa leuissimè terenda sunt, cum per hæc obstructa expedire, distributionem alimenti in corpus iuuare, vrinas mouere consilium est.

Myrobalanos quoque omnes quando per earum substantiam viscera contrahi & roborari volumus, mollissimè teri iubet Mesues. Eadem ratione rha barbarum, quanquam tunc etiam magis vreticum est, vt purgatorium magis, si crassius teratur. Quod autem purum est ac probatissimum intellige: nam rarius & laxius à vehementi & diuturna contritione resolutum exanimatur, virtutemque perdit Mesuæ. Sic radices aliæ etiam aromaticæ vt exacte puluerentur, diu terendæ sunt, acorus, aristolochia, bryonia, centaurium maius, cyclaminus, cucumis agrestis, Mesuæ, costus, cyperus, enula, galanga, iris, pæonia, pyrethrum, polypodium, zingiber. Pauca autè tritura fiunt læuia, agaricus trocischatus,

& radices aliæ clementer friandæ.

Metallica quoque (inquit Galenus libro quarto.c.ph.g.) galla, cytinus, malicorium, Aegyptiæ spinæ fructus & id genus omnia sunt δυσλεῖτα, id est ægre lævia & tenuia puluerando euadunt. Metallica autem illa intelliguntur, lithargyros, arsenicum, sandaracha, æs vstum, ærugo, chalcitis, chalcanthum, cadmia, tam fornacaria quàm lapidosa, plumbum vstum, molybdena, sulfur, alumen, styymmi, chrysocolia natiua (fictitia enim facilius pulueratur) gypsum, cyanus lapis, & armenius: sed ille magis, & lapides reliqui, & bona pars aliorum quæ per se terenda diximus.

Colocynthis accuratissimè debet teri ob causam à Mesue dictam, in simplicium purgatoriorum facultatibus, etiam si ea ob valentem vim purgatricem prius vacuari, quàm amaritudo eius agat & tergeat, dicitur Gale.

Scammonium quoque exactè terendum, nisi cum in catapotia venit. Tunc enim crassius tritum diutius in ventriculo manet, potentiusque agit.

Sic ossa, cornua, etiam vsta, pili, lana, sericum.

Plenam quoque trituram sustinet centaurium paruum, etiã cum floribus, Mesuæ,
her

herbæ etiam aliæ quæ siccæ seruantur.

Mediocriter puluerando terenda sunt propè cætera, vt radices apii, asparagi, asari, nisi mouendum sit lotium, cichorium, calamus aromaticus officinarum non teredinosus, doricum, dictamnus vulgaris, feniculum, glycyrrhyza, gentiana, gramen, hermodactylus, iris, Illyrica & Florentina, inanium, radix mandragoræ, nardi, cœnantes, petroselinum, plantaginis, phum, rubiæ, rusci, raphani, rhapontici, zingiber, zurumbet, sic herbæ acres & aromaticæ, vt hyssopus, rhymus, nisi mouere menses, aut vrinas volumus, & ob id diutius terimus.

In summa, quæ diu coqui possunt, debent etiam & teri: quæ parum diu coquenda, parum diu terenda: quæ mediocriter illud, hoc mediocriter ferunt, ob id trituram nonnihil clariorem tibi reddet coctionis cognitio.

Nec te moueat quòd quædam audis parum & mediocriter, vel multum & mediocriter terenda. Nam cum huius mediæ magna sit latitudo, in ea quædam sunt extremis tam propinqua, vt vix secerni queant. Sic agaricum medicrem sustinere trituram Mesues scribit, aliis placet paucam, non tamen paucissimam. Quæ ratione etiam de primarum qualitatum ordinibus

diffidia scriptorum illustrium concilianda scripsimus in methodo medicamenta componendi.

Quædam tenuissime sunt terenda, vt promptius id actu fiant quod esse potestate dicuntur, vt quæ celerius in partes omnes afficiendi corporis permeent siue fermentationem (vt dicunt) quærimus, siue firmationem & robur, siue materiarum incisionem, tenuationem, terfionem, vacuationem per vrinas, menses, sudores, insensilem transpirationem. Sic cordi, hepati, & partibus cæteris internis, præsertim longè ab ore dissitis roborandis idonea, ab his vacuatura, obstructions liberatura, vrinas aut menses motura tenuissimè pulueramus, vt essentia quadam tenuitate inde acquisita, & corporis sui mole exigua promptius per oscula vasorum angusta, & per corporis habitus poros sensum latentes permeent, agant, quæ citius quod agere nata sunt: Ob id species omnes in hiera Galen. picra mollissimè terentur, & cribro serico cernantur, vt aloës & aliorum vis in angustos ventriculi & partium vicinarum meatus penetret. Sic in theriaca Mithridatio, aurea Alexandri antidoto, & similibus polychrestis compositionibus leuissimè terenda, vt promptius in se agendo & patiando, velut fermententur

cit

eltius, & sint vsui. Dum enim recentia sunt
hæc opiata medicamenta, stupefaciēdi vim
præpollentem retinent. Nō tamen omnino
tenuissimè sunt pulueranda: Nam sic eorum
vis aromatica exhalaret.

Omnia stupefacientia dictis Antidotis,
vel aliis miscenda, aut etiam per se vten-
da, sunt tenuissime pulueranda, vt in paruos
meatus & longe positas, profundasque par-
tes stupefaciendas penetrare aut pertrahi
possint.

Affectibus hepatis puluerata tenuiter de-
bentur, tenuius lienis, tenuissime renum &
vesicæ affectibus, vt per ora vasorum an-
gusta subeant. Sicthymus, asarum, cumi-
num, & similia tenuissimè teruntur in aurea,
in hæmagogo, in diacurcuma maiore, in dia-
lacha maiore, & aliis similibus: in aluum
verò subducentibus diospolitico, cōfectio-
ne Hamech, electario. Indo maiore cras-
sius eadem sunt terenda. Omnino etiam te-
nuissimè puluerentur debita affectibus ocu-
lorum, ne si crassiusculus sit puluis, aspera
inæqualitate, & attactu oculi tunicas exi-
mie sentientes dolore afficiat: præsertim si
metallica sunt, aut lapides, aut similiter du-
ra & sicca corpora. Saccharum enim can-
dum, bolus Armenia, etiam si minus exa-
cte trita oculo imponuntur, humore ex ipso

de lachrymante mox soluuntur.

Terenda quoque in puluerem mollissimum, quibus crassius tritis vis noxia & malefica inest, ut ea terendo vanescat, ut in colocynthide. Crassius enim trita cum sit, spōgiosa, humore superfluo imbuta tumescit, negotiumque tunc magnum facescit pondere, mole, morsu partibus quibus incubuit. Quæ incommoda puluisculis eius accidere nequeunt, quia humoris non sunt capacia. Crassius tamen terenda cum in trociscos alanda est formanda, sed ter quaterque pulverandi trocisci & reformandi, ut ea tenuissime tandem pulveretur. Eadem ratio est de agarico, substantia illi simili. Sed cum sit non paulò clementior, trituram minus accuratam postulat.

Rha barbarum quoque curiosè terendum, quando viscera astringendo roborare, aut etiam vrinas mouere oportet, uti & myrobalani.

Quædam crassius terenda, quæ in ventre diutius morari volumus, nec pròptè vaporum ora subire: sic purgantia medicamenta crassius teruntur, ut in ventrem partem minus principem, & vacuationi expositissimam ex corpore reliquo trahant. Non autem ad partes principes tota ferantur, easque offendant cum ad has facultate aut saltem vapore

re

referri, vel quod plurimū sit, portione paucissima sufficiat.

Craſsius etiam teruntur, quorum virtutem multa tritura diſſipari metuimus: ſic ſcammonium vim purgatricem multa tritura perdit.

Eadem ratione ſtomachica craſsius terenda, vt mora in ventriculo longa coctionem ſœlicius iuuēt, neque cibo facilè vis eorum obtundatur. Quæ prætereà ſunt aromata virtutem colato datura, & odoris ac ſaporis gratiam nō auctura ſubſtantiam: ſic cinnamomum negligentius terimus, quo quæ colantur aromatizamus: & cardamomum: zingiber, caryophyllū, macis, lignum aloës, ſpicam, crocum negligentius teris, per hæc & pannum rarum colaturus œnomeli.

Quæ item flatus diſſipatura ſunt, eadem ratione craſsius pulueranda ſunt, vt in diſſolitico ſeu diacymino ſimplicia vt purgent, & diutius in flatus agāt, licet tardius & imbecillius quàm ſi tenuata magis eſſent. Id quod ſi fieret, parum diu flatus diſſiparēt, tum quod vires citius eis frangerentur, tum quod per vrinas mox ſecederent eaſq; mouerent, cum calida ſint & tenuia.

Quædam prætereà tantum craſsius ſunt
frangenda ad vſtionem futuram, vt lithar-
gyros vrendus frangitur in partes magnitu-
Dioſc.
Gal. li. 4.
c. ph. g.

dinis iuglandis. lapis phrygius. vrendus in partes nuci auellane æquales.

Quædam etiam teruntur vt purius lauentur, de quibus in lotionibus abunde.

Ex his patet eadem medicamenta, nunc tenuius, nunc crassius terenda pro variis medicorum scopis, vt rha barbarum, asarum, nitrum, thymum, calaminthen, irin, hyssopum, pulegium, origanum, cuminum, curi-
fissimè teri volumus cum Galeno & Me-
sua, quando his vrinas mouere nobis studiū est: negligenter verò, cum aluum mouere constituimus.

Sic scammonium, colocynthis, & alia valenter purgantia, nunc crassius cum illud in pilulas, hæc in trociscos transit: nunc tenuius ob dictas prius rationes. Rha barbarum tamen ferè tenuius teritur, vt colocynthis tenuissimè, cum mox & citra aliam per trociscos trituram sumenda. Scammonium quoque crassius teritur, si coquendum est cum aliis, aut diu ante vsum seruari debet medicamentum. Idque nevis eius coctione per ignem aut longam fermentationem exhalet.

Et quæ partes remotissimas petere volumus, leuissimè: si eadem ventriculo, intestinis, & primis venis, hære diutius, crassiusculè terenda sint.

Ex

Ex his omnibus simplicium simul terendorum ordo quidam instituitur, vt prima iniiciantur mortario & terantur crassa, dura, lenta, vt radices, baccae quaedam. Semina prope omnia, vt quae etiam glutinosa medulla constant. Paulò posterius aromatica etiam aequè teri contumacia, vt iuncus odoratus, calamus odoratus, zedoaria, zingiber, galanga, iris illyrica & Florentina, seu nostras alba, costus, & cardamomum, carpobalsamum, cubebe, piper, nux moscata. Post hæc autem simul cum his xyloa loë, xylobalsamum, casia, cinnamomum, caryophylla.

Deinde succi, liquores, lachrymæ puluerabiles cum aliis de quibus ante & quæ cum quibus aut per se terenda sint, diximus.

Semina verò oleosa, vt cucumeris, cucurbitæ melonis, citrioli, cnici, cydonii, pistacia, strobili, amygdalæ, & similia sunt excorticanda, deinde incidenda scalp pro, vt mox audies, ne puluerem reliquum glutinent, & per cribrum transmitti prohibeant.

Mineralia etiam ferè per se & seorsum teruntur, affusa interdum ob eorum siccitatem aqua pauca, ne substantia eorum tenuior euolet, aut vis exhalet, vt ante docuimus. Chalcitis autem, chalcanthum, ærugo, sulfur, sandaracha, & alia quædã adhuc non-

ni

nihil humida, humectari nolunt.

De succis, liquoribus, lachrimis, & animalium in partibus abundè prius est dictum.

Mortarium papyro vel corio etiam interdum duplici est tegendum (vt in Theriacis compositione diximus) interdum ne puluis tenuior, præsertim præciosus foras euolet ac pereat: interdum ne is qualitate malefica præditus nares batuentis mordendo male habeat, vt in Euphorbio & Turbith, & aliis non paucis euenit.

Ad trituram præparant, vel trituræ loco sunt attritio in cote medica, mansio, sectio, fractio, rasio, limatio, raptura.

Atteruntur in cote medica (qualis est tonforia) cum albuminis oui liquido, vel lacte, vel succo rosarum, vel seminis scæniagræci, aut cydoniorum, aut maluarum, aut althæarum, ipsa collyria sicca, siue iam in pastillos formata, siue adhuc integra: sed tamen atteri apta, vt materia hæc tenuior & mollior cōtactu suo dolentem oculum non exasperet.

Ad attritionem confricatio amyli, aut cerusæ ad cribrum facta vt puluerentur, est referenda.

Manduntur ad oris partium, faucium, asperæ arteriæ, pulmonis, cæsophi, ventriculi affectus, vt ad dentium dolorem vinca, ligustri folia & germina, radix chelidonii,

nii, plantaginis, anemomes, Galeno manduntur in simplicibus.

Secantur radices crassiores, longiores herbae, virentes ambae aut siccae, & flores magni, ut nymphaeae, rosarum, croci, & medulla colocynthidis, & acacia nostras, & troci. Galliae: & capillaria, ut sericum, pili, lana: & ligna, ut gaiacum, santala, berberis: & rameta & velut bracteolae ferramento abrasae, cornuum, ungularum, ossium, eboris, pudendorum, coriorum, ichthyocollae, taurocollae, & similia.

Secantur autem quouis ferramento incide & forficibus: ligna autem etiam ligneo pistillo acies ferreas acutas habente. Horum vero quaedam post sectionem in decotta & infecturas veniunt, ut gaiacum, berberis, & quae ex aliis voles. Alia, ut foeniculus & citius pulueretur, ante raduntur, post secantur. Sic de fractione, rasione, rosione, raptione, limatione censendum est. Ea scilicet nunc ad trituram interuenire, nunc ad coctionem tantum, vel usum alium.

Scalpro autem sutorio huc illuc inclinato identidem ac reclinato, vel cultelli verberatu crebro, vel duobus tribusve cultellis inter digitos manus, vel alterius tantum, vel utriusque praehensis inciduntur minutissime semina, oleosa & maiuscula quia sub
ictu

ictu pistilli lateſcunt & pingueſcunt. Inci-
duntur autem aut per ſe prius tamen depel-
lata, aut cum pauco ſaccharo, ne etiam ſic im-
modice pingueſcant & oleoſa fiant, ſupponi-
tur autem iis folium papyri purum, ſape mu-
tandum quando ſcilicet iam diſciſſum eſt,
& huic folio lignum læue & politum.

Sunt verò ſecanda hoc modo ſemina cu-
curbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, bom-
baciſ, ceraſi. pruni, amygdalarum, piſtaci-
oſtrobunilorum, anacardorum, balani myre-
pſicæ, caſtaneæ, auellaneæ, iuglandis, tribuli
aquatici, cnici, ſtaphydis agriæ, quæ aliter
quoque teri poſſe prius docuimus in ſemi-
num tritura vniuerſali.

Dactylos quoque intus & foris curioſè
purgatos ſimiliter incidimus, ſi condita car-
diaca ingrediuntur.

Eſt tamen quando eos negligenter in-
ciſos cum aliis ſiccioribus terendos inci-
mus, præſertim ſi pauci ſunt & multum ſicci,
aliquando tantū aceto horas aliquot vt 12.
maceramus, terimus, per cribrum cochleari,
vel manu impellente cernimus, vt in diaphœ-
nico, in quò etiam amygdalas cultello de-
pellatas cum dactylis aceto maceratis qui-
dam terunt & cernunt.

Frangimus manibus tenera & minuta,
vt herbarum pugillos intorquendo digi-
tis

tis abrumpimus, & radices pusillas & fragiles, cortices parum frangi cōtumaces. Aegre enim fragilia ferramentis secamus, aut pistillis tundimus.

Raduntur ut ante dixi ebur, cornua, & ungulae, pudēda siccata, coria siccata, ichthyo colla, tauro colla siccior, lignum gaiaci, berfilium, & quædam alia ut facilius vel coquendo vim suam humori cui incoquantur, impartiantur, vel terantur. Raditur & cortex turbithe exterior, donec album appareat, Mesuæ. Sic radix glycyrrhizæ, ante triturationem raditur, & aliæ radices, & ipsarum ut aliorum cortices, sed id ad purgationem magis pertinet, de qua postea dicemus.

Raduntur quoque rapaci ferra, lotus, lignum gaiaci, buxum, suber, ebur, & dura alia quæ etiam dum fera vulgari secantur, scobem reddunt non dissimilem illi quam rapaces ferræ ac veluti rudes & crassæ limæ elidunt.

Ferri prætereà albi lamina tenui curvata, foraminibus multis exasperata cōminuimus affricando agaticum, nucem moschatā zingiber. Mala itē cydonia, ut succi hoc plus reddant, quam si in mortario terantur.

Limatur prætereà aurum, argentum, æs, ferrum, chalybs, plumbum: quædam ut vrantur postea terantur: alia ut etiam citra
visti

ustionem in usum veniant, vt aurum, argentum, sed horum duorum limaturæ loco satius est auri & argenti foliis vti. Limantur quoque ligna prædura, gaiacum, santala, berfilium, ossa cranii humani, dentes & maxillæ lucii, dentes apri exerti, & castoris, cornua cerui, capri, rhinocerotis, & vngulæ quorundam ex his, ac ebur. Pudendum quoque tauri, cerui, ichthyocolle, taurocolla, quæ etiam radi & secari docuimus.

Rasio autem limationi finitima est, sed ramenta sunt maiora limaturis, quia horum instrumenta sunt insignius, sed rarius dentata quàm limæ. Radendi quoque modus est alius in lignis edolandis, qui ad trituram quoque, & coctiones vsui esse possit.

DE CRIBRATIONE.

His terendi differentiis ordine optimo succedit cribratio, qua purum & minutius secernimus, quomodo pistorum similaginem, & farinæ florem puriorem ac tenuiorem à fufurea & crassiore separât. Cribrationis ratio eadem est quæ trituræ, ob id quæ tenuiter pulueranda, tenuiore cribro sunt cernenda: quæ tenuissimè, tenuissimo, vt pulueres dicti cordiales cribro sericeo, tæfeturum vocat vulgus, inter manus agitando cribrantur metallica ad oculos tenuissimè terenda, & cribro tenuissimo cernenda: sic

vrius

vrinas mouentia, obstructions liberantia.

Contra verò quæ aluum mouere & purgare volumus, crassius terenda, & cribro crassiore ac rariore cribranda sunt. Et quæ per se teruntur si cribranda sint, per se cribrantur, vt metallica quæ aliis mista citius, & ante istam puluerationem descendunt.

Cribramus autem interdum ad trituram meliorem; frequentius ad misturam aptiorem rerum iam mole minimarum. Quæ enim cribrum, non permeauerunt, trituræ redduntur: quæ crassius terenda sunt rariore, vt dixi, cribro cernenda: quæ tenuius, densiore, vnde varia cribrorum multitudo fuit necessaria. Quædam enim cortice tiliaceo, angusto, sed æquali, cancellatim connexo constant cribrando scobe gaiaci, vel agarico infectorum, & similiter crassiuscule tritis idonea. Vidi & ex assiculo terebella passim pertuso cribrum argillæ colandæ idoneum, alia his minus lata habent foramina, neque vt hæc quadrata sed rotunda, vel oblonga in pergamina circulo ligneo subsuta, quibus triticum, hordeum & alia cerealia, sæpe etiam legumina seminibus alienis, sed minutioribus purgamus. Hæc enim per lata foramina ob paruitatem facilè descendunt semina bona foraminibus maiora retinentur.

Alia seta equina in telæ modum cancel-

latim contexta constant, circulis duobus ligneis vtrunque tensa, quorum inferiore hæc præhenduntur, atteruntur, & impinguntur: superiore verò materiæ cribrandæ continentur, horum verò cribrorū copia & differentia magna est, & vsus plurimus. Quædam enim solum in medio ligneorum circulorū habent: velut telam illam equinā, & his manu tantum molliter succussis puluis in subiectum eatinum ligneum, vel papyrum descendit, superna eius parte interim papyro tecta ne puluis euolet. Eoque utimur in pulueribus parum prætiosis.

Alia præterea fundum & operculum habent exemptile, sed vtrunque corio veruecino clausum, illò puluis per cribrum transmissus excipitur, & probè ne exhalet aut euolet cohibetur, hoc ne portio cernenda exhalet, aut euolet prohibet. In his verò multæ sunt in raritate & densitate differentiæ, quarū singularū suus est vsus, non modo ad medicamentorum terendorum genera, sed etiam ad componendorum speciem variam constituendam.

In his item quædam telæ equinæ loco sericum habent (tafetum vulgus vocat) & id vel album pulueribus electariorum alborum, ut diatragacanthi diairis destinatum: vel rubrum debitum, pulueribus electario-

ru

rum rubrorum, vt diairhodi, dia trium fanta-
lorum, diacube, diamargariton.

Vsurpatur itaq; id cribrorum genus aliis
pretiosius, ad pulueres etiam preciosos, & vt
vocant cordiales, neque vt praecedentia se-
tacea lignæ mensæ, aut alteri solido cor-
pori violentius impinguntur succufando,
sed manibus tantum mollissimè versantur,
vt sine violentia puluis tātum tenuissimus
descendat.

Est etiam linteum magis minus, rarum,
densum, cribrum loco in metallicis præfer-
tim, & terreis corporibus: Latius autem,
id est, remque cernendam comprehendit,
ac inter pyxidis alicuius lignæ vel alterius,
sed grandiusculæ operculum & corpus con-
cluditur & constringitur, deinde vna ma-
nu ferè violentius succutitur super abacum
pharmacarium, vnciae vel simili pondere, sed
plumbeo in linteum etiam prius immisso,
vt id suo motu & pondere res has cerni dif-
ficiles, acceleret, quem cernendi modum ci-
cotrinizare vulgus vocat, voce ex κοκκι-
ζειν, id est, cribrare corrupta, & in id con-
torta.

Vt autem radices, herbæ, semina, fructus
& alia pleraque cruda & cocta teruntur,
etiā cribrantur: sed ferè vi manus aut cochlea-
ris quomodo cassiam & thamar indos sine

tritura cernimus: sic radices eryngii, satyri-
rum, raphani, dracontii coctæ, tritæ, cribran-
tur in diasatyrio.

Sed hæc cribratio immoto fit cribro,
quæ verò puluerum est cribratio, ferè fit
cribris abaco incussis valenter, sed nume-
rose, vt taratantara audire videaris. Alia cri-
bro manu suspensa agitato, alia vt cardia-
ca cribro inter manus versato, non in aba-
cum incusso, ne etiam horum partes cras-
siusculæ vi impactæ per cribrum permeent.
Alia pyxide duro corpori manu vna valen-
ter allisa.

Cerusa & amyllum, & cerusa serpentaria
cribro affricantur manibus: sic quæ citra tri-
turam cernuntur.

Quæ autem cribrum non superauerunt
ob crassitiem, teruntur donec ob tenuitatem
tota cernantur: nisi quod dum paucissimum
superat, idque tenuissimo proximum, cate-
ris iam cretis commisceri solet aut feruari,
vt aliis eiusdem generis, vt postea terendis
& cernendis iterum misceatur.

Colatio cribrationi licet genere & natu-
ra sit affinis, quia tamen non est siccorum,
sed magis liquidorum ob id in alium locum
referenda fuit tanquam dissolutioni, coctio
infusioni, clarificationi, & aliis plærisq; præ-
parationum differentiis necessaria.

De

DE DISSOLVTIONE.

DISSOLVTIO autem seu dilutio triturata quædam esse videtur, quod per hanc medicamenta tam simplicia quàm cõposita læuia fiant, sed adiecto humore aliquo, non etiã sicca permaneāt si prius erant, vt se ad trituram habeat hæc, quomodo colatio ad cribrationem.

Solutio igitur seu dissolutio, seu dilutio est medicamēti vel simplicis, vel compositi consistentia crassioris in humore quopiam idoneo facta resolutio in cõsistentiam, vel mediocrem, vel paulò hac crassiorem aut liquidiores, pro medicamēti soluendi, & humoris soluturi quantitate & consistentia, & aliis medici scopis.

Quod enim minus erat crassum & humore per liquido, eodemque largo est solutū, erit liquidius, contrarium crassius.

Huius autem dissolutionis multæ sunt causæ, nunc enim dissoluimus vt medicamētum facilius & iucūdius deuoretur, & citius distribuatur & subducatur, cum facilius sit & iucundius sumere liquida quàm crassa: vt facilius & gratius est impleri potu quàm cibo. Sic opiata scassiam & alia plurima quotidie dissoluimus.

Nunc vt aliis ad compositionem promptius misceantur, & vnà cum his aut etiã per

se coqui possint, quod ficciora ipsa promptè
vrerentur, sic succos, liquores, lachrimas fre-
quenter dissoluimus, vt euphorbium recens
oleo dissoluitur, Vetus autem fortasse non
dissoluitur Mes.

Nunc vt in partem affectam possit medi-
camentum penetrare, aut illi applicari & ad-
hærere. Sic in aurem iniicienda, in intestina,
in vterum, in vesicam in sinum aliquem li-
quidiora reddimus.

Sic ladanū oleo largiore soluimus in ca-
pillato aut etiā modice tonso quā in raso.

Nunc vt colari & colādo purgari ab ex-
crementis possit, vt liquores aceto vel alio
humore idoneo soluti colantur, & purgan-
tur, Ammoniacum, opopanax, galbanum,
sagapenum: Sic succi siccati, gummi, resi-
næ recentes aliquando & veteratæ ad ele-
ctariorum mollium, catapotiorum, linimē-
torum, vnguentorum, ceratorum, emplastro-
rum mitionē, sed lachrimæ resinosa, oleo-
sis: gummosa, aquosis humoribus melius
soluuntur: vel ipse recentes alia ficciora dis-
soluūt, sed vt dixi similia magis, idque dum
molle medicamentum est futurum, in quem
vsum multa quoque huius generis coquun-
tur. Eadem portione parua cum multis fic-
cioribus teruntur, vt in puluere hieræ dia-
colocynthidos.

Lyc

Lycium aqua diluitur Galeno ad hæmor- *Lib. 8.*
rhagiam. *c.ph.p.*

Pix liquida cum melle lingitur. *Lib. 4.*

Tragacantha in oui alumine soluitur in ar- *c.ph.p.*
teriacam.

Fel scari piscis cum myrrha stacte misce-
tur, stomaticha medicamenta dissoluuntur
aqua vel mulsa ad gargarizandum, dissol-
uuntur humore quouis & sine calore, prom-
ptius cum calore.

Bolus Armenia vera, terra lemnia vera,
calx, sal, saccharum, saccharata omnia, man-
na, cerussa post longam velut bullationem,
chalcitis, chalcanthum, ærugo, rubigo: sed
hæc oleo citius mollescit.

Dissoluuntur aceto forti, præsertim di-
stillato vel succo limonum vñiones seu mar-
garitæ. Testæ ouorum, lapides renum, ve-
sicæ, corallium vtrunque, eaque post sicca-
ta promptè friantur. Præcipitatum & subli-
matum & cinabrium, & in argentum viuum
redeunt.

Etiam aurum & argentum & metalla alia *Hæc in suc-*
suis valentibus aquis dissolunt chymistæ. *coporri*
soluuntur
in pilulis

Soluuntur ergo simplicia quidem am- *fortidis, in*
moniacum, sagapenum, galbanum, opopanax, *succo bras-*
thus masculum, opium, scammonium, aloë, *sicæ in pi-*
hypocisthis, succus glycyrrhyze, pissasphal- *lulis ex o-*
tum, mumiam intelligo. *popanace.*

Aqua simplici, aqua vini, vino, aceto similibus & his frigidis, sed longiore tempore quam calidis. Feruentibus enim his humoribus predicta citò soluantur: priora quinque in lacteum quēdam succum, posteriora totidem in nigrum.

Opium soluit saxa Galeno in trociscis dia opiu.

In oleo frigido prædicta etiam horis. 6. non mollescent quidem, in calente opium, scammonium, aloë, hypocisthis, succus glycyrrhyzæ, etiam soluantur, cætera mollescent tantum, postea durantur præsertim Ammoniacum. In eodem oleo & prædictis humoribus etiam calentibus ladanum mastiche. Myrrha bdellium, sarcocolla, styrax, gummi arabicum. Sarcocolla in aqua rosarum dissoluitur in pilulis sarcocollæ.

Castorium, mumia, mollescent statim: tragacantha tardius, sed in oleo hæc mollitia non multò post durescent præter mastichen, quæ soluitur in oleum, nec ad naturam reddit nisi igne valentiore coquatur, ut decet oleum mastichinum.

Acacia nostras, sulfur gagates in his omnibus humoribus etiam feruentibus, nihil mutantur, sed acacia paulatim pistillo ex humore aliquo friata soluitur, ut succi alii &

& liquores, sulfur & gagates igni liquantur, vt liquores omnes, opium, ladanum, chalcitis, chacanthum, alumen omne, xylaloë vera, vnguis odoratus.

Soluuntur humore quouis calido calca-
thum, chalcitis, & hæc etiam aceto frigido.

Erugo, fori, nitrum, alumen, in aceto frigido non liquefcunt, vt nec creta: sed hæc multum diuque feruet, fitque multò fragilior, vt & prædicta.

Saccharum, manna, quouis humore soluuntur. Saccharum autè ad syrupos, iulepos, apozemata, electaria solida, penidia, trociscos, & alia opera plurima variè soluitur vt in antidotis Mesuæ leges. Saccharum aqua & melle soluitur Mesuæ in diazingibere. Manna verò fere soluitur iusculo calente. & colatur, ad foliorum laricis in qua frequenter colligitur, & aliorum excrementorum separationem.

Manna, cassia, thamar indi in succis purgatis dissoluuntur & colantur in diamāna, & in aliis, melius sic miscentur quam coctione. Manna dissoluitur in succo rosarum rubrarum in altero mannæ. Moschus, ambra, caphura, ferè humore aliquo soluta aliis miscentur.

Tartarum vstum, in oleum vi frigidi soluitur, alio solutionis modo.

Sed vide ne dum acetum vel humorem alium quo ammoniacum vel alium liquorem soluisti, coquendo consumis, fallaris. Nam sapè humorem alium ex se remittunt: quem si consumere pergis, ipsorum liquorum humidum consumis: huncque hi siccissimi, & exucci, & emplastro ob id inepti.

Quæ verò composita quibus humoribus solvantur, non est operis præsentis docere, sed ad modum componendi singula medicamenta pertinet.

Composita tamē plurima, vt electuaria, purgatoria cum aut ingrata sint aut ægrè deorantur, aut citius descendere volumus, neque nausea metuitur, ptissana aqua, hydromelite, vino, vel alio humore idoneo dissoluimus. Trociscos in cote medica ex humore idoneo etiam in collyria humida sapè dissoluimus, eclegmata in ore salia solvantur.

Ex his constat solutionis nomen hic minus latè patere quam cap. 6. lib. 4. metheororum, vbi ad mollitionem & liquationem quoque extenditur.

DE MOLLITIONE.

MOLLITIONE solutioni & liquationi proxima, fit cum medicamenta tam simplicia quam composita reddun-
tur

tur molliora, idque vel affuso humore aliquo sed pauco, vel solo calore nostro solis, ignis id vulgus malaxare vocat, verbo detorto ex futuro $\mu\alpha\lambda\acute{\alpha}\xi\epsilon\iota\upsilon$, verbi $\mu\alpha\lambda\acute{\alpha}\tau\eta\omega$, id est mollio & subigo: quæ duo per malaxare etiam intelligunt, nec eò libenter vtuntur alibi quam tum in catapotiiis cum succo aut syrupo aut humore alio remolliendis & subigendis, tum in emplastris oleo, adipe, vel simile emolliendis.

Calore mollescunt cornua, ungulae, piluli, succi, liquores, lachrymae vt etiam digitis calentibus tantum tractatae, cerae modo ductiles fiant tanquam à frigido concretæ non solum sicco duratae. Calore modico mollescit ferrum, & alia metalla immodico liquantur.

Zitho (qui potus erat Alexandrinorum, nostræ ceruissæ similis) ebur mollescit.

Vniones, corallia aceto distillato mollescunt, & vt dixi, soluantur.

DE D V R A T I O N E.

DV R A T I O mollitioni contraria nobis interdum est in vsu in conditis electariis, ceratis, emplastris, gelatinis vt vocamus. Ea autem fit nunc mistis siccioribus, nunc multa coctione, nunc frigore coagulante. De siccatione autem postea fusius agemus adhibenda medicamentis plurim

rimis non vt durescant, sed vt seruari possint, & ob causas alias in ibi dicendas. De calfactione quoque & refrigeratione paulò post dicemus, quarum tractatio duratione abundè illustrabit.

DE LIQVATIONE.

LIQVATIO seu fusio est eorum quæ à frigido concreuerunt in liquidiorē & fluxilem consistentiam à calore facta resolutio: ita, vt quæ à frigore imbecillo aut non diuturno sunt concreta, vt mel, cera, oleum hibernum, butyrum, adipēs, medullæ: resinæ à calore moderato glaciei niuis & grandinis modo liquentur. Quæ verò à vehementi & diuturno frigore concreta obriguerunt ægrè multo calore funduntur, vt aurum, ferrum ægerrime, argentum, æs facilius, stannum his facilius, facillimè plumbum, stimmy, arsenicum, sandaracha, sulfur, alumen omne (quamuis scissile tantum mollescere videatur non etiam liquari & fluere) calcitis, chalcanthum, misy & ærugo tardius, tardissimè fori (quia terreum & saxeum) vt lythargyros. Is tamen cum ærugine vel oxelæo duplo citius liquefcit quàm cum hydrelæo duplo.

His promptius, liquantur gagates, succinum, vnguis odoratus, id est blatta bizantia,

tia, asphaltum, pissasphaltum (mumiam intel-
ligo) xylaloë.

His promptius, ladanum, Oesypus, ca-
storium, sanguis hirci, gummi arabicum,
tragacantha, cancamum, caphura, myrrha,
bdellium, styrax, mastiche, sarcocolla, gum-
mi hedere, iuniperi, cerasi, pruni, amyg-
dalarum.

Resinæ his facilius. Aequè autem facilè
liquores opium euphorbiū, ammoniacum,
sagapenum, galbanum, opopanax, scammo-
niū & succus glycyrrhyze, hipocisthis, aloë,
elaterium, lycium nostras.

Cera omnium facillimè. Mel, aeromeli
feu manna, saccharum, humore etiam frigi-
do vt sal soluuntur.

Acacia nostras & sæpe non liquantur, hu-
more aliquo cum pistillo, aut cochleari aut
manu paulatim soluuntur.

Prædicta quoque omnia succos, liquo-
res, gummia, resinas intelligo, calenti humo-
re, vt dixi mollescunt: quædam etiã soluun-
tur: nonnulla item liquantur.

Ambra minutim cōcisa liquefcit Mesuæ
in E. diaccocubaphices.

Porrò liquationis necessitas magna est
ad miftionem electariorum, catapotiorum,
vnguentorum, ceratorum, emplastrorum, &
reliquorum propè compositorum.

Quon

Quoniam in superioribus præparandis differentiis virium caloris, frigoris, humedationes, & siccationes meminimus, & in sequentibus eorundem mentio frequens nobis est futura, prius de his est nobis agendum, quam ad infusionem, coctionem, affusionem, vstionem & alia multa, caloris & aliarum primarum qualitatum opera, transeamus.

DE CALFACTIONE.

DE calfactione autem agemus nõ quatenus soluit, mollit, liquat, coquit, affat, vrit, vel aliud insigne opus præstat, sed quatenus calorem rebus præbet moderatum, mitioni necessarium, vel etiam aliqui præparationem differentia, vel ipsi denique medicamentorum simplicium, vel compositorum vsui dextero.

Calefit in sole meridiano acopum, Galeni populeum lib. 4. sanat. tuenda, vt fermententur & probius misceantur eorum vires.

In sole teri vult Galenus metallica, vel lauanda, vel in aliud vtenda.

Colanda calfactione tenuantur, vt promptius permeent: frigida enim velut concreta non percolantur, nisi erant multũ aquosa & liquida, vt oxymeli Galeni, calidiora autem cum sordibus tota colum penetrant, nisi sint glutinosa. Talia enim multum calid

lida colanda. Tepidam damus aquam, vt fit vomitoria.

Calidas modicè damus potiones medicas, non solum purgatorias, sed etiam corpus firmaturas, vreticas, menses aut sudores moturas, obstructionem viscerum aperturas, præsertim celo frigido & ventriculo frigidiorè natura, aut ex morbo.

Calefacimus aquam & alia omnia quæ aqua fluente, aut niue circumposita volumus frigidiora reddere, quòd in humorem calore rarefactum frigus se altius insinuat vt ferum cãdens aqua frigida & astringente temperatur, vt fit durius.

Calefacimus modice infundenda, vt vires suas promptius in humorem, cui infunduntur, transmittant. Calfactus enim humor tenuatur & infusa res rarefit, quibus fit, vt eorum vis calore promptius trahatur, Alia propè innumerabilia calfactione egent, sed admonendi gratia magis quàm docendi calfactionis, refrigerationis & humectationis meminimus: siccationis autem maior est necessitas.

Refrigeramus aqua fluente, aut niue, aut glacie etiam prius calefacta, quæ febrium vehementiæ, aut aëris intemperiei callidæ opponimus pocula medicamentosa. Et quæ à frigido cogi volumus, vt ius carniū glu-

uā

tinofarum in gelatinam vulgò dictam.

Refrigeramus omnia calore præparata priusquam reponamus.

Refrigeramus quæ calore soluta frigore volumus concrefcere, & durescere, vt electaria sicca, cerata, emplastra.

Quæ calfaciunt, & refrigerant etiam per accidens ficcant, ob id ordine bono iam deficcantibus agamus.

DE SICCATIONE.

SICCATIO est consumptio humiditatis, aut noxiæ, aut excrementosæ, ob id nauseabundæ, vel promptè putrentis, vel puluerari prohibētis, vel caliditatem quæfitam obruētis. Absumitur interdum, & naturæ humiditatis aliquid, plurimum autem in affatione & vstione.

Scillæ partes maximè mediæ direptis viuo tenus tunicis, frustatim confectæ coquantur, mutata sæpè aqua, donec ipsa nec amaritudinem, nec acrimoniam habeat, traiectâque lino frustra illa sic, vt se non contingât siccantur in vmbra dies. 40. His segmentis ad oleum, vinum, acetum, scillinum, vtimur. Hæc Diosc. vbi neque cultri ex ligno pini vel cupressi scillam diuisuri meminit, neque acus ligneæ, cum Mesuæ in aceto scillite, nec medium eius abiiciendum iubet,

bet. (quod hodie solenni quodam more fieri ab omnibus video) sed tantū tunicas externas ad vsque viuas & integras.

Triticum electum negligenter tritum aqua per noctem maceratum, postridie manibus expressum reddit cremorem: qui dum recederit, inclinato vase quod supernatat sensim effundendum, reliquum bombace vel sole æstiuo mox siccandum, ne ace scat: repositum operculetur metu vermium: hoc amyllum, hieme igni siccetur. Sic ex oriza & hordeo, & aliis fieri potest.

Rosæ mediocriter apertæ sereno cælo mane lectæ eodem die vt sunt siccantur sole, si potes, sapè vertendo. Nam vix umbra siccauerit, quanquam id esset optatius, ficcatas auelle, & recunde vase vitreo operculato, vt odor & color perseuerent. Meliores montanæ campestribus & minus minuuntur siccando, cum ex harum libris decem ficcatis libr. vnica superfit quibusdam, idem de violis. Scilla siccantur in eclegmate Me- *Lib. 4. sa-* suæ ad asthma, ad saccharum rosarum & vio *ni.* latiū, rosas & violas modicè siccant Mesues, hyssopus in eclegmate sano, mēta in eclegmate aromatum, ruta in altero diacymino Mesuæ, vt in Galeni diospolitico, sed modice. Nam suprā modum siccata, acrior, amarior, calidior euadit, non siccata flatus

minus discutit, quia humorem quēdā excrementosum nondum percoctum retinet.

Herbæ item reliquæ vmbra siccantur, nisi vtendi necessitas cogat te quasdam igni vel sole siccare. Nā in manipulis ligatæ, in granario pensæ siccantur, vbi siccatae sunt, sacculis cannabinis ibidem reponuntur.

Radices herbarum lotæ, à lignosa matrice secreti, mox insolentur, nocte in aëre sicco perflatili seruentur, iterum soli reddantur donec erunt probè siccatae. Quod si cælum est nubilum, sicca fumo aut potius propè ignem, in calathio stramentitio vel saligno: aut si vtendi celeritas vrget sartagini calfactæ, & ab igni remotæ ipsas toties impone identidem vertendo, & sartaginem recalfaciendo exemptis tunc radicibus, donec abundè erunt siccatae, sic radix enulæ, valerianæ, acori nostratis siccatur. Idem in radicibus quorundam fruticum, vt capp. tamaricis: & arborum, vt fraxini, mori: faciendum est.

Radices iam siccatae si ægrè puluerantur, papyro insertæ igni siccantur, vel calidæ sartagini imponuntur, & igni exponuntur: igni autem vel in sartagine vel papyro, vel furno vel suprâ, aut intra furnum, à quo panis extractus est. Radices eadem, & aliæ magnæ recentes, lotæ, radiculis purgatæ, ac
per

per tessellas incisæ, filoque transfixæ par-
uis interuallis, ne se tangant, in aëre ven-
toso & perflatili siccantur, vt radices ireos,
aristolochiæ rotundæ & longæ, bryo-
niæ, & similium: quæ tamen etiam citra
diuisionem probè siccantur, vt radix ari-
dracunculi, cyclamini, asphodeli, vti eli-
gnatæ, prius istæ mandragoræ, eryngii,
apii: petroselini, fœniculi, rusci, turbith,
hellebori vtriusque, dictamni, vulgaris tha-
psia. Paruæ radices aliæ citrà elignationem
in vmbra quoque siccantur, vt asari, aspara-
gi, graminis.

Colocynthis septembri legitur dum fla-
uescit, maxima, & cum aliis multis produ-
cta, insolatur diu, quia ægrè siccatur, & no-
cte in aëre perflatili reponitur, aut si cælum *Mesues.*
est nubilum filo transfixa fumo siccatur,
post excorticatur, vt teratur, itē quarta par-
te hore inuoluta papyro insolatur, vel igni,
aut fumo admouetur.

Aloë decocto aromatum imbuta sicca- *Ibidem.*
tur, primo in vmbra, deinde in sole sic my-
robalani tritæ oleo amygdalarum dulciū,
æstate triduo confricatæ, & quoties opus
erat irigate siccantur primum in vmbra, de-
inde in sole. Trocisci tamen ex his facti in
vmbra tantum siccantur.

Pulmo vulpis sanæ, venatu captæ, iuue-

nis, aqua abluatur, incidatur secundum arteriam venosam, & magis multò secundum venam arteriosam, sanguine purgetur, vino albo, odoro, modice calido lauetur, ollæ impositus clibano parum calido ficcetur, refrigeratus & foliis absinthii inuolutus reponatur. Plura de his leges in fine, in his quæ pluribus modis præparantur.

Amygdalæ & nuclei pinei cortice tenui ablato in pelui super prunas ignitas per se vel positius cum fursurè ducantur, & succutiantur donec humiditas rancida, aut excrementosa consumatur, alioqui pectori nocent, & tussim excitant qualitate rancida, Pruna, ficus, vuæ, zinzipha, myxa, pyra & alii fructus multi sole feruidissimo, aut eius penuria igne ficcantur: sed vua oxyacanthæ vmbra ficcatur.

Fructus quoque rubi immaturi clibano ficcantur ad maiorem astringentiam, & mora viridia aut subrubentia. Fella in folliculo parui cocta ex aqua calente in vmbra ficcantur. Coagula animalium parum salita insolatu ficcata seruantur.

DE HVMECTATIONE.

HVMECTANTVR nunc aqua, nunc lacte, nunc aceto, nunc oleo, vel alio humore medicamēta non modo simplicia, vt foelicius & innocētius in compositionem vel

vel vsum veniant, sed sæpè etiam compo-
ta, vt cum crassa, humore diluimus, quò fa-
cilis & iucundius deuorentur.

Caryophyllum, zingiber, myrobalanos,
cepulas, & emblicas ad condituram qua in-
dustria humectes docet Mesues initio libr.
sui de antidotis & in simplicibus.

Mastiche, moschos, ambra, terendo hu-
meantur aqua rosata.

Gummi Arabicum, tragacantha, aqua
etiam vini myrobalani, scammonium, colo-
cynthis, caphura, turbith, sericū, crocus, eu-
phorbium, & alia plæraque, terendo hume-
antur oleo amygdalarum dulcium.

Amygdalæ, strobili, pistacia, parum hu-
meantur aqua dulci aut rosata ad melio-
rem trituram & saporem delicatum, si
emulsionem, amygdalarum, marci panes, fa-
cturus es, alioqui pinguescunt, & palato in-
gratæ fiunt & ventriculo, vt etiam nausea-
bunde fiant.

DE INFUSIONE.

HUMECTATIONI proxima est infu-
sio in hac enim medicamenta parum
trita aut concisa, nisi minuta sint, maceran-
tur & temperantur humore aliquo scopis
nostris apto, eò magis minus calido à sole
vel igni potius quam frigido. Tempus au-

tem quo id fit varium est. Nam nunc infunduntur semihoram, nunc horam nunc horas plures, dies, menses pro varia medicamento natura & aliis medicorum scopis. Ut enim quædam parum diu terenda & coquenda, sic infundenda, quod virtutem habent vel inbecillam vel superficiariam, & rara sint admodum. Contraria diutius infundenda. Varii præterea scopi medicorum faciunt, ut nunc minus diu, nunc diutius quædam sint infundenda, & quædam (ut nuper distinxī) minimo aut mediocri, aut valido calore in id fouenda. Medicamenta infundimus, ut facultatem eorum maleficam quidem auferamus vel castigemus: bona verò augeamus, vel in humore ipsum utendam transferamus, quos tres infusionis scopos præcipuos abundè Mesues docuit libro. 1. & nos lib. 3. de ratione componendi medicamenta.

Infunduntur autem hodie potissimū purgantia medicamenta, sed etiam alia in apozemata, syrupos, olea, & alias cōpositorum medicamentorum differentias.

Humor verò cui infunduntur maximè varius est, pro scopis variis, purgantia tamen frequenter sero lactis infunduntur, quia purgatorium, & ori iucundum, alia humoribus aliis, ut post audies.

Thym

Thymelææ fructum aut folia & tithy- *Mesues.*
malorum & similiter lactariarum aceto in-
fundimus.

Turbith lacti recens mulso infusum &
siccatum ventrem turbare desinit.

Aloë decocto aromatum vel specierum
hieræ, & aliorum quorundam calidorum
macerata, citius etiam in ventriculi tuni-
cas altè recepta vacuat, illi autem decocto
si colocynthis aut turbith addatur, etiam à
longinquo trahet, aloë facultate acquisiti-
tia non insita.

Myrobalani obstruere desinunt si infun *Ibidem.*
dantur in serum lactis vel succum fumarie,
addito præsertim absinthio, vel agarico,
vel rha barbaro.

Senna contrita horis. 24. in succis mace-
ratur, semel aut bis feruefit, colatur, exprimi-
tur in syru. Saporis.

Manna maceratur succo intybi feruefit,
manibus fricatur, colatur in syrup. acido ex
manna.

Rha barbarum infunditur aquæ cichorii *Ibidem.*
vel intybi vel apii vel plantaginis, adiecto
interdum vino albo pauco, & cum Mesuæ
spica, pro variis medici scopis. Id autē ante
infusionem scapro aut cultello in tenuia ve-
lut folia incidatur, potius quàm vulgi more
teratur, ne vis eius exhalet.

Ibidem.

Thamar Indi infunduntur sero caprino, aut succo fumarie, vel lupuli, modos eorū in fundēdo varios lege in simplicibus Mesuæ.

Ibidem.

Rosæ & violæ infundūtur aquæ aliquo ties, vt syrupus inde purgatorius coquatur, infunduntur & aceto, quod ab his rosatum & violatum appellatur.

Alia propè omnia simplicia purgantia variè infundi docet Mesues in simplicibus.

*lib.4. sani
ratis tuæ.*

Cyminum in dispolitico seu diacymino maceratur. 24. horis aceto, deinde vase terreo bene cocto frigitur, & ficcatur, id autem fit vt citra calorem altius penetret ac incidat.

Radices vreticæ calentes eadem ratione aceto. 24. horis ante vsum macerantur: si autem postea sint coquendæ ex aqua, satis est prius horas. 6. aceto macerasse. Eadem ratione semen anisi, anethi, apii, ameos, amomi, cari, fceniculi.

In oxymelite melanogogo simplicia macerat Mesues horis. 24. aceto albo, aqua, succo, buglossi.

Coriandrum aceto cui incoctus sit sampsuchus maceratum rectè corrigitur.

*Gal. li. 6.
simpli.*

Dactyli aceto macerantur triduo in dia phœnico Mesuæ.

Semen erysimi aqua macerandum est, ad obtundēdam igneā eius caliditatem, prius-
qu

quam eclegmatis misceatur.

Nuclei pinei virides aqua macerandi, vt acrimoniam in ea exuant. In E. hamech simplicia infunduntur sero lactis quinque dies Mesuæ. Lupini aqua fluuialis diebus. 6. 7. 8. macerati mitescunt & dulcescunt, vti aqua priore abiecta cocti.

Cicera, triticum, hordeum lacte aliquoties infunduntur Mesuæ, & siccantur in puluere impingente. Cicera aquæ incoquantur in diasatyrio secundo, vtrunque fit vt pars eius nitrosa, & tergens, in lac & aquam transferatur, reliqua eius substantia seruetur.

Semen abietis & flores populi macerantur dies. 40. oleo Galenus, sæpe tres. 4. & plures menses, postea exprimit oleum digerēs *li. 4. sani.* & acopum.

Sericum crudum cocco baphica tinctum maceratur succo pomorum, succo granatorum, decocto corticum citri & aliis syr. ex succis simplicibus & compositis donec ii succi rubeant, & serini simul & cocci facultatem acceperint.

Infusio hæc dum facultatem medicamenti vel maleficam emendauit, vel bonam auxit: aut in humorem transtulit, finem suum assequuta est: sæpe tamen fit, vt præparatio quædam sit coctionis, sic ante coctionem simplicia aliquandiu macerata pas-

m s

sim reperies, imò & post coctionem, ante ipsam colationem præsertim, dum vis quaesita agræ in humorem trahi potest ex materia dura, crassa, densa. Sic lignum, gaiaci, ebeni, buxi, fraxini, genistæ, iuniperi etiam tritum aut limatum diu etiam, ad triduum ante coctionem humore aliquo idoneo maceramus, ut vires eius incidentes, tenuantes, tergentes tandem in decoctum trahantur.

Quin & medicamenta nodulo ligata, iusculo vel alteri leuiter incoquimus infusionis loco: & quæ infudimus sepe semel aut bis feruefacimus ante expressionem aut colationem.

Infunduntur prætereà quædam tantum, ut tenerescant, idque ad condituram vel coctionem celeriolem.

Mesues in simpli. & conditis li. 7. c. ph. p. & Mesues in antidotis. Sic Mesues myrobalanos ad condituram aqua & hydromelite humectat, & dies octo fero caprino macerat, post semel feruefacit. Capita papaueris forpicibus minutim confusa macerantur cum semine aqua pluuia vel fontana die vno: vel si iam sicciora sunt, etiam biduo & triduo, ut tenerescant ad diaco dii compositionem.

Myrobalani oleo amygdalarum dulcium, vel violato, vel rosato, vel sesamino imbuntur & irrigantur, postea siccantur: id qu

quod ipsis infusio seu affusio seu perfusio quædã est. Dum item hæc tritæ oleo amygdalarum dulcium triduo per æstatem confricantur affuso oleo quoties opus est, deinde siccantur. Altero autem triduo similiter in sole confricantur ex aqua saccharata, vel fero saccharato, & postea formentur in trociscos Mesuæ. Nisi nutritionem esse maius de qua mox dicemus, uti & dum species hieræ hermetis tritas inuoluit bis succo cucumeris agrestis, & sicca, ut eius succi vires pulvis in se trahat.

Alia infunduntur ut dissolui possint: sic Ammoniacum, opopanax, galbanum, sagapenum, & liquores alii aceto vel humore alio super cineres calidos ferè infunduntur ut solvantur. Fractos eosdem hydromelite infundit in hiera archigenis ex Paulo, vino autem infunduntur in hiera hermetis, in hiera autem diacolocynthidos rufi, myrrham solum vino infundit: sagapenum & opopanax cum aliis terit, ut nos hodie in hiera diacolocynthidis paccii facimus: in qua tamen scribonius opopanaxem & sagapenum in mortario terit adiecto melle tenui, id est quam liquidissimo, infunduntur eadem ratione gummi & ichthyocolle, ut dissolui possint, vel ut in muccaginem abeant, quo fine etiam semina & radices lentore aliquo præditæ,
hum

humore calfacto macerantur. Sed de his in succorum extractione mox audies.

Ad infusionem reducitur infectio seu tinctura, ut sericum succo cocci baphicæ tinctum ad compositionem cardiacam celebrem diacoccu baphices: & in syrup. de pomis, & de granatis, & de corticibus citri. Quanquam idem sericum sic tinctum prætereà succis illis infundatur, donec succi ru-beant, & serici atque cocci vires in se traxerint.

Filum purpura marina tinctum, si postea viperam strangularit, ad paristhmia est efficacissimum Gal.

DE NVTRITIONE.

NVTRITIO quoque quam vocant, fuerit infusionis species, sic autem est appellata hæc præparationis differentia loquentibus abusive, quod quemadmodum per veram nutritionem fit vacuati repletio, & etiam incrementum, quandiu scilicet id fieri ex partium sequaci mollitie potest: sic medicamenta quæ humore aliquo imbuta, macerata, tribulata, confricata, præsertim calfacto velut augentur.

Sarcocolla alba, magis glebis constans, lacte muliebri nutritur, sed pauco. Nã multo lacte operata liquefcit, & lac ipsum priusquam sarcocolla siccetur, accessit: paucum

igitur ex mammis ipsis irrigandum confectum sole ficcetur, iterum & tertio, quarto, quinto, similiter irroretur & ficcetur, & tandem reponatur. Aspergi etiam a sinæ, capræ, equæ, lactæ, vel alio potest. Semen cari calfactum lacte caprino horas duas quidem nutriunt in vase mundo, exemptum ficcatumq; reponunt ad fluorem alui.

Myrobalani oleis, sero saccharato, butyro vaccino, succo cydoniorum, vel alio humore dum irrigat, macerat, fricat, frigit Mesues clementer, & his humoribus imbuit vel ad condituram, vel ad noxas earum castigandas, siue solæ vtendæ, siue incomposita veniant, vt trypheram sarracenicam & perficcam, trypheram Galeni, elec. stomachicum Mesuæ, & elec. alhari & sequens quodammodo nutrit. Sic & species omnes elec. Indi maioris, dum oleo amygdalino confricat idem.

Colocynthis quoq; feminibus solis extractis, si impletur aqua cum pauca spica & mastiche, & coquitur in cinere calido ad partem tertiæ consumptionem: hocque decocto paulatim affuso sagapenum irrigetur, donec pinguescat, nutriri dicitur sagapenum, eodem modo & opopanax. Decocto myrobalanorum, vel succo enulæ campanæ, aut rutæ, aut sceniculi cum felle paucum autum ra-
pa

pacium, & spica & mastiche ad dimidium co-
cto & colato idem fieri potest.

Folia etiam thymelææ aceto nutriun-
tur in elec. diaphysalidon. Eadem in aceto
infundit & siccat in pilulis thymelææ, ut ea-
dem sint vel saltem omnino proxima infu-
sio & nutritio. Ambæ enim humore fiunt &
calore blando, qualis ad nutritionem verā
est aptissimus, cum immoderatio vrat, im-
becillior sit inefficax.

Metallica ferè in aëre calido non tamen
super ignem nutriuntur.

Metallica etiam sæpe nutriuntur humo-
re aliquo, ut dissoluantur promptius, vel
etiam liquentur, vel pinguescant, & velut
aucta tumescant.

Scoria ferri in aceto dies quinque in try-
phera minore, Mesuæ, & tryphera moscha-
ta, & tryphera Galeni.

Lithargyros nutritur oxelæo sic, ut vn-
ciæ eius triti quatuor tandem olei libram
vnā, aceti quartaria quinque ac eò plus ebi-
bant, idque omnino sine igne, multum diuq;
pistillum per mortarium ducendo. Nam li-
thargyro etiam vncia vna corpus dat pluri-
mum, ut etiam sine cæra emplastrum perficiat,
sed initio diu tere primum cum paucō
oleo, postea affuso vicissim paucō aceto.
Nam multò sic mergitur, ut corpus nō asse-
qu

quatur. Vbi autem initio paulatim nutrita est, & consistentiam crassiorem friando assequuta, tum largiorem vtriusque copiam ebibit. Continenter autem friatur ad horas duas, tres, nisi quod per initia potes aliquantisper cessare, vt interim velut in otio largius comibat. Sic & chalcitis, & scoria ferri, & ærugo, & metallica cætera ex oxelæo in vnguenti formam diu friando duxi, sed bibacissima est lithargyros: opinor, quia siccissima & rara modicè.

DE EXPRESSIONE.

EXPRESSIO est humidæ, & tenuis substantiæ separatio, à sicca & crassa duro aliquo & valido compressu facta, fit autem sæpe torculari & eo multiplici, quale vinum ex vinaceis exprimunt, & quale pinxit Mesues in oleo amygdalarum dulcium, quale item vsurpamus in exprimendis oleis, & succis aliis, & decoctis, & carnibus, & similibus: siue id torcular est, siue prælum librarium, vt in oleo amygdal. dulcium. Mesuæ diximus. Ferè autem exprimenda, ne diffuant aut dissiliant inuoluimus panno forti, vt cannabino, caprino, setaceo. Est quando tantum caprino aut lineo inuoluimus, & manibus ac digitis prælorum loco vtimur, vt dum medicamenta purgantia infusa exprimimus. Adde quod nunc
den

denso, nunc raro panno exprimimus, interdum clementer, interdum valēter pro scopis medicorum variis: quædam item frigida exprimimus, alia etiam calida: quædam solum calida exprimi possunt, vt oleū amygdalarum dulcium, & similia in Mesuæ. Sic portulacæ, cotyledonis, semperuiui, buglosi succum exprimimus calentem, aliàs humore aliquo liquidiore affuso, vt dicemus in succorum extractione.

Expressione vsus igitur latissimè patet in infusis apozematibus, & coctiōibus propè omnibus, in syrupis, in oleis, & id genus aliis: quo autem instrumento & quatenus calidum, aut frigidum vnumquodque est exprimendum, in singulis compositorum remedium differentis melius condisces.

Neque solum collationi succedit expressio, imò eam sæpe præcedit, & quando eam sequitur blanda admodum est faciendæ: ne quod crassum & terreum colo adheret, id totum vi in subiectum humorem collatum elidamus.

DE CONFRICATIONE.

CONFRICATIO rerum infusarum, aut etiam coctarum manibus facta collationem & expressionem adiuuat, ob id ante has sæpe obitu interdum expressionis

vii

vice est: sic crocus panno lineo ligatus inter
codum, infricatur in syr. Saporis, de pomis
& quibusdam aliis compositis.

Manna succo intybi macerata fricatur
manibus antè colationem in syrupo acido
ex manna.

Rha barbarum panno lineo ligatū frica-
tur, & exprimitur in syr. cichorii cōposito.

Scammonium panno tenui ligatum sæpe
confricatur in syrupo acetato cholagogo.

Helleborus niger nodulo lineo ligatus
in oxymelite melanogogo sæpe confri-
catur.

Medulla cnici, turbith, zingiberis, panno
lineo ligata confricatur sæpe in oxymelite
phlegmagogo.

Helleborum nigrum, agaricum, salē In-
dum fricat Mesues in apozemate epithymi:
cassiam verò manibus fricat ante colaturam
in apozemate adianti: colocynthis forpici-
bus incisa in oleo rosato fricatur ad compo-
nendos ex ipsa trociscos Mes. in trocisch.
& simpl.

Si manibus fricantur, & post dolantur sim-
plicia in electario Hamech. Simplicia in suc-
cis macerata fricantur & colantur simplicia
in elec. diaphysalidon. Simplicia in pilula-
rum aromaticarum post coctionem frican-
tur, & colantur.

Ferè autem hic nodulus in medicamen-
to humido manet. Sic scammonium panno
lineo raro ligatum suspenditur in syrupo fu-
mariae, & noduli aromata continentes, &
compositum condientes in ipso suspensi ma-
nent, vt post leges, titulo de aromatizatio-
ne. Quam consuetudinem hodie plerisque
feruari video in syrups purgantibus, praefer-
tim contra morbum longum, aut in homi-
nis delicati gratiam compositis.

*Gal. lib. 7
s. ph. p.*

Aliquando tamen vbiuis eius noduli to-
ta in compositum confricando est expres-
sa, abiicitur. Sic Soranus cum melle & capi-
tibus papaueris myrrham, crocum, hypoci-
sthidem, acaciã nodulo ligata incoquebat,
post vbi vires suas diacodio imprefferant,
tollebat. Quod exemplum eò ascripsit, ne
id nouum putes, & Arabibus acceptum re-
feras.

*In simp.
Mesues.*

Alia tamen est confricatio, quæ ad infun-
dendum, imbuendum, molliendũ, & hume-
ctandum magis pertinet, vt cum myroba-
lani omnes butyro vaccino fricantur, cate-
ræ species oleo amygdalarum dulcium in-
uoluuntur in tryphera sarracenica, & pheno-
nis, easdem ne partes nutritorias valētī atri-
ctiōne sua exasperent, oleo amygdalarum
dulcium vel rosato, vel violato, vel fesa-
mino, vel alis leniētibus tritas mergit, con-
fric

fricat, & lubricas facit. Possis tamen non modo manibus fricare, sed etiā in sole aut igni clementiore frigere cum alioqui nec ipse rare fient, nec butyrum aut oleum quoduis liquabitur, vt ipsas promptē totas permeet, ac imbuat, ob id in tryphera minore phænonis myrobalani assentur in butyro vacino, legimus & nos in tryphera sequente: hæc butyro vaccino inuolutæ frignantur vertimus, vbi legebatur fricentur, & alibi aliquoties. Vbi (vt dixi) etiam fricentur legere possis, cum vtrunque patiantur, hoc est manu fricentur, & sartagine, aut vase alio blandè frignantur.

Et in Elec. à nobis inuento, frige bis vertimus pro frica, tamen potes si libet lectionem priorem retinere: vel istam, presertim cum in simili Elec. alcāzi, myrobalanos, & simplicia alia bis feruefaciat.

Friguntur tamen vere quædam, vt cuminum aceto maceratum frigitur Gale lib. 4. sanat. tuendæ, in vase terreo bene cocto. Plura huius exempla leges in assatione.

DE SVCCORVM EXTRA-

ctione.

QUANTQVAM loco hoc coctionem infusioni (vt ante memini) viribus & præparationis modo proximam, docere exigit ordo rei: quia tamen rerum ante

tractatarum consequutione quadam in expressione transiuimus, succorum autem extractio tritura constat & expressione, iure optimo succos exprimendi modum hic interferimus: $\chi\upsilon\lambda\textcircled{\circ}$ autem (vt in simplicibus ex Galeno abundè docuimus) nunc is est humor, qui virentibus herbis, aut fructibus humidis, aut seminibus oleaginis tritis exprimitur, & viscago ceu mucago quædam ex glutinosis seminibus, radicibus, gūmis, partium neruofarum ramentis, humore aliquo calfacto maceratis extracta. De his omnibus hoc loco agam.

Succus ex omnibus foliis virentibus per se tritis exprimi potest, præterquam quòd quædam ob siccitatem vix succum aliquem reddunt si per se terantur, vt folia lauri, saluiæ, thymi, roris marini, sabinae, & quæ plantarum sunt syluestrium, & ex locis editioribus ac ficcioribus, & æstate calida sicca, atque adedò post meridiem succum parciolem reddunt: alia ob lentorem, vt buglossum vtrunque, cotyledon, & alia quædam post dicendæ: sed vtrunque genus misto eget humore liquido, ad succi expressionem.

Ad varios verò aurium & partium aliarum affectus adhibet Gal. in simplicibus, & li. c. ph. p. succos recentes hippuris, cucurbitæ, cannabinab

nabis viridis, hedere, polygoni maris, præsii, stœbes, absinthii, fœniculi, dracontii, lactu-
cæ agrestis, fumaricæ, centaurii parui, cheli-
donii, libanotidum, anagallidum, anemo-
narum, peucedani, betæ, brassicæ, calamithes,
foliorum ficus, cynoglossi. Floribus populi
albæ, floribus spondylii, floribus rosarum,
violarum: radicibus cæpæ, allii, porri, cycla-
mini, scillæ.

Ex fructibus etiã vt pomis cydoniis, gra-
natis, vuis, & aliis permultis: de quibus abun-
dè nobis dictum ex Galeno in Mesuæ est,
seção prima & secunda.

Quo autem modo aloë, scammonium, *perroquet*
glaucium, hypocisthis, acacia & externi alii *nobis dici-*
plantarum succi extrahantur, cum plantas *tur a psit-*
ipsas non habeamus, didicisse parui est mo- *taci uiri-*
menti, cum præsertim ex Dioscoride repe- *dis simili-*
tere possis: quanquam aloë nobis iam fre- *tudine.*
quens satis est, sed pensilis ferè ad pompam,
altilis nulla, propterea non quæuis aloë suc-
cum laudabilem reddit, vt Dioscorides &
Gale. edocuerunt.

Acacia verò nostras fit ex prunis agresti-
bus aqua maceratis, igni lento coctis ad dis-
solutionem: colatum ex his siccatur igni
vel sole, complanatur: in tessellas secatur,
rubentes & astringentes magis, si imma-
tura erant: nigras & dulces magis, si ma-

tura.

Lycium nostras sic fit in libello, cui titulus est de dynamibus, id est facultatibus, & Galeno tribuitur. Periclymeni (quod caprifolium vocant) baccas mense septembri terre, torquendo exprime, in solatu ficca reponere, Alterū autem verū hodie desideratur.

Radices glycyrrhizæ recentes præhumida Julio mense tritæ ex aqua coctæ, ad crassitiem colantur & exprimuntur expressum igni vel sole siccatur.

Oleum omphacinum ex oliuis immaturis: dulce, ex maturis exprimere in Gallia Narbonensi vulgare est.

Sic omphacium, ex vuīs immaturis & natura acerbis: vinum, ex maturis & dulcioribus exprimere cuius notum est. Pomorum agrestium tritorum succo expresso parum falso vtuntur septentrionales omphacii vice.

Ex siccioribus verò foliis seu natura seu cæli & soli ratione, vt succum aliquem extrahas, vinum aqua vel humor alius proposito, idoneus (vt dixi) miscetur inter tundendum: qui propè totus cum succi portione aliqua exprimendo reddetur.

Eodem modo ex portulaca, cotyledone, semper viuo, buglossō utroque, & similiter glutinosum succum sortitis, Galenus docet

docet succum illum affuso humore idoneo extrahendum. Ex his tamen sine externo humore succum extrahis, si parum calefcunt, ipsae, mortarium, pistillus, saccus, praelum, vel si tusa citra calorem calatho faligno impositae, loco frigido, ut in cella vinaria repositae sint. Nam in catinum subiectum humor satis multus paulatim defluet. Portulaca tamen erratica & quae vitibus est familiaris quam hortensis, & buglossum tenerum quam vetustate iam pinguius, & folia borraginis quam caulis succum facilius remittunt.

Cucurbitam maza pinsita inuolutam clibanano coquit Mesues, deinde succum exprimit in syrupum cucurbitae. *Gal.li.pro puero epileptico i fi.*

Ex scilla succus extrahitur optimè diebus canicularibus. 40. quibus ea particulatim digitis discerpta vasi mellario imponitur, operculato, & pelle circumdato, deinde loco meridiem spectante contra boream lecto insolatur saepe vertendo, ut undique solem sentiat: post hos scillae elixae similis succum infundo imponit melle condiendum. Alii scilicet inter multas collectam cultello ligneo corticibus externis purgatam, maza inuolutam, clibanano mediocriter calido coctam, exptam, ut calet tusam in mortario lapideo calido, pistillo ferreo calido, pano ligneo

hic succus diachyllo magno miscetur.

tenui calido inuolutā, valenter exprimunt. Sic autem assa Dioscorides vsque crusti frumentacei vel lutei coctionem, tamen succi eius non meminit. Alii sine assatione foris & intus purgatam multum calido ligneo aut lapideo mortario & pistillo tufam mox calido linteo, torculari calido exprimunt, & succum multum facile reddit, & purum atque clarum. Quod si frigida scilla frigido mortario & pistillo trita sit, in sartagine terrea parum frigatur, ilicōque exprimatur inter asseres calidos vel torculari calido ac aëre calido. Quæ omnia Galenus innuit, cum succum hunc diebus canicularibus nempe omnium calidissimis, si suam seruant naturam, optimè extrahit.

Quædam minutim concisam exprimunt. quod tusa pinguescat, succūque ægre remittat, nisi vt dixi, calefiat: alii tufum calatho sparteo imponunt aut saligno, in cellāque vinaria aut similiter frigido loco collocant, distillatque in vas subditum. Liquores, & gummi, & resinæ: castrata, te-
rebrata, secta, scarificata, plantæ radice, trunco, ramis, calice destillantes, raro à nobis colliguntur, sed ferè ab externis mittuntur, à quibus qua ratione eliciantur, docet in horum singulis Dioscorides, succū tamen ex incisa salice dum floret, distillātem

colligere possumus ad vsus à Galeno scriptos, & opium ex capitibus papaueris nigri mense Iunio aut Iulio & ex aliis nostratibus plantis. Elaterium autem ex fructu cucumeris agrestis quomodo extrahendum, lege Dioscor. & in his vide ne succum pro liquore supponas, cum sit multò ignauius scammonium succus quam liquor, & in aliis ad portionem, vt Dioscor. & Gale. abundè docent. Sic ex mandragore radice incisa, forata, cauata liquor emanat valentior succo, & iisdem radicibus tritis expresso, & ex ficu, lathyride, chelydonio, foliis aut furculis auulsis, lac emanat, ex illis & thymalis album, ex hoc luteum.

De secundo succi genere qui ex oleagenis seminibus tritis exprimitur, vt amygdalis ambabus, auellanis, iuglandibus, pistaciis, strobilis, balano myrepfica, nuce myristica, semine cucurbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, cannabis, napi, sinapi, ricini, coccignidii, lini papaueris, hyosciami, pomorum, pyrorum & id genus aliis abundè cum Mesuæ diximus sectione nona de oleis, quod hunc succum etiam Dioscorides & Galenus oleum sæpe vocant, potestque hic ex omnibus seminibus medullatis extrahi, vt etiam ex vuarum seminibus tritis exprimitur igni in lucernis du-

tantissimum.

Mel quoque ab anacardis extrahes, si eos ablato pediculo coquas ex aqua, tunc enim quod supernatabit melleum cocteari colligendum est, & aliter.

S V C C I genus tertium ex glutinosis seminibus & radicibus & aliis in humore calfactum aliquandiu infusis extrahitur. Semina ferè sunt cydoniorum, marrubii, vrticæ, lini, fœnigræci, psyllii, maluæ, althææ, citri.

R A D I C E S sunt maluæ, althæ, symphyti, periclymeni, scillæ, gummi arabicum, tragacantha minutim incisum, sic ichthyocolia, taurocolla, ficus, vuæ, horum vncias tres aquæ calidæ libra vna macerabis nocte vna, postridiè recalfactum sacculo aut mātili extela noua forti impone, intorquendo exprime, virga lignea aut ferrea gracili percute: succum eadem derade, id fac donec succus effluere desinat, & semē exsuccum & siccum euaserit, vel radix.

Alii aquæ libras tres, vni seminum aut radicum libræ imponunt, alii libram vnam aquæ communis vel humoris alterius si requiratur, dant, vncias quatuor seminum vel aliorum. Si autem succum vis liquidiorē, aquam auge, vel semē minue: si crassiorē, contra.

Interdum etiam triduo macerantur, vt in
dia

diachylo communi quod à χαλκ- hoc est succus seu muccago, est appellatum: vt in sectione. 12. Mesuæ diximus, & lib. 3. meth. medicamenta componendi.

Quoniam verò Arabibus psyllii interior medulla calet, cortex friget, vbi refrigerandi consilium est, per succum psyllii, neque diu, nec multo calore macerant, neque valenter exprimunt: ne substantiam calidam foras extrahant, quam nonnulli in vlcere, admoto psyllii succo, cum aqua dulci extracto manifestè affirmant se deprehendisse, & morsum in vlcere caloremque excitatum, quem succo alio ex psyllio clementissimè expresso, postea compescuerunt, sed sola refrigeratrix facultas toti semini à Græcis tribuitur. Sic semen psyllii cum aqua fontis frigida tribulat Mesues, & eductū succum dat potui ad aluum soluendam. Decocto semē psyllii macerat horis viginti quatuor in singulas rudicula agitando, deinde totum succum exprimit in oleo de psyllio, vbi non videtur timere venenosam virtutem occultā in parte seminis eius interna & calida quarto ordine: fortè ob id quod ipso decocto obtunditur & emendatur.

Ex taurocolla, & ichthyocolla, & coriorum ramentis, & partibus omnibus nervosis particulatim sectis muccago quoque
ext

extrahitur, sed in usu medicis frequentiore est, quæ ex ichthyocolla, id est piscium, præfertim quos moruas vocamus, fit. Satius autem est hæc rasa aut limata ex aqua lento igni coquere, donec tabescant. Qui autem valido igni primò coquere aggrediuntur, vrunt, & incoctilem reddunt.

Soluitur quoq; ichthyocolla hæc lotio, aqua salsa, aqua extinctionis calcis, aceto.

In emplastro diachylo magno, ichthyocolla aqua communi igni lento, aut super cineres calidos diu macerata & paulatim cocta, tota abit in cremorem.

Pellis arietina ad dissolutionem dum coquitur in emplastrum, cōtra rupturam, mucago quoque ex ea extrahitur.

Ex gummis quoque mucago frequenter extrahitur potissimum arabico & tragacantha, vt horum drachmis duabus in aquæ rosatæ vnciis. 5. 6. 7. solutis, vt in eclegmate sano, vt fit albius & leniens magis. Muccagine ex gummi tragacanthi drachmis duabus aquæ rosarum vnciis. 7. vel. 8. solutis liquatur sacchari libræ quatuor ad hypoglottidum (quas pilulas albas sub lingua vocat) compositionem.

Ex drachma autem vna tragacanthi potes vncias tres quatuor plures muccaginis extrahere: si multū & diu baculo aut cochlea-

ri

ri percutias.

Ad muccaginem hanc reducenda est congelatio lentorum iusculorū à frigore facta.

Pedes enim vitulorum, colla veruecum, capi, perdices, & carnes aliæ præsertim nervosam multam substantiam sortitæ coquuntur ex aqua igni primū lento. deinde mediocri vsque ad carniū dissolutionem, seu donec iusculi portio exigua cochleari exēpta & refrigerata inter manus confricata, ipsa suo lentore velut ferreminet. Tunc omnia in mantile mundum, mediocriter rarum coniiciuntur, catino lato supposito, inquam humor defluat, ossa cochleari vnco, furcella eximuntur, reliquum mantili mediocriter intorto exprimitur. Nam valens expressio turbidam faceret gelatinam, vt pedes veruecini nigram nisi exactissimè lauentur & purgentur. Mox adeps flatu deturbatur, & cochleari deraditur, iniectis postea albuminibus clarificatur. Additur sacchari libra vna, cinamomi boni crassius triti vncia vna, in cremoris libras quinque aut sex, & crocus si flauum vis aut linteolum succo florum cichorii aut alio quouis imbutum, vnde opinor id linteolum torrefol vocant, vt & florem cichorii solsequium, & gyra solis & sponsa solis vulgò dicitur, quia cum sole vt alii flores multi circum

circumagitur. Mox calidum adhuc per manicam vt vocant, Hippocratis colant prope ignem, ne ante tempus, frigore cōcreſcat: neque per colum tranſfluat. Vbi ſponte ſua fluxit, quantum erat fluxile ac liquidum, in patinas diſtribuitur: loco frigido, vt concreſcat, reponitur.

Sunt qui ichthyocollæ portionem cum predictis incoquunt, vt citius lenteſcat, & magis glutinoſus cremor euadat.

DE DESTILLATIONE.

DESTILLATIO humoris eſt ſucco tenuiori extractio vt caloris, ad hūc locum omnino pertinet. Quæ verò ad eius rationem, vires inſtrumenta, ignem pertinent, ſuſſime libro. 3. methodi componendorum medicamentorum docuimus. Hoc autem loco lectorem tantum exercere ſtatui in quibuſdam deſtillatis paulò difficilioribus.

Eodem loco & ſeſtione nona Meſuæ, de oleorum genere quarto egimus, etiam de deſtillatione per aſcēſum, ſic dicta, quod vapores ſurſum elati, ibi concreti, in aquam diſtillant: cuius nunc vſus eſt longè frequentiffimus. Segmentis pini latifoliæ vas impletum, aqua roſarum affuſa, ſi vaſe duplici deſtillas, ſuccus emanans oleoſus eſt odoratiſſimus, qui caphuræ aqua vulgo dicitur.

Si

Si rosae quas incarnatas vocamus ficcatae, vapore aquae calentis humectatae destillantur, aquam rosarum bonam reddent.

Destillata vapore aquae calentis vires & qualitates plantarum integrius retinent, sed quia excrementosa sunt parum diu seruari possunt. Diutius quae cinerum aut arenae aut scoriae pulueratae calore destillantur in vasis lapideis, aut vitreis, quantumlibet multis super longam aut rotundam fornacem regulis intactam, quae sustineant arenas altas plumbo alto circumdatas: sed vase haec paulatim calfacienda & refrigeranda sunt, priusquam aëri frigido aperiantur: alioqui mox rumpuntur, quae autem plumbo destillantur, omnino improbanda censeo, propter cerusam & qualitates alias plumbi maleficas, cum & aquam per tubos plumbeos deductam damnarit Galenus, quod dysenteriam excitat.

Destillatio per descensum nobis dicta in tertio genere oleorum Mesuae, & quae per hanc destillantur. Scillae etiam recetes incisae vasi inferne foraminulento sursumque lutato impositae, si flamma circumdatur, aqua in ollam aliam subiectam, simul cum huius fundo lutatam defluet, quae cum farina vel pane mixta, gustata murescit necare quibusdam creditur, citius si lithargyri paucum miscueris.

Ref

Rosæ recentes linteolo super peluim tenso impositæ, si vas carbonibus ignitis plenum acceperint: destillant aqua multa & odora in eam peluim. Eodem modo flores reliqui. Quæ etiam per descessum est destillatio.

Si duæ matulæ sibi applicentur, & superior rosis impleatur, & insoletur, distillat aqua odoratissima in subiectam.

DE COCTIONE.

CUM in omni destillatione coctio quædam fiat, per quam etiam aqua distillata succo est tenuior, & in omni coctione fieri destillatio possit, ut ollæ operculum aqua excoquendorum vapore plenum indicat. Cum præterea ambo calore fiant ordine optimo, nunc dicendum nobis de coctione est, cuius partem maximam lib. 3. de ratione componendi medicamenta scripsimus, ac identidem tibi repetendum est, ne bis de re eadem frustra sit agendum.

Coctio medicamentorum ferè fit elixando in humore calido, rarius assando in calore sicco. Coquuntur autem simul, aut per se simplicia frequentissimè, interdum & composita quædam.

Humor cui incoquuntur magna ex parte aqua est, ac ea vel simplex, vel medicamentoso. Simplex item vel pluuiæ vel fontana, vel

vel distillata: medicamentosa verò est falsa, marina, aluminosa, sulfurosa, bituminosa, chalcantodes, carbonosa.

Ad aquam compositam reducuntur, lixiuium, lotium, vinum, acetum, omphacium, ceruifia, hydromeli, cœnomeli, odomeli, oxomeli, oxycraton, lac, serum, succi plantarum liquidi, oleum, resinae recentes, adipēs, butyrum, mel, saccharum humore pauco solutum, & variae in vnoquoque horum generum species, pro variis medicorum scopis, ut etiam interdum humores duos plures miscere sit opus. Secundum cicerum decoctum, lac vaccinium vel ouinum ad coquendas radices eryngi sativi, raphani, dracontii, in Mesuae. Quantitas verò huius humoris varia est, pro scopis variis, ut in diasatyrio lac vaccinium vel ouinum sit quantum duobus digitis supernatet, quod si coquendis radicibus id non sufficit, nouum affundendum sed calidum, ut in his coquendis omnibus saepe admonet Galenus, in alimentis, quod & coqui obseruant. In syrupis, & aliis coctionem requirentibus. Quantus humor requiratur, lib. tertio audies.

Calor autem coctionis autor esse potest quibus rebus coquendis moderatus (nam à solo calore mediocri fit coctio) non ignis solius, sed solis, animalis: calcis verò & fumi &

lib. 4. sim. putredinis fini, aut corticum calor admo-
uendis vsui esse potest, vt pſorico Galeni:
ſumendis verò noxius fuerit, vt ex carboni-
bus non ignitis nec ſemiustis, ex lignis pu-
tribus. Calor enim huiusmodi vti & fumo-
ſus qualitatem alienam cum empyreumate
rebus coctis imprimit.

Electarium roſatū flamma lenta coquit
Meſues, & ſyr. omnes igni lento.

Sint igitur ignis alimenta ſicca & odo-
ra, vt ſarmentum vitis, quo theriacem co-
quit Galenus: vel carbonēs ſemiusti, & qui
tetrā qualitatem iam exhalauerunt, ſit au-
tem primum blandus & paulatim ſi res po-
ſtulat, intendatur, coctioni enim vehemens
& repentinus nocet, quòd vrat, facultatem
diſſipet, empyreuma multum in re vſta non
cocta relinquat.

Nec ſolum ignis calore, vt dixi, ſit coctio
medicamentorum, ſed ſolis, vt ſcillæ, & ex
ea acetum ſcillites dies. 40. Meſua inſolan-
tur, ſæpe mouendo & hydromeli, & ſyru-
pus, alter calaminthes totidem dies, vel etiā
duos, tres, plures meſes flores populi &

lib. 4. sim. abiectis ſemen oleo macerat Galenus, co-
quit, quodammodo multò magis ſi ſoli ex-
ponantur: quanquam quouis anni tempo-
re fiat; vt pſoricum ex chalciti dupla & li-
thargyro olla noua incluſum ſimo, æſtate
med

media diebus canicularibus quadraginta
sepelit, sic dum theriaca & similes antidoti
opiatae menses, vel etiam annos aliquot fer
uantur ad sui coctionem, quam fermenta
tionem vocant.

Coquimus medicamenta, vel ut eorum *Gal. in the*
vires imbecillas augeamus, incoctis simul *riaca &*
his, quæ sunt valentiora, vel validiores mi- *antidotes.*
nuamus, vel alienas in totum abigamus, vel
ut ex omnibus facultate diuersis & sæpe cō
trariis simul coquendis facultas vna concre
scat & coalescat. Adhæc ob destinatam me
dicamenti formam, aut sumentis palatum,
ob simplicium naturam, ob custodiæ diutur
nitatem etiam quædā coctione longa sicca
mus: uti ob aëris humidioris conditionem.

Præterea ut purgētur, multa coquimus.
Ignis enim ut calida cætera homogenea co
git, & heterogenea separat, ut simplicium
vires in humorem cui incoquuntur trans
eant, quo fine fiunt syrups, apozemata, oleo
rum quartum genus.

Horum exempla aliquot fuerint hæc.

Brassicam, lentem, ostrea bis coquimus
aqua scilicet priore abiecta, & noua calen
te affusa cū aluum per hæc sistere volumus,
semel verò cum mouere. Sic allium, cepa,
porrū, ampeloprasum, & quicquid à veteri
natura ad contrariā traducitur, bis coquen-

lib. 2. al. dum: sic tamen, ut nec aërem, nec aquam frigidā attingat. Nam planè tabescere & percoqui amplius non poterit etiam si diutissimè coxeris. Quod præceptum etiam medicamentis commune est, quibus liquor nouus consumpto priore est affundendus. Althæa adipibus incocta subigitur ad abscessus, coctu difficiles, aqua mulsā viribus varia Gal. & Me. pro coctionis quantitate.

Oxymeli quoque valde coctum flatus dissipat.

*Ex Gal.
simp. lib.
c. ph. p.*

Ramenta loti arboris in aqua aut vino coquuntur ad capillorum defluuium, Gale. in simplicibus.

Melli alumen idem incoquit, radicem thymali, vel phlomi, vino vel aceto ad dentium dolorem.

Omphacium, succum mororum, vel batianorum, vel granatorum, vel rhu, vel cydoniorum, vel pyrorum agrestium, nucum viridum, cū melle coquit in stomaticha remedia, radicem & semen arctii ex vino.

Dracontii radicem bis, ter ex aqua coquit, ut acrimoniam deponat, & sit apta eclegmatibus.

Asphodeli radicem, ut amaritudinē perdat, quam scilla difficillimè amittit.

Bulbi radix cruda, vel semel elixa bona eclegmatibus, bis elixa amaritudinē totam dep

deponit, & fit eclegmati inepti, cēpa, allium, porrum, ampeloprasum, cocta bis aut ter acrimoniam deponunt, adhuc tamen thoracica sunt.

Ari radix in aqua aut sub cineribus cocta mitescit, lib. 2. alimentorum.

Buglossum in melicrato coctum arteriacum est.

Brassicæ succus cum melle coctus eclegma est.

Dactyli etiam in mulso aut passo cocti.

Serosa & eadē acris substantia lactis coctione, vel immixtis lapidibus aut circulis ferreis ignitis consumitur ad dysenteriam.

Hippuris ad eandem coquitur in aqua, si febris adest: in vino austero, si abest.

Faba oxycrato incoquitur.

Instrumenta coctionis sint vasa omnis generis, aurea, argentea, ærea, stannea, stannata, ferrea, terrea: sed hæc bene cocta ne qualitatem malam medicamento largiantur: & ea vel silicea, ut vocamus, seu cum Mesuæ lapidea, vel plumbata, præstantissima sunt vitrea.

Sunt ea autem vel simplicia vel composita & duplicia (balneum mariæ vulgò dicta) qualia ad oleam etiā calida & alia permulsa Galenus commendat. Quæ tamen hodie ob avaritiam, negligentiam, malignitatem

non vsurpatur. Fiant igitur vasa sibi incum-
bentia, sed interuallo vbique digiti vnus
disita, quod aquam contineat sæpe suffi-
ciendam, nisi maior vas minus quod medi-
camentum coquendum continet, in maius
aqua feruenti plenum, & igni contiguū im-
mittere, Galeni more. In vase lapideo, id est
filiceo, vt vocamus, coquitur miua simplex,
& citra condita Mesuæ. Eidem vase dupli-
ci coquitur oleum rosatum, violatum, nym-
phæatum, melinum, papaueris, myrteum, ex
pomis mandragoræ, & anetinum, chamæme-
linum, ficyonium, irinum, rutaceum, nardi-
num, mastichinum. Sicque reliqua coquen-
da putem, quod oleum simplici vase coctū
assequitur odorem tetrum & ingratum, vt
interim vires frigidas frangi, calidas inten-
di taceam, diacodiū in duplici vase coquit
Heras igni fumi experti.

Crustum ex maza vel luto circumdatum
scillæ vel scammonio & aliis eius generis
vasis locum obtinet, vt crustum idē & ma-
lum acerbum aliquod vel cydonium ipsi
scammonio est tanquam vas duplex.

Finis coctionis est cum scopū nobis pro-
positum attigimus, vel simplicem, vel etiā
multiplicem, vt si medicamentum coqui-
mus ad vires eius augendas, vel minuendas,
vel ambigendas, dum quantum satis est au-

xim

ximus, minuimus, abegimus, satis coximus eodē modo in scopis aliis. Sic quædā coque-
mus ad dimidias, tertias, quartas, librarum
duarum, trium consumptionem, dum omnia
sunt probè vnita ad iustam crassitudinem,
aut mellis sordium, cerati liquidi, empla-
stri consistentiam. Sapas coquendo sicca-
mus, donec crassam affecutæ cōsistentiam,
vt seruari possint: sic & syrupos, eclegma-
ta, electaria, vnguenta, cerata, emplastra.
De quibus singulis accuratius in modo
singula hæc genera componendi libro ter-
tio dicetur.

III. Diamorum cum melle coquimus donec
gratum erit, & absumpta humiditate excre-
mentosa feruoris & putredinis effectrice
feruari annum vnum possit: id quod mel ci-
trā idoneam coctionem succo mororū præ-
stare non potest, licet fructus integros cum
pediculo certis interuallis ne se tangant, in
se mersos loco frigido integros in annum
seruet.

Testiculi ad Elec. diasatyrion.

Gal.

Capita papaueris ad diacodium, capi-
ta ranarum ad oleum ranarum, vulpes ad
vulpinum, viperæ ad pastillos theriacos, &
oleum viperinum coquuntur, donec ipsa co-
quēdo in aqua intabuerint: stomatica & sto-
machica coques ad mellis, aut sordium cras-

Mesues.

situdinem.

*Lib. 6. san-
nit. tuēde.*

Electaria mollia ad similem consisten-
tiam, solida verò coctum magis saccharum
requirunt.

Syrupos cū saccharo aut melle, aut vtro-
que coquimus, donec lentore tenaci & cras-
so inter extremos digitos explorato humo-
rem excrementosum propè consumptum
coniectabis.

*Nicolaus.
in syr. ro-
sato.*

Cocti sint syrupi quando incipiunt filum
facere, siue cochleari, effundentur paulatim,
siue inter digitos eius portio tractetur. Vel
quādo marmori, aut vngui imposita eorum
gutta non diffunditur, nec aquæ modo dif-
fluit: sed concreta manet.

Quæ plena sunt meliora, coctione dete-
riora euadunt: vt cassia nigra, thamar Indi,
thamar mannam, thamar Indos, medullam
cassiae in succis quibusdam depuratis, dis-
solutam coquit cum aliis semicoctis ad mel-
lis spissitudinem in diamanæ, & in tryphe-
ra Persica, & in cōpositione alkekengi. In
confectione hamec eadem tria in infusione
colata dissoluit, fricat manibus, colat, cum
saccharo coquit ad mellis spissitudinem. In
confectione mannae Galeno tributa, man-
nam succo rosarum sufficienti coquit igni
blando ad sufficientem coctionem, teroma-
tim in aqua rosarum, & compositione se-
que

quenti, coquit eādem cum saccharo ad mel-
lis consistentiam.

Emplastra coquimus dum manus attactu
non inquinant adhæsu tenaci.

Coctum mel cum aqua, vino, aliis, in an-
tidotos & alia composita, tunc est quando
marmorī propemodum nihil adhæret.

Coctionis & triturae ratio propè est ea-
dem in medicamentis, ut scilicet quantam
hæc trituram viribus integris fuerunt, tan-
tum quoque & coctionem. Quæ enim ma-
gna, crassa, lenta, sicca, dura, densa, neruo-
sa, membranosa, virtutem firmam, & va-
lenter ac penitus mistam sortita longiorem
sustinent coctionem, ob id prima vasi co-
quenda immittuntur: qualia sunt metalli-
ca, terrea, styptica, quatenus styptica sunt)
rosæ enim, absinthium, rha barbarum, aloë,
myrobalani, agaricus, amaram quoque qua-
litate in superficie habent, & eam purga-
toriam, ac facilè resolubilem, ob id minus
coquenda quàm styptica substantia postu-
lat (radices ob id propè omnes, quia terreæ
magis, incisæ, aut confractæ, ut aristolochia,
cucumer agrestis, hermodactylus, polypo-
dium, & cetera, etiam post coctionem teren-
dæ, ut promptius cribrentur in diasatyrio,
Mes.

Sic rha barbarū quando astringere con-

filium est, ac myrobalanos omnes diu coqui oportet: si verò purgare, tergere, aperire, parum coquenda, aut potius infundenda.

Mesues.

Glycyrrhiza tamen parum diu coquenda, opinior ne cum admodum sit dulcis, coctione longa dulcium cæterorum modo, amara euadat: præsertim cum iam vetustate amaricat, cum verò recens est humiditatem excrementosam nacta, cum aliis radicibus initio coquitur, vt in syr. Hyssopi, ziziphorum glycyrrhizæ, & thoracicis aliis.

Acria quoque diu coqui possunt si eorum acrimoniam obtundi volumus, nisi virtutem imbecillem, & facilè resolubilè sint fortita.

Mesues.

Colocynthis, centaurium paruum cū floribus & semine, plenam coctionem tolerat.

Quæ contra sunt minuta, tenuia, fluxilia & friabilia, humida, mollia, rara, virtutē imbecillam, superficialiariam, malè permistā fortita parum diu coquenda sunt, ob id postrema sunt percoctis propè aliis inicienda, quæ sunt rosæ & violæ recentes. Siccæ enim & harum succus magis coqui possunt. Givgidium elixatione diuturnam non sustinet Gal. libro. 2. alimentorum.

Bulbi exigua admodum elixatione sunt contenti: Daucus autem ad esum diutius elixandus quàm pastinaca.

Nul

Nullus florum coctionem recipit, ob id *Paulus li.*
olea cum floribus facienda insolantur. Si au *7.c.20.*
tem flores valida sint odoris gratia, ut rosa,
chamæmelum, quæ pluribus diebus constet,
insolatu tenuius, & vtilius oleū euadit. Qui
verò flores sunt inualidiores, & facilius dif-
flantur, minus diu insolantur, quia eorū vir-
tus promptè vanescit, ut lilium, violæ.

Parum diu integris viribus coqui pos-
sunt epithymum, flores stoechados arabicæ, *Mesues.*
diutius folia.

Quæ verò has qualitates adhuc insignio-
res habent, coctionem nullam sustinent: sed
sublatis ab igne aliis miscentur, vel adhuc
calentibus quando firmiora sunt: vel iam re-
frigeratis plurimum quando ne vis eius te-
nuis & lubrica calore solata in aërem exha-
let metuitur.

Quæ purgant lubricando coctione non
admodum iuuentur, *Mesuae*: tamen cassia,
manna, thamar Indi interdum ab eo coquū-
tur, sed parum, nec adeò, ut vis eorum lubri-
ca perdatur.

Quæ in horum sunt medio coctionem *Mesues.*
tolerant mediocrem, ut absynthium, asa-
rum, agaricū, coccum gnidium, fumaria, sen-
na, scilla, iris, hyssopus, thymus, turbit, semi-
na omnia præterquam cucumeris, cucurbite,
melonis, citreoli.

Rha

Mesues. Rha barbarum exquisitum multam satis coctionem & trituram sustinet, raro autem & laxo etiam mediocris coctio est vehemens, & eius virtutem resoluit.

Ibidem. Thamar Indi coctionem ferunt mediotrem, multa enim vires eis omnes adimit. Ob id ipsi & cassia liquore idoneo soluta, colata melli aut saccharo ad humoris consumptionem cocto adduntur, & ad iustam consistentiam percoquuntur, igni ablatis & parum refrigeratis pulueres miscentur.

Coquendæ igitur in plantis radices primæ, ut dixi, concisæ vel confractæ, quibus coqui coeptis semina sunt iniicienda, exceptis seminibus cucumeris, cucurbitæ, melonum, citreoli, substantiam tenuiorem vreticam fortitis. Tunc etiam cortices & ligna modice confracta. Post hæc herbæ siccæ parum concisæ, aut si crassiores sunt, confractæ, deinde virentes, incisæ minutim, aut manibus torquendo confractæ, excepto omni adianto, & lactuca agresti, quam endiuia vocant.

Deinde fructus exossati, & semine purgati, excorticati & (si magni sint) incisi, ut pruna, ficus, myza, zizypha, vuæ passæ.

Postremi flores, epithymū, stœchas: sed chamæmelum licet tenuis sit essentia, quia tamen fortiter mistam habet facultatem,
lo

longule coqui potest, vt schoenuanthos si haberi potest heliochrysum, stœchas citrea vulgo dictum.

Succi quoq; siccati, liquores, gummi, resina, manna, calsia, liquore aliquo soluta, sub finem iniiciuntur. Liquores enim vino vel aceto soluti, colati, cocti, ad humores additi consumptionem aliis extra ignem miscentur tudicula semper moti.

Moschus, ambra, caphura, lapides preciosi, pulueres aromatici, & cordiales ab igne depositis, aliis etiam tepentibus iniiciuntur.

Rosæ autem, rha barbarum, aloë, agarius, myrobalani, si purgatorium vis medicamentum parum diu, vt dixi coquenda. Nam vim eorum purgatricem superficiariam, parum firmiter mistam ab his corporibus raris coctio multa facilè dissipat. Si verò astringentium vis medicamentum, diu coquenda, vt dissipata vi purgatrice, terrea & astringens tandem foras eliciatur.

Violæ etiam parum coquendæ, quando purgare lubricando consilium est: si atrahendo multum, vt facultas ea in ipsarum ceu centro posita foras trahatur, coctionis vehementia.

Scammonium si in pomo est præcoctum, absoluta coctione iniicitur: si crudum est, crassius tritum miscetur in media coctione:

no

non autem tenuius, ne etiam vis eius purgatrix exhalet, id quod & accidit coctione vel vnica, sed longa, vel duplici, vel si medicamentum diu ante usum seruandum est, vel si accuratius ante coctionem teratur.

Scammonium autem si calorem sentit in grumos coagulatur: quare fit ut interdum, in vna dosi alicuius medicamenti, plurimum sit scammonium, in alia minimum: sicque inaequale est medicamentum, ob id ad finem iniicitur.

Quod autem triturae similem esse viribus coctionem dixi, recte accipiendum.

Calor enim ab igne vehementior, & tenuior, quam ex attritu pistilli, mortarii, durorum terendorum: ob id etiam medicamentorum vires citius dissipat coctio, quam tritura.

Quapropter aromata teruntur quidem, quanquam minus quam alia: sed tamen quantum teri est necesse, non coquuntur autem, sed reliquis iam percoctis, & ab igne depositis, ut dixi, miscentur antidotis, vel molli-
bus, quales veteribus in usu fuerunt, vel sic-
cis & solidis nobis usu frequentissimis, ut cin-
namomum, agallochum. Sic aurum & ar-
gentum bonum & foliatum, quanquam diu
coqui sustinet, vires tamen nullas coctum
tradit maiores quam crudum, sic margari-
tae, cyaneus praeparatus, ambra, moschus non
co

coquenda.

Coctio facta ad dimidias, tertias, quartas, vel aliam consumptionem, postea residendo, & albuminibus saepe purgatur & colatur, deinde percoquitur, quod in syrupis frequenter obseruabis. Multis etiam coctio duplex debetur, vt vtriq; antidoto, alcanzi, catholico, diasatyrio vtrique.

Ad coctionem multis saepe aliis medicamenta paramus. Quaedam ante intus & foris purgamus, terimus, lauamus, affainus, vrimus, infundimus.

Quaedam aliis iuncta illorum coctionem accelerant, sic vrticae, radices carnibus incoctae eas coqui celerius iuuant: vt contra nymphae radix incocta pisces, ea ad vnum olla velut eiacularur.

Ichtyocolle cum calce viua cito cocta mox dissoluitur, sed videan affectus calcis viuae vires requirat.

DE DESPVMATIONE.

DESPVMATIO est spumae detractio, cuius materia hoc loco est non solum succus quidam lentus includens flatum, vt Galeno in Aphorismis docetur, sed lordes omnis leuior a calore ignis exputata, vel etiam grauior albuminibus coacta & colligata. Despumamus autem nunc simplicia, vt succos, saccharum, mel:

nu

nunc composita, vt apozemata, syrupos.

Mel cum aqua, aut vino, aut aceto, aut humore alio pro variis medicis scopis despumatur. Nam per se coctū mox immodicè effervesceat, & de repente exūdat, & flammis conceptis incendii periculum affert. Adhæc cum sit dulcissimum, euaderet amarum, si per se coqueretur donec despumatum esset.

*Mel aqua
dupla de
spumatur
si alius hu
mor nō ex
primitur.*

Mel humore æquali hodie quibusdam despumatur, aliis duplo. Spuma autē interea dum igni lento coquitur, cochleari pertuso deraditur. Adhæc cum ad dimidias est coctum, & multum feruet, adduntur albumina singulis libris singula. Deinde calidum colatur, post percoquitur per se, aut cum condiendis & incoquendis medicamentis, spuma quoq; tunc sicca emicat curiosè detracta, si per se seruandum est. Vel in rem præsentem paratur ad pulueres compræhendendos, qualia sunt antidota omnia melle excepta opiata & sine opio. Si purius est mel, sufficit aqua æqualis, nec tantum albuminis requiritur: quod si purissimum est, nec despumandum, nec clarificandum.

Sed huius regionis mel cum sit crudum & impurum, multam reddit spumam, ita vt despumando & colando ad dimidias minuitur. Quapropter pondus duplum ei quod composito exigit initio tibi immittendum,

fi

si cum aliis despumandum incoquis : fin minus despumato vtendum. Finis despumationis quibusdam est tempus horarum circiter duarum cum igni léto. Aliis rectius cum spumare desinit, aliis donec aqua erit consumpta (quæ res bullis cognoscitur) & mel idoneum lentorem acquisiuerit.

Non autem probo cum seruitore mellis libram vnā coqui in aquæ libris decem, continenter despumando, & aqua hac propè consumpta libras alias quinque addi, & his propè consumptis alias quinque. Hoc enim modo mel aut vri, aut totum vanescere est necesse etiam si aqua adsit largior.

Sæpe autem mel per se despumatur & purgatur, cum tam longam non sustinet coctionem aliorum natura, cum quibus mel coquendo despumaretur. Interdum cum his despumatur cum scilicet multam coctionem viribus integris sustinere possunt, vt in diacydonio mel coquitur cum succo cydoniorum, & coquendo frequenter despumatur, & aliis passim. Frequentius tamen per se (vt dixi) despumatum miscetur conditis, syrupis, antidotis : rarius crudum, præsertim nostras. Quod autem album Gallia Narbonensis thymo passim luxurians mittit, est præstantissimum : nec Attico aut Hyblæo inferius, cum regionis temperatura & thymi larga

luxuries utrobique consentiant.

De saccharo idem quod de melle dicendum, cum sit ipsum mellis species etiā Dioscoridi & Galeno.

Impurum enim & nigrū, aut nigricans in triplo humore despumatur, cū ad dimidias est coctum & valde feruet, adduntur albumina singulis libris singula, colatur calidū, post percoquitur studiosè: interim etiā despumando, si spuma aliqua appareat.

Si aut purius est satis est dupla aut æqualis (vt ferè fit) aqua, & pauciora albumina si purissimū. nec despumādū, nec clarificandum.

Succi fluxiles recipiendi in syrupos, apoemata, electaria, quadam igni despumantur, residendo clarescūt, & in colo lanceo terreū excrementum relinquūt, interim verò etiam additis albuminibus, & melle aut saccharo purgantur, quoties in syrupos, vel apoemata coquuntur, vt in syr. bizantino, & aliis, & in elec. psyllii. Qui verò succi in emplastra recipiuntur, vel sole, vel igni post mitionē ficcantur, non despumantur.

Liquores verò solum colū purgātur post dissolutionem, nō etiam despumantur, tantum abest, vt clarificentur. Idem de metallicis & animalium partibus constituet.

Quod si simplicia omnia sunt pura aut purgata, satis est horum decocta per colum la-

neu

neum aut tela laneū: sed modicè densum semel aut bis transmittere sine vlla expressione, colo, si opus est, mutato, deinde ipsum immitte in saccharum, si impurū erat clarificatum. Si autem purum est, clarificatione non egetur, & percoque donec humoris: seu decoctū est, seu succus, seu aliud, vnciae tātū citreiter duae: aut si fucci sunt glutinosi, etiam tres & quatuor in sacchari libra supersint. Si fucci acidi percocto iā saccharo propè toti inuoluuntur, vt dicemus initio syruporum.

DE CLARIFICATIONE.

CLARIFICATIONIS obiter in despumatione memini. De ipsa autē nunc pauca mihi sunt dicēda quod haec rerū liquidarū decoctis debeat expurgandis, vt & despumatio & colatio, vt sorde crassiori purgata, sint gratiora palato, & in corpus facilius distribuātur & salubri⁹. Clarificātur autē quaedam per se, dū quod foeculētū est subsidet: vt succus rosarum, limonum, cydoniorum, citrorum, ribes, oxyacanthae, granatorum, siue mox reponantur loco frigido, siue in officina aliquandiu seruantur. Quedam interueniente coctione à sole, vel igni, vt succus pomorum dulcium & acidorum ad dimidias coctus dies duos quiescere permittitur, donec clarescat: vt syrupus de pomis Mesuae fiat, sic succus acidius citri ad

partis tertiæ consumptionem coctus & colatus quiescere permittitur, donec clarescat, & succus granatorum ad partis tertiæ consumptionem coctus, biduum quiescere finitur, usque dum clarescat in syrupo ex succis fructuum acidorum. Tamen acidi succi hodie in syrupos aliter, ut dixi, & in syrups dicturus sum, recipiuntur. In his autem coctio ratione optima adhibetur, ut calor homogenea in unum cogat, & separet heterogenea: quoniam urinae in nobis coeptae coqui turbidae si reddantur, postea tenuantur, & clarescunt, subsidente crasso.

Cum verò calor ignis sordes in succis exquisitè separare non possit, ut noster calor nativus aliena coctione perfecta segregat, cumque metuemus ne coctione tam longa succorum facultates corrumpantur. Satius putauerunt medici coeptam ab igni sordium secretionem arte alia iuvare, & ea multiplici, nunc quiete succi post coctionem, ut nuper dixi, nunc aceto simul incocto: nunc agitat diu albuminibus, ut interim despumationem omittam & colationem à nobis adhiberi solitas ad perfectionem succorum, vel decoctorum purgationem.

De ea autem clarificatione, quæ fit per se & post coctionem residente, satis est dictum, de ea quæ fit per acetum & albumina iam nobis dicendum est.

Dec

Decocta & syrupi si acetum recipiant per se, vi aceti nonnihil purgantur: melius autem si etiam albumina accidant, etiam si post colaturam acetum recipiant, quando nihilo minus continenter est despumandum, quod acetum etiam ex purgato iam decocto spumas & spurcitiam quandam iaculetur.

Nicolaus

Oui albumen ex aqua frigida scopulis agit *in syr. resato.* ta, donec in spumam abeat, quam particulatim syrupo, vel alteri decocto feruenti inspergas: & ubi nigruerit, cochleari foraminulento deradas, nouam inspergas: id fac donec erit syrupus clarior. Alii ubi ex bullis clarius decoctum vi ignis factum animaduertunt in id tepidum (nam calidius albumen coqueret in frigidior minus promptè & parcius spuma elicitur) albumina singulis libris singula, sed etiā pluribus pauciora iniiciunt, scopulis agitant, ut spumescat, saccharum in particulas con fractum coniiciunt, recoquunt: ubi spuma subsedit, igni aufertur, calidum, si crassum est & vix colabile, colatur, si facile colatur, sed turbidum, tepidum vel frigidum colatur, per manicā Hippocratis, melius autem per pannum clauis quatuor, angulis quatuor firmatum. Colatur autem ter, quater, si non satis claruerit: si ne sic quidem albumen separatim in aqua agitatum, scopulis inspergitur decocto igni reddito, spuma illa

vista, alia iniicitur, idque toties donec bullæ clarum satis produnt. Tunc colatur quoties est necesse.

Cribrationi colatio, ut ante dixi, est per similis: sed illa ferè siccorum est, hæc humidorum. Illa corpora grādiora foraminibus cribrorum non transmittit, hæc sordem humore crassiore transitu prohibet.

Eius differentiæ ex eo sumuntur, quòd quædam calidissima colantur, quædam frigida, quædam tepida. Item quòd quædam vno, alia duobus, alia tribus colis egent. Itē quædam colis lineis, alia cannabinis, alia tela laneis, alia setaceis & stamineis, ut vocāt, alia nouis, alia detritis, alia raris, alia densis, alia bis, ter colanda donec nobis propositam perspicuitatem sint assequuta, ut in syrupis, ex succis fructuum & herbarum, & ex decoctis leges.

Quæ crassa sunt aut læta calidissima sunt colanda, & humore ampliore vel tum diluenda sunt, vel initio coquenda, ut facilius trāsineent. Colo eadē raro & detricto promptius colantur, non tamē purius, sed frequēs colatio coli densitatem supplex, ac raritatis incommodam redimit.

Oenomeli colatur panno raro.

Tenuia ut succus limonum, citri, semifrigida, colo denso, & nouo colari possunt, aut

si tribus colis ea vis purgare, summū sit stamineum, medium panneum: sed vetus infimum panneū & nouum, vel aliter densum.

Sacchari libra si aquæ tantum vnciis octo sit soluta, cocta, clarificata, panno rariore colanda est.

Colis tribus vñ sunt maiores nostri, summo, minimo, & rarissimo, infino, maximo & densissimo, tertio horum medio magnitudine, raritate, situ, vt tamen ab vtroque digitorum. 4. interuallo distaret.

Magnitudinis autem & texturæ horum ratio erat, vt primum sordes tantum crassas transitu prohiberet, secundum etiam mediocres, tertium etiam tenuissimas, vt scilicet quod ad hoc transmittebatur esset illime, & fordīs omnis expers. Si verò solo raro vñ fuissent, colata fuissent impura et non colatis similia, vt si per linteū colas aliquod decoctum, si solo déso id à crassis sordibus statim obstructum aliis viam negasset ob id vel mutandum, vel sæpe abluendum fuisset. Quod si vnico voluissent vti medio, rationabilibus & facilius vñ fuissent. Minimum verò primum, quia in eo humor incipit latius spargi versus panni ambitū, vt vides non in laneis tantum, sed etiā lineis. Gutta enim medio infusa se in vicina spargit.

Ex omnibus autē partibus quas imbuīt,

defluit, ita vt in secundū influat latius, quā in primò humor contentus cernitur. Secundum item latius imbuitur quā quibus partibus humorem à primò incipit, & pluribus partibus stillat in infimum quā sit contactum à defluente ex primò humore.

Male igitur primum statuas maximum, quanquam ex hoc nullum sequetur incommodum aliud, quā quod otiosa est hæc capacitas: Satis enim est si capiendo humori sit satis: quantum intelligi volo dum minimum requiro. Non enim minimum absolute volo, sed aliis duabus angustius: si verò infimum sit minimū, multus humor ab hoc non colatus propè ipsius oras in vas subiectum defluet.

Nunc vnico vtimur colo magnitudine & textura mediocri, sed eius actionem ante iuuamus clarificatione per albumina omnē spurcitiem cogente, adiuuante id frigido. Quæ enim clariora volumus, frigida colamus: aut si talia non permeant, tepida, quæ si semel colata non sunt pura satis, iterum & tertio colamus, & rectius colum aut lauamus aut mutamus. Id quod etiam facimus dum tardius humor permeat: si autem tardius transfluat ob decocti crassitiem aut lentorem, vel calidius colamus, vel per colum rarius, vel si compositi natura patitur liqui-

do

dius aliquid & tenuius miscemus, vt dum cremori hordei colando, aut pisorum, aut fabarum, aut similibum decoctum ipsum afundimus. In tarda autē hac colatura, cauetudicula vel digitis fundum coli scalpas, vt colationem celeres. Sic enim turbidum erit colatum: sed vt dixi mutā colum aut laua, aut humorem redde liquidiorē, vel igni, vel misto humore aliquo.

Colamus quoque etiam citra coctionem quædā, vt lac recens multū, vt pilos & fordes alias foris illapsas separemus, quē vsum rusticis, & pastoribus præstat interdum aparine. Sic hodie vinū cū saccharo & cinnamomo per cola lanea oblōga pyramidis figurā (quæ caligas & manicas Hippocratis appellant) colamus ter, quater, donec omnino clarū erit, idq; Hippocraticū quoq; vocamus, tanquam inuentore Hippocrate dignum.

Aliter etiam cum melle, & cæteris colamus ad claritatem, & cœnomeli id, ac melites vocamus claretum.

Modo per simili gelatinam quam vocāt colamus, vt ante à nobis est scriptum.

Quædam his citius clarificandis miscentur, vt si vni quartæ vini alibi duos lactis digitos misceas ante colaturā, ipsum mox clarissimum reddunt.

Aliter quoque res turbidæ colantur aut

miste: sic in Aegypto aquam Nili turbidam vasis figulinis crudis colari docet Galenus, vt tantum quod clarissimum est per vasis poros, aut etiam teneram & mollem substantiam perfluat. Parisiis autem Sequanæ aquam, & Romæ Tyberinam, vasis figulinis coctis probè & filiceis præsertim, aliquā diu in cella vinaria deponunt, vt refrigeretur, & simul residendo sordem terream in fundum deponat.

Aquam quoq; turbidam colabis per arenas puras vasi inmissas interne pertuso, foraminibus exiguis aquæ peruiis inuiis, arenæ.

Vinum quoque aqua mistum per cissimbium, id est, vas hederaceū tenue, citò perfluit: aqua autem in eo retinetur, vt sæpe sumus experti, ex Catonis doctrina.

DE AROMATIZATIONE.

AROMATIZATIO nobis vocatur conditura quædam, compositis ferè ad odoris spiritum animale simul & vitalem, & cor ipsū recreantis gratiam, adhibita mistis rebus aromaticis.

Simplicibus, vt moscho, ambra, caphura.

Zingibere, cinnamomo, macis, croco, calamo aromatico, spica, pipere albo, longo, nigro, caryophyllis, mastiche, xilaloë, cortice citri, santalis, vel compositis, vt Gallia aromatica, Gallia sebellina.

Mef

Mesues aromatizat moscho diasatyriū
aqua rosarum soluto, & aliis misto electa-
rium, sarbotens diasatyriū, secundum aro-
maticum, rosatum stomachicum.

Syrupus ex corticibus citri, cydonia con-
dita. Citra autem cōdita, moscho & ambra
aromatizat.

Caphura autem syrupum acidum de po-
mis, Trocisco Gallæ Sebellinæ, moscho,
ambra, caphura.

Hydromeli quidam aromatizant specie-
bus, vt zingibere, croco, cinnamomo, macis,
& similibus.

Nodulus ex panno lineo raro continens
croci, cinnamomi, calami aromatici, spicæ,
zingiberis, piperis nigri & longi, ana drach-
mam vnā & dimidiam syrupo starchados
immittitur, & suspensus manet ad condien-
dū, seu aromatizādū, sic miua aromatica no-
dulo aromatū pleno in ipsa suspēso & saepe
confricato, vt ante in cōfricationē diximus.

Syrupus de mentha aromatizatur Gallia
aromatica.

Conditum citri gallia, moscho croco, ma-
stiche.

Conditum buglossi, moscho & gallia.

Syrupus ex omphacio, caryophyllis.

Syrupus intybi compositus fantalis, cina-
momo, xylaloë, cortice citri.

Si

Sic alia multa præter cōsistentiæ & saporis gratiã, odoris quoque iucunditatem, sed etiã coloris, de quo mox, requirũt. De quibus abundè à nobis scriptũ est in methodo medicamenta cōponendi, dum hæc ratione in cōpositis habere docebamus, interdũ sine qua medicamēti actio non fiebat, & per quam melius fiebat. Iulepos ex syrupis & aquis destillatis hodie misceri solitos, apozemata, cinnamomo, & fantalis aromatizamus, immisisis colo horum drachmis circiter duabus in humoris libras singulas, aut pluribus, aut paucioribus pro vario medici scopo. Et vinum aromatites, & quod Hippocraticum vocant, & alia multa aromatibus condimus.

DE COLORATIONE.

COLORATIO quoq; multis medicamētis acquiritur ad gratiã magis & iucunditatē, & terrorem auferēdum, & causas alias, quod etiã lib. 2. methodi medicamēta cōponendi docuimus. Sinopidem aliqui, alii ochram cerato Galeni dia euphorbiu miscuerunt, vt hoc colore fucatum ceratũ, unde cōponitur, lateret misceri potest floris falsi aliquid, aut simile quod colorē eius mutet, neque vim eius minuat.

*Gal. lib. 6
methodi.
Idē ibidē.*

Quæ Galeni verba diligēter sunt obseruanda, ne scilicet coloris mutãdi ratio vires
nou

nouas medicamēto acquirat, aut priores au-
geat, vel diminuatur, siue colorē mutare libet
noua remista, vt in oxycroceo: siue vno ali-
quo simplici aliter atque aliter preparato, vt
ceratū Galeni ex æruginē cruda viride est
acterreus ægros ex eadem vsta est melinū,
vt Galenus docet lib. I. c. ph. g.

Sic ex cerusa cruda emplastrum est al-
bum, ex ochra pallidum, ex iisdem probè
vstis rubrum.

Solus quoq; motus colorem quæsitū sæ-
pe medicamento acquirat, vt ex lithargyro
nutritum longò pistilli attritu fit albius.

Penidia quò diutius rudicula, & manibus
tractatur eò albiora euadit, etiā si ex vili &
impuro saccharo fiant, sic pilulæ albæ, diai-
ris simplex, diatragacanthū frigidū, sic sac-
charum rosatum, & saccharata reliqua.

Mel crudum & coctum in antidotis diu
cōmiscēdo albius euadit, & cætera mellita.

Iulep coctum ad succorum in syrups cō-
prehensionem, baculo diu versandum, vt al-
bescat, & alia multa simili agitato albescūt,
fortè quod aër multus in commiscendo rece-
ptus alborem conciliat.

Sic album rasis vnguentum & citrinum,
& emplastra diachylon, & ceratum Galeni
refrigerās album, de cerusa, gratia dei mul-
tum diuque subigendo, trahendo albescūt,
&

& oxycroceum pallefcit.

Oefypus quamuis niger eft, multa agitatione album facit emplaftrū, vt glutinofa alia.

DE EXCEPTIONE.

EXCIPIVNTVR & comprehenduntur colliganturque, feu vt vulgo loquuntur incorporantur medicamēta humore aliquo ad faporis gratiam diuturnitatem, virium conſervationem, fermentationem, medicamenti conſtituendi formam, vſum dexteriorem.

Elegma ad aſthma melle excipitur, vt fit ſuavius & vſui aptius.

Elegma amygdalatum excipitur melle, & ſucco ſceniculi.

Electaria propè omnia, præſertim mollia melle excipiuntur ob dictas cauſas, ſicca ſaccharo humore aliquo ſoluto, pulueres ſucco cucumeris agreſtis comprehenduntur in hiera Hermetis.

Pilularum materia excipitur vino, ſucco abſynthii, ſolani, foliorū citri, braſſicæ, apii, intybi, pilulæ aureæ muceagine tragacanthi, coſtiæ raiſis, & Meſuæ ſucco abſynthii.

Pilularum hermetis ſpecies ladano excipiuntur cum piſtillo calido.

Trocifchi galliæ moſchata cōprehenduntur

duntur muccagine, tragacanthi in aqua rosa
rum soluti, vel ambra oleo balanino soluta.

Mel quo solutiva excipiuntur vino quā
aqua potius coquendum & despumandum,
nisi aliquid prohibeat.

Exempla alia ipsius, ut sic dicā, incorpo-
rationis in electariis Mesues antidotisque
aliis & ceratis, & emplastris tam sunt multa,
ut nemo desyderare possit: nec plura descri-
bere libuit, ne oratione proluxa displicerē.

DE FORMATIONE.

OR DINE rerum gerendarum succedit
medicamentorum cōprehensionī ipsa
eorum formatio cuique composito sua cūm
scilicet vnumquodque formam habet ido-
neam, quā in quibusdam a consistētia dif-
ferre non videtur, ut in conditis, sapis, syru-
pis, elegmatis, apozematis, antidotis mel-
litis, pilulis, trocischis, vnguentis, ceratis, em-
plastris. Forma ipsius compositi est confi-
sistentia liquidior, crassior, mediocris. Sed in
multis praesertim siccis, praeter hanc confi-
sistentiae formam alia quaedam nostris mani-
bus, aut alia re apprimitur, ut saccharum in
vasa dum recens coctum est coniectū, Illo-
rum formā pyramidis, scilicet ac metae cu-
iusdam retinet, & quae ex saccharo imagines
formatur, aut cera, aut alio dum calet liqui-
do, ob id terminū alienū tacile induente dū
ref

refrigeratum coiuit duro, ob id formā tunc assumptā pertinacius retinente: sic electaria solida & tessellas, nūc rhōboïdes, nūc quadratas, nūc quadrāculas: sed altera parte longiores, quales manus Christi vulgò dicuntur, nūc triangulas: sic pilulas fingimus orobas. i. magnitudine & figura orobi, vel ciceris, scilicet orobei, nō arietini quod inaequale cūm sit & acuminatum, figurā habet pilulis ineptam, sic & κόκκισα, id est granula, seu pilulas paruas (vnde vt dicemus libro. 3. pilulæ cocciaē rasi, & vulgò dictæ videntur) granorum, scilicet paruorum magnitudine & forma fingit Paulus.

Nicol. Alex. in gal. Trocisci quoq; cōplanātur, & in medio cauātur, & ferè postea sigillo aliquo pressi notātur. *lia moscha* Qua de re mox quoq; dicturi sumus, vnde & à forma hac, vt pilulæ à parua pilæ effigie nomē sibi adoptauerūt, & præter id alię quoq; nā cyclisci. i. parui circuli, & artici. i. pastilli, seu parui panes etiā Græcis appellantur. Sunt enim velut circuli, hoc est, superficies planæ vna circūferentia à centro æquidistante conclusæ, non autē sphaerica sunt corpora, vt pilulæ.

Cerata & emplastra formamus in offas, quæ apud Galenū μαγδαλιται vocātur (vnde vulgò corruptū puto vocabulū magdaleones) hoc est, cylindræ quædam figuræ.

Quæ

Quædam trahendo manibus ex vnco ferro producuntur, intorquentur, & in quâlibet figuram mutantur, vt penidia, & quæ alpheni vocant.

Qualiter quibusdam quoque trahuntur emplastra, diachylon, gratia dei, sed post in magdalias componuntur.

DE SIGILLATIONE.

SIGILLATIO quoque (vt vocant) seu sigilli alicuius impressio, inter præparationis differētias numerāda est. Quæ quāuis haud ita magnarū virium esse videatur, vt cūm ex pilulari forma per sigillū ligneū fingis trociscos, tamen & per se veteribus magni momenti fuit, & per accidens sigillatio. Per se quidē, cum terram Lēniam sigillo Dianæ imaginem habenti notabant, à qua facultatem aliquam his trocischis imprimi putabant, vti & Nichepsos rex anulis insertum iaspidem viridem draconis radios habentis imagine scalpi volebat, quod tamen ceu vanū reiiciēdum censet Galenus. Quāquam & illa Dianæ imago in sphragide lemnia, hoc est in sigillo, seu sigillata terra Lemni insulæ, etiam per accidens proderat, quòd pastilli hac notati planè veri significabātur, non quo hodie modo omnes adulterinæ nostrates terræ sigillatæ. Idem ad me Constantinopoli sunt delati, caracte-

ribus variis à Turca obfignati.

In pastillis quoq; Theriacis, & medicamentis omnibus, quæ ab exteris corrogamus, utinam vel characteres aliqui, sed certi fide, vel publica, vel principum apprimerentur, quod pannis laneis, & sericis gentes multæ etiâ hodie factitant. Non enim toties grâdi pecunia adulterata & spuria pro veris recipe remus. aut saltē qui vendunt primis institori bus, & hi deinde aliis, chirographo, aut sacramento aliquo cuique verendo vera se vèdere affirmarent, sed nostra opinor socordia illos efficit audenter furaces. Cum enim vera ignoremus, neque illa nouisse multum hæcenus sit à nostris pharmacopolis laboratum, facilè illis imponitur, Incumbite igitur, incumbite modis omnibus, ut vera deinceps habeantur. Homini elephântico dedi, non multis ante mensibus trocischorû theriacorum libras propè duas, quibus non est mutatus magis quàm si terram sigillatâ nostratē deuorasset, tamen qui vendidit affirmabat è monte Pessulano allatos & veros. Quod tamen falsum illi ex Galeno probavi, tamen quia egebatur, & veros affirmabat, grâdi pecunia emimus, nullo tamen, ut dixi, successu. Quæ fraus in cæteris quoque medicamentis, nisi diligenter cauetur, latè patet, magna animaduersione coërcenda.

De

DE REPOSITIONE.

REPOSITIO medicamentorum tam simplicium quàm cōpositorum in locum aliquem, tum cōmunem, tum propriū ad cōseruationem (de qua mox dicam) magni est momenti, & item quod quædā per se reponuntur, alia cum aliis ipsorū virtutem conseruantibus, vel etiam augentibus, aut saltem quam minimum fieri potest minui permittentibus. De hac generatim quædā diximus libro tertio methodi medicamēta componendi, sed hic paulò fusius dicēdum.

Reponimus quæ seruari volumus, cōseruationem verò nihil tam vitiat quam putrefactio. Quā ambiēs calor, aut frigus, aut aër corruptior, aut excrementosa rei seruanda humiditas, & calor imbecillus accersere solet, ob id quæ integra diu seruari volumus omnino siccamus, tū absumpta ipsorū superflua humiditate, tum mistis siccantibus: sæpe etiam astringentibus, sic condita, sapa, syrupos, antidota ex humidis perfertim temperata, pilulas, trociscos, & vnguenta quædam & cerata & emplastra igni, vel sole siccamus, misto his quæ sumuntur etiam melle, aut saccharo, aut vtroque remedio siccante: aliquibus, & aceto, & sal profunt, aliis metallica, & terrea ob siccitatem putredini diu resistentia.

Ergo quæ reponēda sunt simplicia, & cōposita omnino quantum opus est sint sicca: sic & vinum feruendo in lacu, aut dolio humiditatem corruptionis sui, & feruoris autorem si validum est, nec ea tam multa cōsumit, calorem externum vitamus fuga solis, & res ipsas in loca minus calida, aut etiam frigida seponendo. Frigus immodicum & gelu ab his tantum prohibemus, quæ humida cogi possunt, vt aquis destillatis.

Calorem internum imbecillū fouemus, prohibita eius exhalatione, ob id quæ seruamus omnia oculis clausis, & vasis obturatis reponimus, nisi valentissima sint, theriaces enim vas sæpe detegi vult Galenus, vt expiret. Ad hæc rha barbarū, vt viribus integris diutius seruetur, vel cera sola, vel cera cū terbinthina, aut melle albo circumlinit. Mel. vel psyllio, aut milio mergit. Agaricū idem cum zingibere, dauco ligustico, polipodio querno seruat vt eius actio vegetior reddatur. Aloë seruatur cum aromatibus aut bdellio, & alia similiter in Mesuæ simplicibus.

Cassia verò in fistula sua foelicius seruatur, nec purganda ante vtendi tempus. Fistula autem in sabulo cellis vinariis infossa, ficcari præpropere prohibetur.

Colocynthis integra diutius seruatur quàm emedullata, & melior ac salubrior

eua

euadit cum mastiche, galanga, & aliis stomachicis, hepaticis, cardiacis.

Phialæ succo rosarū, granatorum, limonū, cydoniorū, & similibus seruando destinatæ habeant in fundo emissariū, ne inuertendo fuga olei superfusi succus turbetur, & fex continui misceatur, & sic turbidum pro puro succum vsurpes.

Crusta quæ melli & medicamentis quibusdā tempore accrescit integra & immota seruanda est, si vis pharmacū diu manere integrū & immutatū. Gal. lib. 2. alimentorū. Quæprouidētia succis predictis, vino quoq; & cæteris est communis. Diabesasa stanneo vase reponi vult Heras li. 8. cō. ph. p. Gale.

Medicamentum stomachicum vase corneo reponitur, eodem libro.

Terebinthina vase ex ferro albo aut vitreo aut filiceo seruatur melius quā ligneo aut terreo, nisi sit vitreatum. Vase vitreo vel plumbeo hieram reponit Paulus.

Theriacen vase non ligneo, vt hodie fit, sed pretioso reponit Galenus.

Oleum vase filiceo, lapideo, plumbeo in cella vinaria probè diu seruatur.

Pulueres cardiaci vase vitreo strictioris operculato reponuntur.

Flores & omnia iucundum odorem redentia arculis tilaceis.

Semina etiam chartarum inuolucris, & suis folliculis vtilius, & innocentius interdū feruantur. Liquida medicamenta feruantur densiore materia, vt argentea, vitrea, cornea. Fictili etiam, modò non rara: interdū & lignea, præsertim buxea. Ocularia medicamenta & alia quæ acetum, picem liquidā, cedriam recipiunt, aneo vase seruanda. Adipem & medullas vasis stanneis, seu ex plumbo albo reconde, hæc Dios. Herbar igitur ficcetur & fasciculis aut manipulis colligatæ.

Quæ cōponendo cocta, aut aliter calfacta sunt, non nisi refrigerata sunt reponenda.

Diacodium refrigeratum reponit Damocrates, apud Gal. lib. 7. c. ph. p. & similiter composita propè omnia Mesues.

Loco non vluinoso & madente reponantur medicamenta, exceptis paucis, sed ædium parte ficcior. Quæ reponuntur si prætereà feruere debent, vas non repleant, vt sit locus & spaciū quo perspirent: sic vina doliis non plenis reponuntur primò, sic conseruæ insolatu coquendæ, vasis non plenis coquuntur, sic theriacen vasis non plenis reponit Galenus, quo tempore adhuc à suo calore coquetur & feruet.

DE CONSERVATIONE.

HÆC de repositione sufficiant, in quibus tamē ob rei affinitatē cōseruationis

nis quoque obiter coacti meminimus, sub qua & medicamentorum simplicium & compositorum durationis tempus comprehendimus. Vt enim non minor est virtus quam quærere, parta tueri, sic non satis est medicamenta probè delecta esse, sed ad conseruationem commode reposita esse, & quandiu integra conseruari possunt, sciendum est. Nam si mors etiam saxi numinibusque venit, omnia tam simplicia quam composita aliquando corrumpuntur, hæc citius, illa tardius: idque vel ob peculiarem cuiusque naturam, vel aëris constitutionem, vel repositionis differentiam.

Herbæ quotannis sunt mutandæ, & flores, & quæ ex his destillantur aquæ præsertim quæ vase duplici, aut vapore aquæ feruentis destillantur. Humidiores enim sunt quam quæ ignis flammæ, & carbone etiam per cinerem, scoriam ferri puluerem, sabulum destillantur.

Aqua tamen vini quæ frequenti destillatione est purgata, diutius seruat in vase vitreo cera obturato. Seruantur autem herbæ ficcatae sacculis cannabinis rarè textis ne putreant, nèue puluerulentæ euadant.

Radices multæ diutius seruari possunt, vt in delectu diximus libr. I. vbi & de reliquorum quoque duratione quantum sufficit

scripsimus, seruantur siccatae per se aut conditura ex saccharo, aut melle per se suspensae in aëre libero si magnae sint, in sacculis cannabinis si paruae, fructus in melle cōditi sic, vt se nō tangant, & loco frigido repositi annum seruantur recentibus simillimi.

Iidē & flores vasi inclusi aqua fluente te-
cti annū seruantur. Vinum musteū dolio picato impositū, & eodē bene operculato sepultum dies 40. aqua fluēte, vel aliter pura, annum totum dulce permanet Catoni. Iidē cera inuoluti, farragini impositi, aut fursuri, diu seruantur recentibus similes.

Herbarum quoque folia citra siccationem sibi simillima diu seruantur inter papyri folia: sic tamen vt non præmantur. praesertim quae succulenta sunt. Nam haec mox mu-
cida & putria euadunt si præmantur.

Aloë etiam solario appensa tres, quatuor annos viua, & germinās seruatur, & aizoon, & telephium ob succi crassi copiam.

Quin & cape, allii, scillae, ari, dracon-
tii, cotyledonis, satyrii, & aliorum quorundam radix bulbosa succo crasso lento plena diu seruatur citra vllam à nobis, aut aliunde siccationem manifestam.

Metallica & lapides vbilibet probè seruantur, si sordes & puluerem vitabis.

Composita autem medicamenta nobis
hō

hodie variè seruantur, nam condita humi-
da, elegmata, syrupi, electaria mollia, vase
vitreo, vel filiceo, vel terra densiore potius
quàm stanneo plumbi vitium retinente ser-
uanda. Electaria autem sicca arculis faginis,
aut pyxidibus vitreis, vt pulueres & troci-
schi. Catapotia aut ferè aluta inuoluta, pyxi-
de stānea includuntur. Olea, vnguēta, cerata
liquida vitreis, lapideis, stanneis, emplastra
verò in magdalias formata papyro vndique
præterquàm extremi medio integuntur.

DE CONDITURA.

DE CONDITURA nunc dicēdū quōd
ea sæpe coctio quædam est (de qua &
præparationibus aliis ipsam coctionem se-
quentibus abundè diximus) & cōditura con-
seruationi non parum confert. Conditura
ferè est radicum, herbarum, cauliculorū, aut
germinum, florum, fructuum, seminum, in-
terdum & corticū. Fit item ferè saccharo,
vel melle, vel vtroque, interdum syrupis, iu-
lepis, sale, aqua falsa, aceto, & aliis quæ siccā-
do, & humiditatem superfluam absumen-
do, astringendoque à putredine res vindi-
cant. Condiuntur enim prædicta ferè ad
conseruationem tutiorem, sæpe tantum ad
saporis gratiam, sæpe ad vtrunque, vt suc-
cus mororum in diamoro melle conditur.
Possisquæ conditura generatim dicta etiam

syrupos, & antidota plurima, & pilulas, & trociscos cōprehēdere, quod hæc humore aliquo iucūdo cōprehenduntur, vt sint iucūdiora, & facilius sumi possint: sic rosæ violæ, & flores alii melle, aut saccharo cōdiuntur, & fit mel rosatum, violatum, vt in conditis Mesuæ diximus, & lib. 3. dicemus.

Cōditura fit humore hoc iucūdo per totum corpus condiendū insperso, vt dum flores & fructus cōdimus, & corticē citri, & cucurbitæ, lactucæ, caules, & alia plurima: sic myrobalani recētes cōdiuntur, aut humectatæ prius si erāt sicciores, vt docuit in simplicibus & cōditis Mesues, interdū tanquā crusta quadā saccharo integimus magis ad saporis gratiam quā ad vires, vel augēdas, vel conseruādas, vel minuēdas: sic semē coriandri, papaueris albi, absynthii marini, anisi, fœniculi, apii, & nucleos persicorū, strobilorum, pistaciorum, amygdalarū dulcium, & si libet amararum saccharo integimus, & cortices aranciorum, cinnamomi.

Interdum condimus additis quibusdam medicamentis aromaticis, vt emblicas myrobalanos aromatibus condiri Mesues scribit, & alia etiam composita: sed condiri tūc aromatizari potius significat, quanquam & ad saporis gratiam, id etiam fiat, vt in fartura nox dicam.

Con

Condienda si magna sunt, ferè in particu-
las secantur, ut condituram promptius ubiq;
sentiant, sic cydonia, sic persica, & radices
magnae sectae condiuntur.

Tamè fistula caisiae tenera cõditur inte-
gra, & nux moschata cū cortice viridi, qua-
lis nostrati nucū integra cõditur, et parua ci-
trea, aratia, melones parui adhuc & teneri.

Quāto autē melle, saccharo, vel alia cõ-
diente materia sit opus, & quis modus con-
diendi, hoc est incrustadi, praesertim semina,
& nucleos, leges lib. 3. sectione prima.

Flores capparis nondū apertos intersper-
so sale condimus, nam si soli reponantur, pu-
trescunt. Eodem modo & in eosdem usus
flores genistae, & his odoratiores sparti flo-
res, quibus tamen post acetum affundimus
quantum omnia tegere possit.

DE FARTURA.

FARTURA conditurae quaedam differe-
ntia est: sit autē ferè dum cavitates quae-
dam manifesta odoramentis, vel aliis scopo
proposito idoneis impletur, quomodo &
coqui pullos, anseres, porcellos, & alia quae-
dam herbis nostratibus aromaticis, & floribus,
& lactuca, & appetitis aliis, interdū ad-
ditis etiam aromatibus faciunt ventrem to-
tum inferiorem, & saepè etiam spacia inania
inter carnem & cutem vi deducta.

Sic

Sic elignatæ radices eryngii & sectæ loco matricis (cor vocant) caryophyllo, & cinnamomo humectatis farciuntur à Mesuæ.

Anserem exenteratum carnibus felis ananosi, & herbis nervosis facimus, vt inde eliquatus adeps sit medicamentosior.

Farcitur pileolus ex bombace, aut aliud epithema cephalicum, vel stomachicū aromatibus, & aliis cephalicis, stomachicisque.

Præterea vt coqui carnes auium torrendas, caryophyllis, & frustulis cinnamomi cōfigūt ad odoris & saporis gratiam: sic nuces virides maceratas, & coquendo teneras reditas, & radices satyrii, ex secundo cicerum decocto ad iustam teneritudinē coctas, caryophyllis, & cinnamomi frustillis configimus, & cydonia in particulas cōdiēda. Quæ res ad farturam, vel vna cum fartura ad aromatizationem reduci potest.

DE PUTREFACTIONE.

PUTREFACTIO coctioni simillima est, præsertim de qua nunc agimus, non enim de absoluta putrefactione, sed mutatione aliqua à calore externo, etiam rerum putrescentium, vt fimi corticum facta, vt oleum in folliculis vlni inuentum, phialæ forti impositum cum folliculis si operculetur, & dies quindecim fimo equino multum obputredinē vigentē calenti obruatur. Deinde

de insoletur, & quod eius clarum superna-
tabit transuasetur, omnium vlcerum reme-
dium est præstantissimum.

Sic ex vino facimus acetū tenuius, & acre
magis ac mordax. Facimus autē vel in sola-
tu, vel immisso aceto valentissimo in vinū,
vel foliis, surculis & ramentis sorbi, vel par-
te acida citri immissa Galenus libro secun-
do alimentorum. Sunt qui linguas lampe-
træ nostratis ea causa immittunt.

Ex maza item fermentum, & ex lacte in
primo animalium lacte nutritorum ventri-
culo corrupto fit coagulum, omnia ob pu-
tredinem acria, & caliditatem nouam ade-
pta, amissa autem naturali.

Sic chalcitos partes duas lithargyri, vel
cum Dioscoride cadmiæ partē vnā aceto
accerrimo soluit Galenus, ac æstate media,
seu diebus calidissimis quadraginta in olla
noua fimo obruit, vt fiat psoricum. Talis pu-
trefactio in vsu est maximo chymistis.

Sic adeps vetustate putris Galeno expeti-
tur ad emplastrū dichalciteos, & oleum ve-
tus ac ita semiputre, vnde & graueolentiam
acquirat: sic vetustate putrefactū caseū de-
cocto perniæ salis, coquit Galen. ad tophos.

Quid quod vinum & succi reliqui dum
ab humiditate excrementosa feruent, quo-
dammodo putrent, & flores saccharati, aut
mel

melliti dum insolantur, & antidota melle
ad dito cum feruent.

li. 4. sani.
tuende.

Acopa item ex semine abietis, & floribus
populi dum menses plures macerando perfici-
cit. Gal. etiam putrefacere videtur.

DE FRIXIONE ET
assatione.

COCTIONI non modo affines sunt fri-
xio & assatio, sed frequenter etiam ut
in alimentis coctionis differentiæ, tamē quæ
medicamentis adhibentur coquere raro vi-
dentur humiditatem crudam, aut excremen-
tosam: sed magis absumere.

Frixio autē ferè in sartagine fieri intelli-
gitur, quæ à frigendo etiā frixoriū dicitur.
Hæc autē in sartagine parata suæ qualitat-
is vehementiam deponunt. Gal. lib. 2. alim. in
dracontio, assatio autem seu torrefactio su-
per regulam ignitam fit: vel in clibano, vel
in carbonibus ignitis, hæc quoniam tenui
discrimine distant, & ambo à calore fiunt,
simul tractanda duximus.

Semen melanthii frigitur Galeno con-
tra catarrhos, semen agni frixum minus ten-
tat caput eidem lib. 2. alim.

Mesues.
Ibidem.

Semen lini & nasturtii torrefiunt in ele-
gmate Phthysicorum, Mesuæ.

Semen porri & nasturtii in E. nostro.

Cuminum pridie aceto maceratum sic

ca

catur, & frigitur in vase fictili bene cocto.
Gal. in diolpolytico lib. 4. sanit. tuendæ.

Coriãdrum acetum infusum assatur pas-
sim, sic enim calorem eius in superficie vehe-
mentem extinguere volunt, vt tantum refri-
geret? Granatorũ acini assentur in E. altero
Mesuæ, & semina vuæ, portulacæ, psylli,
plantaginis, altheæ, anisi, marrubii, ad fluo-
rem alui assantur. Gale.

Baccæ myrti, gallæ: in quinq; aut sex par-
tes cõfractæ, oleo hora vna infuse assentur
ad capillũ fluẽtẽ sistendũ. Sit autẽ oleũ a-
stringẽs aut succus alius, si magis astringẽdũ.

Myrobalani omnes succis astringẽtibus
variis maceratæ, linteo siccatae assantur, sed
antequã nigrescãt, & vrantur eximendæ, ne
vires amittant. Si insigniter scilicet vrẽtur,
vt cinefiant. Nam hæ & rha barbarum, assa-
coctis, vsta absis magis astringunt Mesuæ.

Balanus myrepfica assando deponit par-
tem humiditatis excrementosæ, & partem
coquit, ob id assata delectoria tantum est,
non amplius vomitoria.

Auellanæ assantur in elegmate pineo.

Gummi Arabicum, tragacãtha, succinũ,
& gummi alia ad magnitudinem orobi con-
fracta, cũ opus est assantur donec albescãt.

Amylũ assatur in trocischis terræ sigilla-
tæ, & trocischis spodiatis secundis, Mesuæ.

Mod

Modus autē frigendi & affandi prædicta est huiusmodi. Sartaginē, vel aliud vas ferreum ubi admodum calet, ac si opus est candet ab igni tollitur. In hanc semina, fructus, radices & alia immittuntur, continenter rudicula ferrea versantur, ne viātur. Sartago, si opus est, his exemptis recalefit, & quantū opus est affantur.

Quæ autem sunt magna, crassa, humida, glutinosa, diutius affanda, contraria minus, ut semen anisi, cymini, nasturtii. Semen verò lini & psyllii, quia humiditatem lentam satis multam sortitū est, paulò diutius affari sustinet.

Possunt quædam etiā in clibano, aut super eius testudinē, aut sub cineribus affari, & ea vel nuda, vel olla noua conclusa, & si mediocria sunt integra: si magna, cōfracta, quædam etiam maza intacta clibano affantur.

Scilla per affationem multi fit vsus Dioscoridi, quia per eam vel elixationem eius vehementia obtūditur Galeno. Quæ enim non affata sumitur, interaneis maximè noxia est Mesuæ. Illa autem delecta, purgata farina, pinsita, aut (id sordidum videtur Galeno in Theriace) luto, & argilla circumdatur in digiti crassitiem, sub cinere calido, vel carbonibus, vel clibano affatur. Sunt qui in olla operculata in furnū demissa affant:

sic

fic enim celerius & clementius purgat. Sic helleborus albus, & scammonium in maza pista, vel cydonio præparatur Diosc. & Galeno, vt ipsa & panis, & cydonium moderatius purgēt. In vas calefactum quoque, & ab igni depositum opium mox immittunt, vbi est liquatum, eximunt priusquam siccetur, & friabile fiat.

Acaciam nostratē factitiā super prunas ignitas affat Bulcasis in seruitore. Est quando vt alimenta sic medicamenta ex humore friguntur: nam castaneæ sine humore, fabæ, pisa, carnes, fungi, cū humore, vt oleo, butyro, Sic myrobalani, flauæ, cepulæ nigre friguntur & fricantur in oleo violato, aut amygdalarum dulcium in tryphera Persica & in simplicibus. Omnia probè trita friguntur in omphacio, vel succo myrti, & aceto, & siccantur in stomachico electario quodā Mesuæ. Omnia in vino odoro frigantur, deinde in succo cydoniorum in E. nostro Mes. Addit in sequenti, & feruefiant, vt intelligere possit, hæc frigenda super ignem semper mouendo, & confricando: non solum fricanda, cum his humoribus, vt diximus prius in confricatione.

DE VSTIONE.

VSTIO affationi finitima, vt ratione maioris, & minoris tantum differant;

affata enim largius vruntur, & infra modum
vsta, tantum affantur. Vruntur plantarū par-
tes ac animalium, & in animalia tota, metal-
lica item & terrea. Horum autem medica-
mentorum vrendorū scopi medicis sunt va-
rii. Quædam enim vruntur vt puluerari fa-
cilius possint, vt pili, lana succida, sericum, te-
stæ ostreorum, buccinorum, purpurarum, vi-
gues asini, cornua caprarum & ceruorum,
ossa, coria, & alia quæ ob terrosam, & du-
ram, & crassam corporis consistentiam &
concretionem densatam vel ob lentorem
immodicum vel humiditatem aliquam pul-
uerari nequeunt.

Alia vt essentia crassitiam deponant, &
tenuitatem, aliasque facultates igneum co-
lorem sequentes induant. Id quod quam-
uis omnibus vstis accidat, non ob id tamen
omnia vruntur. Sic metallica omnia & ter-
rea vrendo tenuiora euadant, & quæ acria
erant, mitiora fiunt, quæ non acria erant,
acrimoniam vrendo assumunt Gal. libr. 4.
& 9. simpl. in chalciti.

Ex quo patet vstione etiam facultates
quasdam mitescere, vt arugo, chalcitis,
misi, fori, chalcanthum, melantheria fiunt
moderatiores: quasdam acquiri, vt vim te-
nuandi & ea efficiendi, quæ saporem acrem
sequuntur.

Alia vrūtur, vt vis quardam nostro proposito aliena, ex profundo in superficiē trahatur, postea lotionē separetur: sic lapidem phrygium vstum lauat Galenus, & lapidem hæmatitem ad oculorum affectus.

Alia vruntur, vt colorem nouum acquirant ægro gratiorem, vel ad dissimulanda simplicia, quibus constat medicamentum, sic ærugo vsta modicè quidem, rufa facit emplastra, immodicè verò, nigra.

Cerusa trita, rudicula terrea mota vrendo fit rubra, vt ochra, & auri pigmentum. Ossa & testæ vredo primum nigricant, deinde albissima euadunt.

Quædam vruntur, vt in aliam transeant speciem, vt vipera vsta transfit in salem theriacum, cerusa vsta vt rubeat in sandyca, thus in fuliginem, sulfur in oleum, cadmia lapis in cadmiam fornacariam, & pompholygem & spodium.

Vrendi modus non est omnibus vnus. Quædam enim humore pingui prædita perse vruntur, vt pili, lana succida sericum, cornua, vngues, coria, hirūdines, motacilla, gallerita, & aliæ quædam auiculæ, cicada, scorpiones, viperæ, lepores, & alia quædā pedestraria. Hæc verò in olla noua operculo foraminulento recta sunt vrenda carbonibus vel clibano, præsertim quæ propè ciner facta

disperire possunt. Quæ verò post vstionem integra manent, vt ossa, vngues, cornua, testæ ostreorum, lapides ad gypsum vel calcem coquendam & similia: hæc etiam viuis carbonibus obruta vel superposita, aut etiã flammæ luculentæ immissa, vri possunt: nisi quædam sint addenda, quæ vim eorum mutant. Tunc enim etiã in olla noua vruntur. Sic viperas cum substratis quibusdã medicamentis Galenus vrebatur ad salem theriacum: sic fictili nouo inclusa vel patellæ ferreæ, aut sartagini imposita vruntur, cerusa, chalcitis, mifi, fori, calcanthum, auripigmentum, sandaracha, plumbum.

Alia fictili crudo vruntur, donec id percoctum sit, vt cadmia, æs.

Alia etiam olla ænea aut ferrea, vt plumbum.

Alia in patina vruntur, vt ærugo, chryso colla, lithargyros.

Alia in olla ex cineribus ossium (crucibolum vocât) in fornace aurifabrorum alia in foco, alia in clibano panis, alia in furno figulorum, alia in fornace chymistarum.

Quædam (vt dixi) tam carbonibus obruta quàm olla vel noua, vel cruda, vel patina excepta per se vruntur nulla addita inflammabili, aut vires mutate materia, vt ossa, cornua, testæ ostreorum.

Alia

Aliam materiam requirunt inflammabilem, ut sulfur alumen aliquod salē, ordeum, ut in plumbo vsto & aliis docuit Dioscor. Vas item quo excepta vruntur si fragile est, ut vitreum, ex terra bellouaca & alia lapidea & silicea luto chymistarum prius totum paulatim oblinimus, & paulatim ficcamus, quam igni committamus. Eodem luto vasi operculum saepe agglutinamus, ne inter ipsa hiatus viam faciat carbonibus, aut cineribus illapsuris, aut effluxuræ materiæ.

Lutum autē, id fit ex terra figulina aqua macerata cum stercore equino, & si vis pilis animalium multū diūque subacta, quod & lutum sapientiæ vocant chymistæ. Eius loco interdum est terra figulina sola, vel gypsum aqua solutum, vel farina albuminibus subacta.

Vas quoque chymistæ operculant labris ipsius colli per fusionem coalescentibus, dum materiæ sunt pretiosæ, & quas exhalare nolunt. Id autem in matulis tantūm vitreis longo collo efficiunt, sigillūque hermetis vocant.

In aliis fictile apertum esse nihil nocet, si clibano vrenda sunt: si verò cineribus aut carbonibus obruenda, operculatur vas, ne aliena materia quod vrendum est, ut dixi, conspurcetur, vel ne materia ipsa exiliat,

vt in sale & lapidibus quibusdam.

Operculum autem nunc solidum est, & integrum, nunc multis locis foratum, vt fuliginosi effluxus exhalent liberius, à quibus est cauendum, præsertim si à vipera, scorpionibus, aut similiter venenosis attolluntur, item si à metallicis.

Vratur materia carbonibus perustis, præsertim pretiosæ, & quæ oculis sunt adhibenda, vt nihil fumidum habeant, vt Galenus vrebatur lapidem phrygium.

Carbones quoque follibus vel flabellis excitari interdum oportet, vt citius vstio absoluator, vt Galenus in vstione lapidis phrygii iubet. lib. 4. c. ph. p.

Quædam ad idoneam magis vstionem puluerentur, alia frangantur tantum in frustula magnitudinis nucis iuglandis, vt lithargyros, vel nucis auellanae, vt lateres in oleo philosophorum, & lapis phrygius à Galeno in suo remedio.

Alia etiam in sole æstiuo ex vino vel aceto pluribus diebus teruntur, priusquam vrantur, in. c. ph. g.

**Plantarū
partes.**

Quæ omnia bis exēplis ex Dioscoride, Galeno, Mesuæ, & aliis fient notiora, folia oliuæ sylvestris in olla fictili cruda, lutata furno figulino, per coctionem vasis vsta, lota, ex aqua in sole siccata, albuginem oculi
&

& pannos potentius omni pompholyge de-
lent Albucasi.

Sarmenta ligna, cortices & partes aliae
plantarum vruntur relicto tamen foramine
in operculo, vt fumus exhalet.

Abrotani, asphodeli, ari, arifari, dracōtii
vsti, cinis Galeno passim vsurpatur.

Brassica non transplantata, à terra expur-
gata, minutim concisa, in ollam coniecta, fo-
raminulento operculo tecta clibano vritur
in carbones, qui triti ollae alteri impositi,
operculati, vruntur donec in album cine-
rem abeant.

Myrobalani & rha barbarum vsta valen-
tius astringunt quàm assata Mesuae.

Aloe quibusdam in olla noua super pru-
nas vritur in diamoscho amaro, vt absum-
pta glutinosa substantia aluum ducere de-
finat, & magis roboret, ob quam causam
etiam abluatur.

Fex vini ficcata vritur igni, donec albe-
scat, & linguam multum mordeat & vrat.

Succinum fictili olla clausum, opercula-
tum nocte igni vritur Bulcasi.

Thus vstum scribitur in Iside cephalica, *Animalia*
lib. 4. c. ph. g. & ipsorum

Vsto thure fuligo qua ratione colligen- *partes.*
da docet Diosc.

Lepus viuus iugulatus cum sanguine &

pelle vasi fictili nouo traditur, operculatur, in clibano vritur donec puluerari possit ad calculum frangendum.

Sic hirundines, ianae, cicadae, erinaceus, vruntur Gal. lib. II. simplic.

Aeschrium caneros viuos in patella aeris rubri vsit donec in puluerem mollissimum redigi possent contra rabiem.

Gal. li. II.
simpl.

Testae ostreorum, limacum, ouorum exclusis pullis, sericum, ossa, cornua, ungulae, vel prunis ipsis vel tegulae aut olle imposita in clibano, vel foco vruntur, donec albescant, & puluerabilia sint. Haec tamen non vrenda, nisi medicus iusserit, quia vires vstione mutant. Possunt enim tenuissimè limari, aut radi, vt cornu rhinocerotis, pudendum tauri, cerui, & puluerari, vel probè limata propinari, sericum similiter cardiacis miscendum sit crudum, minutim, cōcisum, cum aliis pulueratum, vstum autem medicamentis materias consumpturis miscetur, vt diasenne Nicolai, Spongia bitumine, vel eius penuria pice illita vritur lib. II. simpl.

Gal. lib. 6
c. ph. p.

Lana succida largo vasi figulino lati oris imponitur, operculatur, gypso, vel glutine, vel terra figulari subacta cū aqua illinitur, vritur fornace, vel camino. Scorpiones viui olla noua inclusi, & operculati, maza vel luto circumlita vruntur igni ex sarmentis vi-

tui

tium in clibano, vt eius pulueris grana sex cum syrupo radicum quinque pota renum calculum frangant.

Sic vruntur viperæ & colubri. amborūq; *Metallica cinis ex oleo illitus scrofulas liquefacit. Li- & terrea.* thargyros chrisitis, grauis, pura à plumbo, & omni aliena materia in particulas magnitudinis iuglandis contracta, prunæ superponitur, & ita follibus accenditur, vt conflagret, vbi refrigit, abstergitur infidens spurcitia, & reconditur, alii ter aceto aut vino restinguentes rursus vrunt, & reponunt.

Cadmia vritur carbonibus obruta, donec *Diosc.* translucida spectetur, & ferreæ scorix modo bullet, mox vino extinguitur aminco, si ad emplastra paratur: aceto autē, si ad pforicum medicamentum. Sūt qui sic vsum ex vinoq; tritum, iterū crudo fictili torrent, donec pumicosa videatur iterumq; ex vino tritam vrunt tertio, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiei retinens.

Ibidem.

Plumbi laminæ quàm tenuissimæ, aut plumbi limatura & sulfur alternis vasis imponuntur, donec plenum sit, operculatur, sed relicto exili spiraculo succenditur, dum plumbum ardet rude ferrea versabis donec tantum perfectè in puluerem redigatur, dum eximes, obstrue nares quòd eius halitus sit noxius.

Ibidem.

Stibium pinsita farina circumlitū, & carbonibus obrutum torretur, donec ipsa crusta carbunculetur, exemptūque extinguitur lacte mulieris, quæ marem peperit, aut vetere vino, vel vritur carbonibus succensis, efflatum quoad ardeat. Si enim paulò magis cremetur, fit plumbum.

Cerusa trita in fictili nouo, flagrantibus carbonibus: assiduè versando vritur, donec cinereum colorem traxerit, vel patinis nobis super prunas trita vritur, & ferulacea runde mouetur, donec coloris sit sandarachæ: sandixque tunc appellatur, refrigerata reponitur, sic trita chrysocola vritur. Sunt qui vrendo acetum affundunt, vt rubeat: si flaua est, macicot vulgò dicitur.

Ibidem.

Aes fit vstum ex clauis æris solutarū nauium fictili crudo cōpositis super sparso sulfure cum sale pari. Quibus vicissim inspersis fictile semiplenum operculatur, & figulari creta circumlinitur, fornaci inditur donec fictile percoquatur. Modos vrendi alios docet Diosc.

Aerugo fracta minutissimè in fictili patina flagrantibus prunis superposita versatur, donec mutata colorē cinereū cōcipiat, refrigerata reponitur. Si cruda olla vratur, eundem prorsus colorem non reddet.

Chalcitis fictili nouo viuis carbonibus
sup

superposito vritur, donec bullas excitare desierit, & perfectè manuerit, si humidior est: si alia est, dum mutata in floridum colorem sanguineum aut miniatum contraxerit. Eximendo insidens spurcitia tergeatur. Vel vritur perflatis carbonibus, donec luteo colore palleascit. Sic misi, fori, chalcanthum vruntur. Chalcanthum autem vredo suapte natura colorem rubescentem sortitur Diosco. in ærugine.

Auripigmentum vritur testa noua viuís carbonibus subiectis assiduè versando, donec igni flagret & mutet colorem. fit enim foris argenteum, intus rubrum: refrigeratum & tritum reconditur. Sic vritur sandaracha, alumen.

Lapidē pbrygium in particulas magnitudinis auellanae fractū vres in olla receti luto circūlita, testa operculo perforato vel in solo vertice, vel (quod melius est) in pluribus partibus, vt fuliginosi fumosiq̃ eorū quæ vruntur effluxus faciliè per ea efferantur, deinde perustis carbonibus perflatis vre, donec ignitus sit, cætera ex Galeno repete. Sic cyanus lapis vritur, & alii.

Sal vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, conditusque prunis, donec effruescat vritur. Sic nitrum & spuma nitri, si inueniuntur vrenda sunt. Vitrum tritum
int

interflata pice vritur, & aqua frigidissima
extinguitur, Auensoal ramen friabile nō fit,
Alia plura ex Dioscoride, & aliis huc trāscri-
bit potuissent, nisi hæc etiā multa huic æta-
ti omnia hæc negligentem existimasset.

Vstionis terminus in quibusdam est, dum
ignitum id abunde fuerit, vt in vstione tri-
plici lapidis phrygii: in quibusdam dum ni-
hil fumidum amplius expirat, nullaque fuli-
go prætereā emergit.

In aliis dum bullas edere desinent. In his
quæ fictili crudo vruntur, fictilis illius per-
coctio.

In his quæ farina pinsita circumlinuntur
aut luto, crustæ vstio.

DE EXTINCTIONE.

EXTINGVNTVR vel vsta, vel solūm
ignita quædam non modo, vt empy-
reuma ipsum dissipetur, sed etiam, vt in cor-
pus vstione rarefactum vis quædam humo-
ris aut frigoris penetret, vt ferrum candens
aqua pilosellæ, vel alia astringenti extinctū
euadit solidissimum.

Extinctio fit interdum ad purgationem,
vt plumbum liquatum succo mercurialis ca-
lido: sæpe extinctum, & tribulatum, stanni
puritatem, & soliditatem assequitur.

Fit item extinctio, vt vires humoris quo
extinguitur in se trahat, sic cadmiam vino

am

aminæo ad emplastra aceto ad remedia pso-
rica extinguit Dioscor. sic Galenus lapidem *lib. 7. sim.*
phrygium extinguit primum butyro recen-
ti, secundo vino falerno, vel alio fuluo, odo-
ro: tertio melle Attico, ne medicamentum
sit aridum, sed viscosi cuiusdam particeps.
Gallæ ad sanguinis suppressionem carbo-
nibus impositæ, donec vndique candeant
aceto: aut vino austero extinguendæ sunt.

Stibium lacte mulieris marem enixè ex-
tinguitur.

Limatura chalybis sæpe ignita aceto ex-
tinguitur, & pulueratur.

His exemplis medicamenta humore ex-
tincta ab illo aliquid virium in se trahunt.
Interdum autem ignita humore extingui-
mus, vt humoris naturam mutamus, vt dum
lapides vel circuli ferrei igniti lacte aliquo-
ties extinguuntur, vt serosam & mordacem
eius substantiam absumant, sitque tunc lac
dysentericis salubre.

Aqua chalybem vel aurum ignitum sepe
extinguimus, vt ipsa minus humectet, sed si
terrea magis absumpta tenuiori substantia.

Argentum viuum etiam si non sit ignitum,
tamen & saliuæ hominis ieiuni, & succo sal-
uiæ, aut limonum extingui dicitur, quod vis-
eius malefica, & omnia exedens, vt à Plinio
rectè dicitur, cum his agitando mitescit.

De

SUFFITVS seu euaporatio vi caloris ex-
citata sæpe medicamentis adhibetur præ-
parandis & vtendis. Suffitus aromatum mu-
liebria ducit, & vterum infernè retrahit si
infernè adhibetur, vel sursum si naribus, suf-
fitus plumarum perdicis, corii veteris, vel
aliorum tetro odore præditorum, naribus
exceptus vterū sursum ruentem deturbat.
Suffitus radicis & seminis pœonie, melan-
thii, styracis, mastichès rosarum, ad capitis
affectus pituitosos. Iisdem vel aliis stuppæ
suffitu capiti circumponuntur.

Frontalia ex rosis, violis, flore nymphææ
semine, lactuca, portulacæ, & similibus: va-
pore aquæ rosarum, verbenæ, betonicæ, &
similium suffiuntur ad varios capitis af-
fectus.

Et epithemata vëtriculi ex bombace aro-
matibus facto, vapore stomachico præterea
suffiuntur.

Suffitus per infundibulum ex radice, aut
foliis bechii super regulam ignitam imposi-
tis, ad tussim adhibetur.

Suffitus ex sulfure purgato, & auripigmē-
to vsto & loto, probè à practicis quibusdā
asthmaticis adhibetur.

Suffitu & vapore aceti acerrimi necantur
cantharides Diosc.

De

DE PURGATIONE.

VSTIONI ordine optimo succedit la-
uatio, quæ empyreuma, & acrimoniâ
vstione acquisitam, vt & nativam tollat &
vsta expurget, sed cum illa sit purgationis
species, satius mihi visum est de purgatione
prius agere, quod eius cognitio lucem ma-
gnam sit allatura lotioni. Purgatio medi-
camentorum hic accipienda passivæ, nō acti-
væ: seu quatenus purgatur, non quatenus hu-
mores sibi familiares ex corpore nostro tra-
hunt.

Purgantur enim medicamenta sordibus,
& aliena quavis materia per despumatio-
nem, clarificationem, colationem, residen-
tiam, coctionem, lavationem, excisionem,
depellationem, & modos alios post scri-
bendos.

Radices erutæ radiculis circūcisis, aliquo-
ties abluuntur potius quàm abraduntur, de-
inde si magnæ sint & matrice intus lignosa,
parum confractis lignum id eximæ, deinde
siccabis, & repones, sic radicem cichorii, apii,
petroselini, fœniculi purgamus, & eryngii,
sesari, cari, dauci, pastinacæ.

Est quando putre etiam aliquid exciden-
dum est à radice iridis, enulæ, bryoniæ, sigil-
li beatae Mariæ, rha barbari.

Radicem ari, dracutii, asphodeli, satis est

EXC

excisi radiculis lauasse, cum cortice cōstent tenuissimo, vti & radix chelidonii parui, co-
tiledonis, satyrii.

Scilla cultello ex cypresso quibusdam desquamatur, in qua mirum est ferrum vita-
ri, cum pistillo ferreo teratur ad succum ex-
trahendum.

Herbæ raro purgandæ nisi aridis foliis, aut stipite lignoso, quanquam & ablui de-
beant, si terreno aut luto sordidæ sint, vt ius-
sit Dioscorides.

Seminibus sæpe duplex, interdum triplex debetur purgatio. Vt legumina filiquis, ce-
realia glumis, baccæ halicacaborū vesicis, se-
mina fructuum carne, semen ricini, vrticæ maris, castanea echino, semē papaueris hyo-
scyami, lathyridis, paliuri calice, & alia ad
portionē. Quæ omnia iterū cortice tenui &
interiore sæpe purgantur, vt post audies.
Nux iuglans, & auellana, & amygdala car-
ne viridi, deinde cortice duro, postremò pel-
licula & alia plurima similiter. Hic autē de
tertia purgatione agēdum, quod alia à vul-
go fiant, & purgata hæc vendere consueue-
rint, & zeam, oryzā per moletrinas gluma
purgant, & vendunt.

Cortice ergo seu pelle purgantur semi-
na cnici, cucurbitæ, cucumeris, melonis, citru-
li, citri, vt solē superiunt medullæ, idq; mul-
tis

ris modis. Quidam enim hæc insolant de-
inde cortices in mortario leuiter frangunt,
manibus fricāt, donec à medulla cortex se-
paretur. Cribro tunc idoneo medullas trans-
mittente, & cortices retinente cernunt. Alii
etiam solis loco, igni leuiter frigunt, sed me-
dullæ sic extractæ graue olent, & sunt in-
gratæ sumentis, & calfactum oleum. Forfi-
culis alii singula semina purgant, quod ope-
rosum est, vt vnguibus & dentibus quod im-
purius est, qui modus hodie est consuetior.
Sunt qui hæc sole siccata in magna quāti-
tate friant pistillo ligneo, cribro raro cernūt,
iterum terunt & cernunt: si corticum par-
ticulæ simul transeunt, vano euolant. Se-
men sesami purum aqua modicè salsa irri-
gatur, manibus confricatur, iterum irriga-
tur, donec made fiat: extensum linteolo sic-
catur, modicè assatur, sacco aspero immi-
titur, fricatur multum donec depelletur, cor-
tices vento aut halitu expurgantur, vel in
aquam frigidam iniectis cortices supernatā-
tes de raduntur. Sic semina cucumeris, cucur-
bitæ, melonis, citreoli, ad olea ex his facien-
da excorticantur Mesue non autem ad vsus
alios.

Amygdalæ, pistacia, strobili, nuces & si-
milis aqua frigida per noctem, vel tepida pa-
rum diu macerata corticem mox remittūt.

Item si in sartagine assentur igni, donec depellatur, sed hoc modo male olent, & oleagina magis euadunt. Sunt qui recentes hos nucleos palea frumenti obruunt, sicque cadit cortex. alii cultello malunt depellare, praefertim cum oleum amygdalinum recens exprimendum est in potum colicorum, aut nephriticorum. Alii etiā non depellatas terunt & exprimunt oleum purum & iucundum.

Hordeum, triticum & cerealia alia, & legumina depellari possunt, affusa identidem aqua calida, pistillo ligneo batuunter, siccantur, parum nisi aestas est, ventilantur, perficantur, reponuntur.

Mesues.

Est tamen quando corticis usus est maior, ut in pisibus & fabis, & aliis. Est quando solus expetitur, ut in rhoe, radice apii, foeniculi, hellebori, turbiti, cinnamomi & aliis corticibus dictis libro primo methodi medicamentorum componendi. Ricini semine echino insolato, vel frizo per se aut confricatu facile exilit, depellatur autem quomodo dictum est terendo, sed mitius ne ob multam humiditatem cohaereant, sic baccæ lauri. Vel ex non excorticatis, sed pertrititis oleum extrahatur.

Colocynthis cortice & semine purgatur solaque pulpa in usu est medicorum.

Cydonia & fructus alii condiendi intus
&

& foris purgantur.

Cassia corticibus & membranis ligneis exempta seminibus purgatur per cribrum feraceum rudicula, vel cochleari, vel manu: sunt qui id efficiunt foelicius cum vapore ex decocto aliquo medicato subeunte, interdū humore aliquo soluitur, vt in diamāna Mesuæ. Sic thamar indos purgamus, sed hi ferè humorem postulant, vt per cribrum trāsmitti possint, vt manna humore calente soluta in cribro folia ilicis cui foelicius insidet, & sordes alias dimittit.

Dactili cultello intus & foris purgantur, vt abūde diximus libro tertio methodi medicamenta componendi.

Succi purgātur feruore, residendo, clarificando, colando, vt in syrupis dicemus, & in clarificatione & colatione diximus.

Gummi Arabicum, tragacanthum & si. *Diosc.*
milia trita negligenter si sunt sicca, in vase vitreo aquā purā vel rosata merge nocte vna, misce manu post ridie donec liquecat, cribro puro cola, etiam manibus deducendo: vt ere, vel ficcaturum repone.

Galbanum etiā laudatissimū retinet aliquid adiecti seminis, & ferulæ id ante vsum sic purgabis, In aquā feruētē demitte: cum liquatum fuerit, linteo puro, raro cola, aut sordes supernatantes concha detrahe.

Sic liquores alii humore idoneo soluti colando purgantur à feminibus stiptitū fragmentis & cæteris excrementis, quæ per negligentiam aut institorum malitiam ipsis accreuerunt.

Adipes, cerebella, sanguis & aliæ animalium partes medicamentis, qua ratione purgandæ sint, paulò post audies inter ea, quæ pluribus præparationum differentiis simul à nobis parantur.

DE LAVATIONE.

LAVATIO purgationis, ut dixi, species cerè fit ad sordium aliquarum separationem, abusive tamè etiā imbuere medicamento humore medicamenta aliqua lauare Mesues, & alii vocant. Lotionis vires ex Mesue repete. Lauatur aqua foris radices, herbe, fructus, semina, si luto, puluere, vel re alia sunt contaminata, aqua ex ea toties mutata donec pura maneat, & sordes omnis ab his deterfa erit etiam si sint rosæ, violæ, intybus, & aliud cichorii genus, & adiata, postea autem siccantur pannis, vento, sole, igni, sed mitissimo, ne medicamenti vim dissipet. Hæc autem lotionis differentia omnibus consuetissima, quia paruarum est virium si alteri mox dicendæ conferas, pluribus ob id declaranda non est. Lotio alia intus, & simul foris fit seu per totam rei laudæ

dæ substantiam.

Lauantur tota seu intus & foris plurima propter causas quatuor à Mesue libr. i. scriptas, & alias quasdam hic scribendas, & paucis perstrictas lib. 3. methodi medicamenta componendi.

Vt autem humor omnē lauandi corporis partem quantumuis exiguum attingat, & lauet ac purget aliqua substantia nostro proposito aliena, si id est durū aut lapidosum, ante lotionem est tenuissimè puluerādū: si est cito liquabile, calfaciendum: si per se est liquidum, quale est lauabitur: ac etiam si per se in aqua, aut humore alio prōptè dissiliat ac dissoluatur, vt bolus armenia, calx.

Quæ igitur promptè liquantur, vt oleū, cera, pix, resina, modicè calefiāt, & mox infundantur in vas magnum oris lati, semiple num aqua purissima, experte omnis odoris, coloris, saporis, quem sensus percipere possit, quæ ex sole vel igne tepeat. Tunc manibus multum diūque agitentur, ab agitando deinde quiescat, donec id pingue rotum quod lauas supernatet. Id quod talibus prōptum est ob innatam leuitatem, præterquā oleo nimium multa agitatione valentius confuso cum aqua, vt mox dicam. Tandem aqua illa abiecta, similis affundatur idque tertio & quarto, ac toties repetatur donec

repetatur donec medicamentum in aqua illa deposuerit omnem illam vel substantiam, vel qualitatem nostro proposito alienā, seu quoad aqua nullam ex loto medicamento talem substantiam vel qualitatem, ut colorem, odorem, saporem, amplius recipiat, quam visu, olfactu, gustatu deprehendas.

Effunditur autem aqua per foramen aliquod subiectum, quod interim dum lavas luto obturaveris, aut vase inclinato pingue in vas aliud effunditur, & aqua abiicitur. Alii aquā pingui miscēt in vase vtrinque habente foramen angustum, operculandū digitis inter agitandum, dum verò per horā resederit, aqua effunditur, noua infunditur, idq; fit toties donec acri, & flaua olei humiditate deterfa, oleum dulcius, & album euadat.

Oleum tamen lauando minus est verberandū, ne adeo aque misceatur, ut post ægre possit separari: sed ita verbera, ut dum quiescere paulisper permiseris, ipsum totum innatans detrahare possis. Lotum id oleum componendis oleis, & medicamentis aliis albis, aut frigidis est optimum & usurpandum.

Dura autem & lapidosa, ut metallica, lapides, ossa, testæ, succi ficcati, lachrymæ ficate, ante leuissima sunt terenda, deinde aqua pura subinde mutanda, manibus vel
rud

rudicula agitentur, quoad nihil sordium medicamenti aquæ innatet, maneatque aqua medicamenti qualitatam, ut coloris, odoris, saporis omnino expers. Non ante verò aqua est effundenda, quam lauandum corpus quiescendo in fundum vasis subsederit: quod metallicis, & terreis corporibus ob infitam gravitatem facile accidit, ut prædictis innatare, ob naturalem ipsorum leuitatem. Effunditur autem aqua per os vasis paulatim inclinati, ne motus vehemens corpus lutum aquæ iterum commisceat, & cum ea effundatur: satius enim est aquæ prioris aliquid remanere quam lauandum corpus effundi.

In his autem vas in fundo pertusum in liquabilibus prædictis vtile, damatur, quod ad id graua hæc repant, quæ si per foramen id vacuare tentes, aut ipsum obstruent, aut aqua penetrare habilior cū ipsis vacuabitur. Possis & per licia, panneæ, philtrea vocant, destillando aquam paulatim vacuare, præsertim dum corpus lauandum est preciosius. Nam sic nihil, aut minimum eius, cum aqua vacuatur, sed illa vacuatur purior, & corporis lauandi substantiæ expers magis.

Sic lauantur plumbum, cerusa, lithargyros, scoria plumbi, æs, arugo, chalcitis, & congeneria, cadmia, spodium, pompholyx,

stibium, cyanus, calx, & metallica cætera, ac lapidosa, ossa, os sepia, cornu cerui, caprae, vngula caprae, testæ ostreorum, & similia.

Cum verò dura illa teri antè mollissime debeant quàm lauentur, teri autem non possint citra vstionem ante, vt prius est dictum, sunt vrenda, quamquam horum multa citra vstionem teri possunt, vt cadmia præsertim lapidosa, chalcitis, chalcanthum, cerusa, pompholyx.

Adde quòd liquabilia promptè, & dura, & horum media, si humore medicamento-
so lauantur, etiam per noctem, in illo resideant, vt plus virium eius in se trahât, interdiu enim lauanda sunt ac potissimum in sole feruidissimo: præsertim si qua sicciora, tenuiora, albiore volumus. Lauantur enim non aqua fontana, & pura solùm, sed marina, sulfurosa, bituminosa, vino, aceto, lacte, muccagine, succis plantarum, decoctis aromaticum, vel aliorum medicamentorũ etiam purgantium: vt ex Mesuè simplicibus patet: omni denique humore, sed quem doctior medicus iusserit, ne sibi hanc deligendi humoris potestatem pharmacopœus arroget. Est enim quando calida humore aliquo calidiore vult intendere: vel remittere frigidiore: est quando vires alias mutare instituit.

Qu

Quæ verò est in colore solo medicamēti mutatio, esse possit in pharmacopœi arbitrio, modò vires nihil mutet. Vt si medicus imperavit, hoc vino aliquo austero ablendum, pharmacopœus autem velit albius, & elegantius reddere medicamentum, lavare id potest vino aliquo albissimo, modò id sit, vt iubet medicus, austerum. Odorem similiter deligere illi non permitto, quòd ea cui odor inest substantia, maiorum est virium: ad hæc quòd odor additus, vel huic hominum proprietati, vel cerebri, cordis, vteri affectibus curandis non convenit. Multò minus saporem medicamento hunc vel illum, vel qualitates alias insignes per humorem à se delectum ad lauandum, dederit pharmacopœus.

Metallica itaque curiose laevigata, lauantur ex aceto, vel marina, si vlcera sunt tumida, cum oris crassiss, & callosis, attenuationem multam requirentibus aqua autem, si humores in vlcus affluentes sint acres & mordaces: vino, si humor vlcери largior affluit. Ex his humoribus per plures dies tribuuntur metallica, donec erunt pura, candida, perspicua.

Quæ ex metallis ad punctos, nervos, aut aliter vulneratos, partibus nervosis adhibentur, omnia esse elota oportet, si modo

Gal. in fi-
ne lib. p. c.
ph. g.

citra morsum sint siccatura. Cera quoque & terebinthina, si his medicamentis miscenda est, sit elora, & multò magis reliquæ resinae, si immittenda sunt. Nam medicamentis omnibus quæ laueris, acris & mordens sanies eluitur & abstergitur.

Hæc in vniuersum de durorū, & molliū, & mediorū lotionē sufficiant: nunc particulatim de quibusdam agendum primum plantarum partibus reliquis, deinde metallicis.

Aloë optima, trita creta, ex aqua fontana purissima dupla aut circiter, agitetur aliquandiu rudicula ferrea aut lignea in vase lato stanneo, vel terreo, vel alio, tecta sinatur horæ quarta parte, aut paulò diutius subfidere: tunc quod clarius supernatat, inclinato vase in aliud simile, sed minus, per columbetaceum transuasetur: aut si puriorem, sed parciolem vis aloë lotionem, licio aut filtro excoletur, aut diutius residere permittatur in vase præsertim vitreo, interuallis paruis foramina habente, spina aut cera obturata, per quæ quātū videris clarum sine effluat, ne scilicet inclinato vase turbari queat: aquā nouam affunde, subige, sine, elutria: id fac quater, quinquies, donec arenosa, & terrea tantum fex super sit. Primam omnium præstantissimā per se in solatu sicca, alias omnes simul. Si autem hyems est, aut lora aloë in

in rem præsentem egetur, igni lento sicca-
ri potest.

Dū autem siccata iam aloë est ex vase
ipso eximenda, calefiat vas parum, vt prom-
ptius ab eo aloë separaretur, & in a eius partē,
in quam quod crassius est subsedit, cultello
derade, vt in panibus cereis fieri solet.

Quod si nondum pura & perlucens sa-
tis appareat, iterum teratur, & lauetur vt
prius, idque si libet, tertio, quarto, fieri po-
test, si medicus iusserit. Nam toties lota *Gal.li. 7.*
aloë acrimoniam & vim purgatricem pro- *meth.*
pè totam amittit & caloricam, licet in ea
portio aloës tenuior contineatur, quæ his
qualitatibus exuta roborat magis, soluit
minus. Hæc eius lotio magni æstimanda
est, qualis dum facem vini vstam, & calcem
viuam lauas, dum subsedit, aqua hæc effu-
sa siccatur in cauterium omnium præstan-
tissimum. Quæ lauandi ratio planè est ab
aliis diuersa, in quibus aqua ipsa abiicitur: in
hac lotiōe sola seruatur. Aloë verò si laues,
ter, quater, & dum resederit aquā abieceris,
quod relinquetur amaritudinē quidē exue-
rit post aliquot lotiones, sed impura & fæ-
culēta tantū aloës pars fuerit. Si autē aloën
læuissime pulueratā, & cretā aqua pluuia,
tāquā magis aloën permeante ob tenuitatē,
vel intybi, vel rosarum, vel alia simplici,
aut

aut composita imbuas, deinde insolatu aut igni sicces: idem secundo, tertio repetas, lotio non est nisi abusiue loquentibus: sed verius, vt sic dicam, imbutio. In quo genere præparationis est, quæ à Mesue in simplicibus scribitur aloës macerato ex decocto aromatum, vel specierum hieræ picræ Galeni: lotio enim non est, vt nec quæ Albucasi in Seruitore multiplex describitur, quia nullam ipsæ aloë aufert aut substantiam, aut qualitatem, sed suas illi facultates impertit. Fuit igitur verius infusio, maceratio, & (vt sic dicam) imbutio. Quæ quibus & quando facienda sit, medici solius est instituere. Ob id hoc loco de his agendum fusius non putavi.

Nec sarcocollæ, aut cancamis est lotio, dum ea trita lacte asinæ, vel capræ, vel potius mulieris recentissimo humectatur, non autem mergitur, ne lac ante acescat quam siccet, deinde insolatu mox siccat: idem opus quinque repetitur: sed infusio, aut nutritio magis fuerit.

Nec cardamomi aut cumini in aceto maceratio rectè cum Bulcasi, & aliis lotio vocetur, nisi, vt dixi, abusiue loqui se fateatur. Sed hæc de nominibus non de re disceptatio finienda est, ad remque propositam nobis redeundum. Cancamum tritum aqua fon-

lis,

tis, cui aristolochia, & schœnanthum aqua incocta fuerint, lauat pistillo semper agitando Pādectarius: quoad aqua clarescat, quod refedit coletur, & siccetur. Tenuius sic euadit, & magis aperit.

Acacia vera Galeno lauatur ad tollendam ipsius acrimoniam: nobis prætereunda, quia desyderatur, & eius loco succus prunorum agrestium, acrimoniae expers substituitur, qui lauatur tamen aliorum succorum modo, ex aqua dulci, aut lacte, ut sit anodyna magis. Nam valenter astringentia exasperant non leniunt, ut in remediis ophthalmiae docet Gal. lib. c. ph. p.

Tragacanthum tritum aqua pura aut rosata macerant nocte vna: postridie mucaginem colant, & nisi mox utenda sit, siccant ac reponunt, plotaq; vsurpant practici quidam.

Lythargiros, chrysitis, aut eius desyderio argyritis, aut alia, multis modis abluendo albatur Dios. lib. 5. Potest autem lauari, ut metallica cetera trita creta, ex aqua pura aliquoties mutata, tribuletur, resideat, aqua paulatim effusa noua nudatur, ut antè dixi.

Gal. initio
lib. 4. c.
ph. 8.

Cadmia lapidosa, ut ficcet magis Galeno lauatur per æstatem in sole pluribus diebus terendo in aceto acri, aut vino planè fuluo, & substantia perlucido quale in Gallia, Aurelianensi & Belnensi, quod multò ma-

*lib. 9. ad
Almanso-
rem.
Diosc.* ximè ficare natum est, deinde ficcatur & re-
ponitur, ac vlceribus malignis inspergitur.
Cadmia autem Diosc. in mortario trita la-
uatur, effusa subinde aqua dum fordes nul-
la emergat: deinde coacta in pastillos repo-
nitur. Sunt qui lauant, vt pompholygem.
Scoria ferri trita diebus octo maceratur ace-
to, quotidie mutando, die nono imponitur
laminæ ignitæ, vt torrefiat. Sic præparata
valet compositioni Rasis ad omnem sangui-
nis fluorem immodicum.

Plumbum post vstionem lauatur modo
omnibus duris cōmuni, vel etiam hoc mo-
do. Aquam paucam in mortario plūbeo agi-
ta pistillo plumbeo, donec nigrescat & cras-
fescat, tunc per linum aquam cola ter qua-
ter, sine subsidere: laua subsidentiam aqua
pura donec ea amplius non nigretur.

Vel plumbi limaturam cum aqua crebra
tere in mortario, donec aqua sæpe mutata
nigrari desinat.

Pompholyx linteolo modice raro liga-
ta in vase aqua pluuiæ, vel fontana pleno
huc illuc ducitur & tribulatur, vt pars eius
utilis & tenuior in aquam effluat, & omne
excrementum in linteolo remaneat: residere
finas, & effundas, noua deinde aqua affusa
idem opus repete, idque donec in linteolo
nihil vtile maneat. Modos eius abluendæ

ali-

alios lege in Dioscoride.

Sic spodium lauatur, excrementosum tamen magis est, Sic interdum & cadmia lapidosa. Nam fornacaria (quæ vulgo tuthia & male pompholyx dicitur) modo aliorum metallicorum lauanda est, & scoria plumbi in mortario lauatur aqua pura toties mutata, dum à scoria luteo colore amplius non inficitur, digeritur in pastillos Dioscor. Stibiū, ceruisa, æs vstum eidem lauantur, vt cadmia vel plumbi scoria.

Abluitur lapis cyaneus, vt Armenius Alexandro Tralliano, in aqua communi tritius, vel quadragies mutata: deinde aqua buglosi, vel rosarum decies lauatur, vt in antidoto cocci baphicæ, & in catapotiiis ex his lapidibus.

Calx aqua marina bis terue lota per æstam sub æstu caniculæ, puncto neruo medicamentum est vtile, cum oleo.

Gal. lib. 6.

method.

Diosc.

Chrysocollam tusam infusa aqua mortario, expansa manu eidem vehementer affrica, & vbi confederit cola, altera quoque affusa aqua rursus tere. Hæc vicissim prosequere, donec pura sinceraque spectetur, deinde siccata in sole, ad vsus reconde.

Terrā Lemniā sic lauabat Dianæ sacerdos in Ephestiade Lemni vrbis. Hæc aqua macerabat, & in lutum redacta valèter cōtur

turbabat, deinde paulum quiescere sinebat, tunc aquam supernatantem auferebat, & mox quod sub ea erat lutum, tollebat relinquens tanquam inutile lapidosum & arenosum illud, quod in imum subsederat, lutum illud pingue siccabat, dum mollis ceræ consistentiam acquirebat, tunc in paruas huius portiones sacrum Dianæ sigillum imprimebat Gal. libro nono, simpl. & paulò post. Terra autem omnis lauatur eodem modo: primum enim maceratur aqua nullam qualitatem medicamentosam habente. Vbi lutum confedit, effunditur quæ innatat aqua, quod lutosum est separatur à lapidoso & arenoso, quæ ad imum resederunt. Gustatus autem tibi index est acuratus, quam oporteat terram lauare, & quam non.

Quædam enim non solum terra, sed alia quoque corpora lauari non postulant: quædam semel, vt terra Lemnia, quædam bis, vt quædam terra Eretrienfis.

Bolum Armeniã similiter lauabis. Sunt tamen qui aqua rosarum ter lauant, totiesque siccant. Potest sine lotionem vsurpari cum nullam qualitatem manifestam præ se ferat: sed facultate occulta valeat: & vi siccatrice.

De

DE PLVRIBVS SIMVL PRAE-
parationum Differentijs.

QUANTQVAM in prædictorum pluri-
ma, multæ simul præparationū dif-
ferentiæ cadunt, tamen visum est seorsum
de his quæ multis præparationū modis egēt.
Lapis, quo vitra dicta lapidea fiunt, concre-
tus ex cineribus herbæ (quam vulgus sodam
vocat) in fossa terrea vsta, tritus, cribratus,
aqua tanta mergatur, vt digitis duobus aut
tribus superet, misce, permitte fæces residē-
re, claram partem per filtrum, vel licium
destilla: quod clarum est clibano, vel igni
sicca. Salem coagulatum, allæali Arabicus di-
ctum, albissimum, inuenies multis medica-
mentis vtilem.

Eryngium intus & foris purgatur, in fru-
sta secatur, caryophyllis, & cinnamomo far-
citur, percoquitur. Sic etiam satyrii radix
quibusdam.

Amylum ex tritico delecto, crassius con-
fracto, nocte vna macerato aqua pura, quod
postridie exprimes, cunq̃ue amyllum subse-
derit, inclinato vase aquam clementer effun-
de, sicca cito, igni, vento, sole, gossapio, præ-
fertim hyeme, ne ace scat: siccatum repone
vase mundo operculato. Paulo diuersius ho-
die fit, sed nulla virium differentia. Ex hor-
deo, oriza, & aliis similiter fieri potest.

Agaricum tritū cum vino, cui zingiber infu-
sum sit, in trociscos fingitur, siccatur, repo-
nitur, vtendi tempore teritur, aliis miscetur.
Sic colocynthis, scilla in trociscos forma-
ta mitescunt.

Myrobalani multiplicē habent præpara-
tionem Mesuæ in simpli. & in E. alharil li-
quores, ammoniacum, galbanum, sagape-
num, opopanax, & liquores alii ac gūmi ace-
to, vino vel alio humore, quē medicus iusse-
rit nocte vna macerantur, dissoluuntur, cri-
bro fetaceo percolātur, vt semina, & ligna,
& excrementa eorū alia in colo remaneant,
percoquantur ad humoris illius cōsumptio-
nem: aliis extra ignem miscentur.

Gossapium, bombacē & cotonē vocant,
vino cui incocta sint aromata cephalica, aut
stomachica, vel parti alii familiaria p noctē
maceratur, siccatur carpitur, applicatur loco
panni quisquiliati, vel eius tomenti, quod
hæc ad infectionē aliena quædā recipiant.

Sunt qui hæc epithemata similibus quo-
que medicamentis farta, & vtrinque tecta
densius interurunt.

Cerebella passerum vere occisorū lauan-
tur, purgātur. Ex his decem cum vitello oui
subacta, parum igni friguntur, deinde sole
vel igne siccātur, adiecto si libet pauco mel-
le ad venerem incitandam parantur alii vt
adi

adipes & medullas parant.

Pulmo vulpis lauatur à sanguine, clibano ficcatur, reponitur, teritur, cum aliis miscetur vtendi tempore.

Tunica interior gallinarum lixiuio calido hora vna maceratur, ter lauatur, deinde vino ter maceratur, & ter lauatur: iterum lixiuio, post vino, & ficcatur clibano ex quo panis extractus est. Viribus tamen nullis valet Galeno in simpl. libr. ii.

Hepar lupi ad hepatis affectus quosdam vino albo optimo lauatur, inspergitur puluere tenuissimo, santali flauo, ficcatur, absynthio in scutella inuoluitur, octauo quoque die mutatur, absynthium reponitur loco sicco.

Intestinū lupi ad cholicā efficacissimū vino albo optimo lauatur, inflatur, ficcatur, extra fumū & puluerē, absynthio inuoluitur.

Obserua hic & mox in coagulo inuolutionem & in Mesue simpl. & compositis sæpe præparationis quandam speciem: quam sciens omitto, quia rarior est aliis.

Cutis pedum & rostrorum bouis & ovis igni lento diu coquuntur, donec veluti coagulum remittat. Id exēptum siccatumque in aëre perflatili, ad hernias commendatur.

Coagulum ex recens occiso animali tenello, sale inuoluatur, insoletur, seruetur.

Hircus quadrimus, sanus, bene habitus, canicularibus diebus saxifragia, apio, petroselinio, fœniculo, pulegio, hedera, schœnãtho, genista, adiantis, lupulis, & cæteris calculum fragentibus nutritus, vino optimo & tenui potatus, in sole dies. 40. versatus, donec vrina nigrescat: tunc decolletur, & sanguis non primus nec postremus, sed medius excipiat. Olla pura, aut patina, foliis prædictis infrata: dum concreuerit, incidatur per latum in partes duas. Siccetur sole vel luna tectus repositi aut panno raro, vitetur ros & pluuia.

Diosc.

Adipes recentes aqua pura aliquoties loti in vase semipieno, liquantur sole vel aqua calida in vase duplici, tepore, aut cineribus: & quod liquatum erit, sensim effundatur in vas aliud. Vel igni liquentur & colo tenuissimo transfusi feruentur. Sic adipēs liquatos colando à membranis & aliis purgat. Gal. in emplastro diachalciteos.

Diosc.

Cantharides vere forpiculis præhensas, & immixtas phialæ oleo obrue, & insola, donec putrescant, vel vase fictili non picato cōde linteo raro, vasis os subliga, eoque deorsum verso excipe halitum aceti quàm acerrimi feruentis, donec æstu exanimentur, postea lino transfixæ reponuntur.

Transfixio hic & in scilla, in radicibus eligatis seruandis, etiam est præparationis specie

cies: sed cuique perspicua, & saepe ad ficcationem & repositionem necessaria.

Carnes ericii leonis & aliorum quorundam animalium seruandæ in vsus medicos, ante quater quinquies, semper tamen per horam lauandæ vino calido dulci, in furno leuiter ficcatae seruantur.

Caro cancrorum ad antidota analeptica secreta, ter lixiuio, vel aqua falsa lauatur, donec odor teter abierit ex aqua hordei, aut sero butyri coquantur.

Ceram in aqua liquabis, extrahes autem impositis ipsi phialis vitreis aqua prius tintis, quibus quantum adhærebit forma

scintillæ in sola Iulio mense, do-

nec albescat. Vel ceram ex

aqua dum nigrum mu-

tanda, coque do-

nec fit al-

ba.

Hæc de medicamentorum præparationibus sufficiant.

DE MODO MI-
SCENDI AD COM-
POSITIONEM MEDICA-
MENTA, LIBER
TERTIVS.



IN finis omnibus iis, quæ ipsum præcedunt, & ipsius gratia sunt, sit præstantior, hunc librum tertium medicis & pharmacopœis nō vtiliorem modò: sed etiā magis quàm prædictos duos necessarium faciliè iudicaueris. Cū neq; medicamēta huic affectui idonea delegisse magni sit momenti (nisi affectus ipse simplex simplici remedio curabilis est: aut sit compositus simplici quidem nobis, sed natura composito) neque hæc præparasse, nisi compositio succedat, quā illa duo spectabant, & in quam deligebantur, & præparabantur medicamenta.

De modo igitur seu industria, & arte medicamēta cōponēdi, & miscēdi sumus dicturi: non tamē omnia, sed ea præcipuè quæ Parisiis, aut vsu, aut paratu sunt frequentiora. Quæ verò vrbes aliæ alia in vsu composita hab

habēt medicamēta, ex horū imitatione paruo negotio substituent. Porro in his omnibus Mesue ordinē sumus sequuturi, vt scilicet doceamus. Primum, quo modo condita sint cōponenda, deinde sapæ, iulepi, syrupi: tertio loco eleginata: quarto decocta, & infusa si qua hodie vsurpātur, quinto antidota, sexto pilulæ: septimo trocisci, octauo pulueres: nono olea: decimo vnguenta, vndecimo cerata, duodecimo emplastra. His tamen passim, sed locis suis ex Nicolao, & aliis similia, sed vsitatiora nobis ascribemus. Quæ verò vrbes aliæ vsurpāt, si libet ascribāt, vt Lugdunēses cōseruam menthæ, athanasie vulgaris, eupragiæ, scolopēdri, oxalidis, ireos, stœchados, hyssopi, saluiæ, saluiæ vitæ, myrobalanorū, limonū, primulæ veris, sigilli beatæ Mariæ, summitatum arāti, cucurbitæ, cucurbitā cōditam syrupū luporū, calaminthes, violatū decoctione cucurbitæ, electariū de bolo cōtra pestem, E. Indum maius. E. rosatū Mesuæ loco. E. de succo rosarū. E. lenitiuū quoddā. E. de psyllio. E. lætitię. Gal. E. lætificās Cōsiliatoris, auream alexandrinā, cōfectionē anacardinā, hierā Ruffini, Logadii, Hermetis apud Mesuē, Micletā, requiem magnā Nicolai, rubiā trocischatā eiusdē, trypheram persicam in febribus continuis vsurpatissimam,

& sarracenicam, philoniū Persicum, & Romanum, & alia per multa vrbibus aliis consueta ascribant alii si volent.

DE CONDITIS SE.

Ratio Prima.

Mesues.
Humectatur, ut docet Mes.
in zingibere condito
& myrobal. cepulis.



ERYNGII radix cōdienda, sit ampla, alba, tenera, intus ligno & foris cortice purgata, deinde secta in frusta pollicem æquantia, intus, unde lignum expurgasti, facta uno caryophyllo humectato, & particula zingiberis humectata. Hæc sic preparata coquitur in saccharo æquali & melle duplo, uel melle solo triplo. Coctis additur iustum pondus aromatum.

Mel & saccharum
despumen-
tur & cū
bis radici-
bus perco-
quatur cin-
namomi
& zingiberis ana-
drach. duæ
in lib. sin-
gulas.

Quoniam radices hæc quantumuis teneræ etiam subduræ apparent, & coctione in saccharo & melle durescunt, non tenerescunt, satius fuerit purgatas, & sectas, aqua eas tegente super cineres calidos nocte macerare, postridie semel feruēfacere, & ex aqua illa, si pura apparet, sin minus, alia dulci saccharum ad electarii solidi, aut penidiorum consistentiam coquere, illi tum radices hæc sic emollitas parumper incoquere, caryophylorū vel cinnamomi, & zingiberis siccorum mediocriter pulueratorum ana vnc. dimidiam in conditi libr. duas, vel miscere, vel nodulo suspendere sine aliis aromati-
b

tibus. Similiter condies radices fīfari, cari, dauci, pastinacæ, apii, raphani, & similia prius scilicet lotas, & intus ac foris purgatas elignando, deradendo, decorticando, sectas, fartas, melli, aut saccharo incoctas. Acorus autem nostras non est condiendus, nisi medicus aliquis doctus iusserit, ut in Mesue docui. Alii bene purgatas radices, in melle despumato, & saccharo clarificato mediocriter coctis, igni lento percoquunt, ex aqua tamen non præcoquentes, ne aromaticam vim auferant: radicem tamen helenii præcoque, ut amaritudinē deponat: ari, dracontii allii, cæpæ, porri, & similia, ut acrimoniam deinde ut prædictas cum melle, & saccharo percoque.

*Diasatyrium alterum accipit libram unam radicum eryngii coctarum in aqua cicerum secunda, radicum satyrii plenarum & recentium unc. octo, radicum raphani domestici unc. tres, radicum dracontii unci. duas, quæ omnes simul trite in lactis uaccini quantitate sufficiente, & butyri uaccini olei sesamini ana unc. quatuor, igni lento coquantur ad iustam crassitiem, * tunc * & cernā adde mellis despumati libras * sex, succi cæpæ retur. centis libram unam & dimidiam, ubi omnia * tres tan erunt perfecte cocta, & ab igni deposita, adde tum hodie*

bunc puluerem scinci caudarum & lumborum
drachmas octo, seminis eruce, nasturij, pastina-
cæ napi, asparagi frainix, piperis longi, been
utriusq; Zingiberis, cinnamomi ana drach. qua-
tuor prædictis misce. Postremò add- strobiliorū
depellatorum libram unam & dimidiam, pista-
ciorum depellatorum uncias decem, cerebrorum
passeris uncias duas, misce omnia probe, aroma-

aque ro tiza drach. una moschi boni.

farum se-
miūcia so-
luta & cū
alijs mista

Radices raphani cum etiam duriores
sint radicibus eryngii, cum his præcoquen-
dæ videntur, radicis dracontii acrimonia,
lacte, butyro, oleo obtunditur. Potes co-
quere ex lacte ouino, muliebri, caprino, &
etiam asinino pro variis medici scopis, qui-
bus etiam calidiora interdum auferre co-
gimur. Pro oleo sesamino iam desito su-
mitur oleum amygdalarum dulcium: qua-
le postea describam, vt in diasatyrio ana-
leptico. Iusta crassities est cataplasmatidis,
opiatæ, cassiæ purgatæ, sordium auris,
mellis vetusti, aut probe despumati, quod
signum quoque est perfectæ coctionis cu-
ius post meminit. Nam mel despumatum,
& succus capæ prædictam crassitiem eli-
quabunt, & velut incrudabunt: absum-
pta deinde per coctionem reliqua mellis
humiditate, & ea que largior est in succo
cap

cæpæ recuperatur prior consistentia, tunc
que perfecta est coctio. Cicera eadem ra-
tione infundit vel incoquit lacte, in pulue-
re impinguate sectione octaua. Sunt quæ
in rem præsentem quo voles tempore (nam
semper vna radix vegeta est, licet magis
& minus) lotam radicem ex secundo ci-
cerum decocto coquunt, deinde caryo-
phyllis & cinnamomi frustillis configunt,
& cum saccharo clarificato, & colato pa-
rum diu percoquunt, dantque dormitu-
ris radicem vnam, aut duas nec infæli-
citer.

Aquam-cicerum secundam cur capiamus
in Mesue dictum. Radices plenas capit ex
agro præsertim sabuloso, quia flaccidæ sunt
exanimatæ, & vide ne varietas satyriorum
tibi imponat, lactis quantitas sufficiens, vt
digitis duobus supernatet, quo absumpto, si
nondum hæ sunt percoctæ nouum lac, buty-
rum, oleum affunde. Pro cæpa bulbum asca-
lonitem nobis dictum, cur ponendum pu-
tem in Mesue docui.

Been, zingiber primò terantur, semitritis
adde semina, deinde cinnamomum, postre-
mò scinci sicci.

STROBILOS aqua tepida per semi- Mesues.
horam prius macerari volunt ad acrimo- Conserua
niam tollendam, quæ cum tam exigua sit, in rosarum.
ali

aliis magna, frustra id causantur.

CEREBELLA passerum præparata, vt libro secundo docuimus, in pluribus præparationum modis.

* Hodie
extinguan
tur nõ sic-
centur.

* Duplum
plerique.

* Non ple
no, ut sit lo
cus feruo-
ri etiã sine

insolatu,
dies trigin
ta quidam

insolant,
male ali
coquunt
igni.

Mesues cõ
serue uio-
larum.

* Buglossi

utriusque

i. uulgaris

& borra-

ginis.

Saccharum rosatum sic fit folia rosarum ru-
brarum nondum omnino apertarum in umbra

* siccantur, donec ipsorum humiditas superfluat
resoluatur, teruntur tunc in mortario lapideo,
additur sacchari albi, triplum * reponuntur * ua-
se uitreo aut uitriato pergamena operculato, mē-
sibus tribus insolantur, in dies sæpe mouentur, so-
li auferuntur, seruantur.

Sit saccharum, & mel triplum, vt florum,
parum ficcatorum vnciis duabus mellis de-
spumati, aut sacchari puri, puluerati, vnc. sex
miscant.

Saccharum autem rosatum aliud hodie
nobis appellatur, quod aqua rosarum alba-
rum, aut succo rubrarum pari solutum ad ele-
ctarii solidi crassitiem coquitur, & puluera-

tur, vel in marmor butyro superlitum inii-
citur, ibique latefcit, dum cohaluit in tessel-
las secatur. Saccharum rosatum tabulatum

vulgò dicitur.

Saccharum uiolatum fit, ut rosatum, nisi quod
i. uulgaris uiolæ paulo diutius, & in umbra siccandæ, & cum
& borra- saccharo insolandæ, sic fit saccharum * buglossa-
tum & rosmarinatum.

Rof

Rosmarinatum malè anthosatū vocant, cum anthos florem omnem significet non speciatim florem rosmarini. Sic etiam conferuæ, vt vocant, fiant ex floribus Persicorum, arantiorum, genistæ, sparti, maluæ, althææ, & similium florum.

Sunt tamen qui flores integros, & sacchari puluerem vicissim vasi inspergunt, & insolant, aiuntque sic suas qualitates propè integras flores seruare. Alii saccharum clarificatum infundunt.

Similiter quoque fiunt herbarum quarundam natura exuccarum conferue, vt adiantorum omnium quibus ad analepticum destillatum vtimur, & conferua asplenii, saluiæ vitæ, phyllitidis, & similium. Herbarum enim hæc recentes in mortario lapideo teruntur saccharo duplo miscentur, insolantur.

*Mel rosatum sic fit, succi rosarum recentium
libra una cum mellis albißimi & purißimi, &
despumati libris decem coquitur igni in lebetes.
Vbi feruere hæc incipient, adde rosarum uiri-
diū forpicibus, uel cultello incisarum libras qua-
tuor, coque ad succi consumptionem, continenter
mouendo in fictile aliquod transuasa, & diu eo-
dem contine, nam tempore præstantius euadit.
Eodem modo fit mel uiolatum.*

Nicolaus
Alexandri
nus.

Mel

Mel cum libris aquæ tribus mediocriter despumetur : vbi deinde feruebit , super ignem aut extra misce rosas & succum , & insola dies quadraginta aut circiter : coque ad succi consumptionem, cola percoque in syrupum.

Sunt qui mel clarificant cum mel rosatum ore excipiendum est, illud enim clysteribus magis idoneum est.

Matthæus Mel myrtinum fit ex succi myrtorū lib.
Gradi. in 1. mellis lib. 2. igne lento simul percoctis.
consil. de Mel vuatum passulatum vulgò , fit ex
lepra. uuis passis intus purgatis aqua calida. 24. horas maceratis, probè coctis, valenter expressis, expresso tandem ad mellis crassitiem percocto.

Mel emblicarum, scilicet myrobalanorū est quo ipsæ sunt conditæ & seruatae.

His mellis differentiis vtimur in aliis compositionibus.

Anacardi triti diebus 7. aceto sufficienti macerantur, octauo coquuntur ad dimidias, colantur linteolo. Succus is cum melle sufficienti coctus ad spissitudinem mel est anacardinum. Foex verò ficcata anacardi sunt preparati. Nicolaus Alexandrinus in Theodoro ex melle anacardino, alii mel leum id quod aquæ innatat, cui incoquantur anacardi.

Fru

Fructus aut saccharo, aut melle, aut utroque condiuntur, interdum integri & cum seminibus, sed ferè imperfecti, interdum seminibus purgati.

Fructus nostrates condiuntur poma, pyramoschatella, cydonia, persica præcocia, armeniaca, pruna, præsertim dactylina, nuces virides, cerasa, corna, baccæ ribes, & oxyacanthæ, omphaces, omnes integri præterquàm magni, vt cydonia, persica, hi enim foris & intus purgati, & in partes 4. secti condiuntur. Nuces verò depellatæ diebus nouem aqua pura in dies ter, quater mutata macerantur. Postea coquuntur aqua, donec tenerescant, ficcantur vento aut lintheis, caryophyllis & cinnamomi portiunculis configuntur. Deinde vt reliqui fructus condiuntur. Alii melius nuces immaturas ter fuso (nam ferramentum acutum nigrauerit magis) configuntur, aqua sæpè mutata macerantur, coquuntur, vbi teneræ euaserunt, mox in aquam frigidam, puram coniciuntur, exemptæ depellantur, lintheo ficcantur, caryophyllis, cinnamomo configuntur: saccharo clarificato & percolato teguntur, quod secundo aut tertio quoque die, quia recruduit, parum est recondendum nucibus tamen interea exemptis.

Sic

Dies 4. sufficiunt edulcarentes si aqua fluuiali multa & sæpè mutata macescentes, tot autem diebus insipidae euadunt, & semis putres. Saccharum si purum aqua pauca ut libra una in libr. duas sacchari coletur im purum & pingue clarificetur cū aequali aqua.

Sic enim virides, & puræ magis permanent. Cydonia quoque purgata ex aqua coquuntur, donec tenerescant postea conduntur. Modus autem condiendi omnibus est vnus, saccharo enim ad syrupi consistentiam cocto immissi incoquuntur, donec syrupi consistentiam saccharum recuperarit quam amissit fructuum humore solutum. Quin & præcocia si prætereà saccharum retrudant, id exemptis interea præcocibus recoquendum, deinde præcocibus reddendum. Si enim cum saccharo recoquerentur durescerent. Aliæ cydoniorum amborum conditura docentur in Mesuæ, sectione prima.

Gelatinam cydoniorum sunt qui ex succo cydoniorum coquunt, alii ex cydoniati parte liquidiore, affuso vtroque pauco succo ribes, aut oxyacanthæ, ad ruboris gratiam.

CONDITURA SEMINVM,

& aliorum quorundam.

CORIANDRVM in tabula polita deliui, crebro succussu purgatur. Rotundius enim ac integrum delabitur. Quæ verò sunt quassa grana, & cum his aliene quædam materiæ in via ferè hærent, vel in ipsis seu carceribus pigra cessant. Aceto id merum horis circiter octo sine igni maceratur,

tur, igni frigitur ac ficcatur, eius libra vna saccharo sic tegitur ac incrustatur. Aquæ in lebetem stannatum impositæ libris nouem albumina ouorum tria iniiciuntur, scopularum agitato multo in spumam tolluntur, mox sacchari, si impurum est (purum enim partius satis est partio remque aquam requirit) libræ nouem miscentur igni, omnia simul feruendo parum diu, & rudicula confunduntur, donec spuma nigrescat, quod aquæ sexta parte consumpta ferè accidit, per pannum laneum colatur. Eius propè dimidium in syrupi ferè consistentiam recoquitur. Interea semidolio focum alterum habenti superpositum in magna pelui ærea coriandrum manibus ad ficcandum ducitur. Dum siccum est sacchari eius vncia circiter vna cochleari affunditur, multum diuque manibus in ea confricatur, id velut tectorium dum apparet ficcatum, iniecto nouo saccharo, iterum vt prius confricatur, idque opus repetitur, donec totum illud saccharum induerint grana coriandri. Tunc reliquum sacchari dimidium in syrupi crassitudinem percoctum, similiter affunditur & confricatur.

Perlatum verò fit (sic enim vocant, quando eius corpori saccharum accrescit in formam paruorum vnionum, quos vulgus per-

fas appellat) si vbi iustam incrustationē, sed
laxē & politam est assequutū, è vase subli-
mi inferno feramine saccharū sic percoctū
paulatim tanquā filo perpetuū in peluim co-
riandrum sic tectum habentem continenter
defluat. Peluim verò continēter in omnem
partem dimoueas, vel ansis apprehensam, &
super corpus rotundum lineo circulo inter-
posito facilè mobilē, vel facilius multò mo-
bilem si ansis funes sic ex solarii tigillo ali-
quo innexi, vt vterque alternis nunc tolla-
tur, nūc deprimatur. Sic cortex cinnamomi,
& aranciorum cōditur, si negligētia frictio-
nis, aut imperitia saccharum fundo peluis læ-
ferit, semina exime, & vasi aquam infunde,
igni trade, donec saccharum remollescat, &
rudicula ferrea deradēti cedat. Vbi tersum
erit fundum vasis, aquā illam saccharatam
effunde in vsus aliquos seruituram, vas lin-
teo mundo, & igni sicca, semina tūc illi red-
de, & opus perface.

Quanto autē est semen minutius, tantò
egrius saccharo integitur, & maiore iniuria
manuum nullius propè interuētū calidario
occurrentium: sed vbi iam auctius tectoriis
aliquot est redditum, tum tutius & facilius
manibus cōfricātibus perficitur. Talia sunt
semē anisi, fceniculi, apii, cari, seriphii, quod
cōtra vermes vocant, papaueris albi in cer-
nic

niculo rariore, aut de flore pro seminis quantitate, purgatum accuratius confricandum: Strobili, pistacia, auellanae, amygdalae dulces, & si vis amarae, similiter siccatae eodem modo, sed citius incrustantur. Caryophyllorum furculi cinnamomum, cortex arancii, limonis, cucurbitae.

Tragema, moschatum ex puluere ireos saccharo aqua rosarum, & paucos moschos sic fit. Pulvis ireos velut compositi basis, in peluimam missa affuso paucos saccharo tribulatur: ubi in granula minima partim concreuit, partim in maiora cribro exiguo cernitur, quod transsit deligitur, iterum si opus est tegitur, donec seminis papaueris (quod etiam nonnulli loco pulueris ireos supponunt ad operis celeritatem) rotunditatem & magnitudinem sit assequutum. Tunc moschus aqua rosarum pauca, ut drachma una uncia semisse solutus, paucos saccharo miscetur quo postremum fit tectorium, sunt qui acervo huius conditurae moschi pyxidem biduo aut triduo tantum obruant, ut moschi odorem trahat, substantiam non dissipet manifeste.

SECTIO SECVNDA DE sapis & syrupis.

Sapa est succus à nobis tantum purgatus, & Mesues. crassatus solis aut ignis calore.

Sapa nobis sola paratur ex acinis vuæ albæ maturis, in lebece sine vlllo liquore coctis, per mantile colatis & expressis. Id autem expressum percoquitur ad mellis consistentiam. Sunt qui vt foelicius seruetur, saccharo pari condiunt: sunt qui ex vuis etiam nigris sapani coquunt.

Iulepus rosatus fit ex aqua rosarum cum pari saccharo cocta propè ad syrupi consistentiam: aut multò minus si mox vtendus est, nec aer ita calet.

Iulepus violatus fit ex aqua florum, & foliorũ violæ nigræ, & pari saccharo similiter coctis, suprâ apozematum cōsistentiam infra syrupi formã. Quanto enim perfectius coquitur, tãto diutius seruetur: sed est ingratiũs. Parantur in rem præsentẽ, aut si non licet, eorum loco syrupi vsurpatur. Quia verò violas non destillamus ex siccatũ infuso coquimus. Alii magna violarum ad syr. violatum ex multis infusionibus faciendũ infusarum parum expressum destillant, hacque aqua inique vtuntur ad iulepi violati compositionem.

Materia syruporum omnis est à plantis, radices apii, petroselini, fœniculi, asparagi, rusci, cichorii, intybi, ireos, pithri, spinæ albæ, & Arabicæ, glycyrrhiza, polypodium, agaricũ, rhabarbarũ, helleborus niger, asarum,

rum, galanga, zingiber.

Herbæ, buglosus vtraque, hyssopus, mentha, calaminthe, eupatorium, absynthium, adiantum album, origanum, thymum, epithymum, cassutha, oxalis, fumaria, chamædrys, chamæpitis, folium. Harum item multarum succus, præsertim buglosi, menthæ, eupatorii, oxalydis, fumarie, intybi, portulacæ.

Fructus poma, pyra, cydonia, cucurbita, granata, citrea, pruna, dactyli, thamar Indi, myrobalani, myxa, zizypha, ficus, vuae passæ mundatæ, capita papaueris albi, nigri, rubri, folliculi sennæ. Horum multorum, succus tantum, præsertim pomorum, pyrorum, cydoniorum, cucurbitæ granatorum, citreorum, & horum cortex, vuarum acerbarum & maturarum, vinum album bonum, antiquum, odorum, acetum, sapa. Ad hæc myrtharum, prunorum, perficorum, ribes, oxyacanthæ, cannarum sacchari, saccharum, penidia: & his affinia, manna, mel crudum, & coquendo despumatum.

Semina, cydoniorum, melonum, papaueris albi, nigri, rubri, lactucæ: portulacæ, api, petroselini, intybi, fœniculi, anisi, ligustici, dauci, cari: piper omne, cardamomum, hordeum, maluæ, lini, fœnigræci.

Flores, crocus, rosa, viola, stœchas, schœ-

nuanthos, epithymum, cassutha, spica nardi, caryophillum, gummi Arabicum, tragacantha, mastiche, & liquor scammoniū. Et præter hæc aqua ferè fontana pura illimis, ac omnis alienæ qualitatis expers, interdū pluvia quæ additur, vt in eam vires medicamentorum simplicium macerando, & coquendo trahantur: deinde saccharo tradantur, vt etiam medicamentum diu coqui possit, & qualitates alienas exuat, nouas acquirat: vt etiam promptius syrupi despumentur, clarificentur, colentur, & in corpus distribuuntur: & sint accipienti gratiores. Aquæ vires sæpè succi sustinent, sed hi sunt, vt dicam, clarificandi.

Succi, herbarum, & fructuum ad syropos bis coquuntur, primò ad dimidias, vt syr. de pomis, & alii propè reliqui: interdum ad partem tertiæ consumptionem, vt syr. acidus ex succo citri, & alter ex succis fructuum: interdum ad libr. vnius consumptionem semel feruefiunt, vt in syr. bizantino: deinde colantur, postea quiescendo residere finuntur, alii biduo, alii triduo, alii minus aut magis diu, donec scilicet quod in eo crassum & fœculentum est, subsederit, & reliquum tenuetur, clarumq; ac purum euadat: id quod paulatim vase inclinato colatur, iterum & cum saccharo ad syrupi consisten-

tia

tiam coquitur.

Subfidet verò aliis citius, aliis tardius, aliis largius, aliis parcius, vt vinis quæ genere sunt succorum, & vrinis. Vina enim alba, quia non ferbuerunt plurimam fœcem reddunt: nigra quia multum feruendo crassum deponunt, minus: in medio sunt media: sic succus pomorum, cydoniorum, limonum, multa parte subsident: succus granatorum minus, vt illis pars sexta ferè subsideat, his pars octaua, vt ex syr. de succo acido citri apertè deprehendes.

Deinde cum saccharo propè pari percoquantur in syrupum, vt succi puri libras 4. 5. sacchari libras 3. 4. recipiant, vt in syrupo succi pomorum, cucurbitæ, succi lib. 7. sacchari lib. 5. in syrupo ex succo citri libræ 10. humoris, lib. 8. sacchari in syrupo acido ex pomis, interdum minus sacchari miscet, vt in syrupo. Saporis succorum libræ circiter 6. in libr. tribus sacchari syrupi corticum citri libræ tres post coctionem relictæ cum sacchari libra vna coquantur.

Quin syru. acidus ex cidoniis in succi libris vndecim, habet tantum sacchari libras duas. Est quando modus sacchari incertus est, vt in syrupo acido ex succis fructuum succi libras tres coqui cum Iulepi lib. duabus,

vel pluribus, vel paucioribus. Si mannā paucam acceperit syrupus, nihilominus sacchari postulat, ut syr. acidus ex manna eius vnc. tres capit, succorum libras 4. sacch. lib. tres, succus tamen cannarum sacchari, aut penidia ponuntur loco sacchari in syr. de canis sacchari nisi pro, aut, &, legas.

Quin & Iulepus clarus & purgatus sacchari vice præstantissimus est in syr. præfer tim ex succis frigidis aut aromaticis, ut fit à Mesue in syr. acido ex succis fructuum, & in syr. corticum citri. Saccharum autem optimum ex aqua æquali coquunt, albuminibus purgant, colant, recoquunt ad penidiorum, aut sacchari rosati, aut electarii ficci consistentiam, & succos mox ubi extracti sunt, sine vlla coctione, colatione, residentia colant, per spumam in colo relictam ex saccharo iamcolato purissimiq; hi transfluunt, & æqua portione baculo multum tribulando electariorum siccorum ritu paulatim miscentur saccharo sicpercocto, quem Iulepum vocat Mesues, quomodo & syr. acetosum simplicem Mesuæ, & oxyfaccharum Nicolai, & alios multos syropos ex succis plerique hodie componunt, ut vires eorum sint integrior, nec ita promptè cadescent, quod vitium pauco melle misto quidam effugiunt. Id quod probo maximè, modo

do

do non canescant, & situm non ducant ob succorum cruditatem. Quod vitium cauetur insolatu: quæ coctio his potior est, quàm quæ ab igne. Hoc autem modo syr. acidus citri, limonum, acetatus simplex albissimus fit, granatorum autem ribes oxyacanthæ syrup. cum debeat esse ruber, minus diu debet tribulari, ne coloris sui gratiam amittat. Est quando saccharum simul cum penidiis miscetur, vt in syru. papauerum ad catarrhum sacchari & penidiorum ana vnciæ quatuor in decocti selibra: & in syr. papauerum ad tussim, sacchari & penidiorum ana vnc. 8. in decocti lib. duabus, sed in illo saccharum est parcius, vt in syru. adianti, sacchari clarificati, & aquæ adianti ana vnc. octo cum lib. duabus decocti.

Coquuntur autem in vase terreo plum-bato potius quàm æreo stannato, igni prunorum lento, aut flamma exigua, sed sine fumo, vt carbonēs antè sint omnino accensi quàm vas igni tradatur: qui si coctioni non sufficiant, alii ex foco semiuisti substituantur, vt diximus in methodo medicamenta componendi lib. 3. ne carbonum nouorum teter vapor coquenda vitiet.

Coquuntur syrapi ad iustam crassitiem, seu donec portio eorum refrigerata digitis tractatu hæret, ac fila ducit, & iniecta mar-

Nicolaus mori aut scutellæ stat & durescit non flui-
Alexādrī tat, seu donec immisi humoris seu decocti,
nus in syr. seu succi vnciæ circiter duæ in libris singu-
rosaceo. lis sacchari supersint. Id quod depræhendes
 bullarum modo & numero: nam quoad suc-
 ci multum superest in medio bullam exci-
 tat vnā, eamque maximā in ambitu pau-
 cas & paruas: dum verò in syrapi consisten-
 tiam coctum propè est pro bulla illa maxi-
 ma, plurimæ vbiq̃ue mediocres tolluntur.

Qui verò syrapi decocto constant, non
 succis: pro feminum aut radicū libra vna
 requirunt aquæ libras circiter quatuor, pro
 herbarum manipulis quatuor, siccarum qui-
 dem, aquæ libras duas: viridum verò li-
 bram vnā, aliorum autem simpliciū quia
 pauca sunt parua habetur ratio. Mesues ta-
 men, radicū simul & feminum libram vnā
 coquit in aquæ libris decem ad dimidias in
 syrupo acetato cum radicibus.

Cum item hordeum, vel aliud diu co-
 quendum est, aut per se est macerandum,
 aut tanto largior aqua est affundenda,
 quanto coctio longior est futura: sic dum
 sicca, rara, lenta, & glutinosa coquis, a-
 quam auge, vt in syrupo hyssopi, zizypho-
 rum, alioqui colari non poterit, nisi nodu-
 lum ex glutinosis eamcolato incoquis, aut
 mucaginem ex his cum portione decocti
 ext

extractam coctiori iam saccharo misces. Incocta enim hæc glutinosa decoctum incolabile reddunt, quia substantia emplastica viam sibi præcludunt, poris coli obstructis. Idem vitium est si penidia miscentur ex saccharo pinguiore, impuriore cum amylo multo tractata. Sunt qui libræ camentorum multam coctionem sustinentium tribuant aquæ lib. 6. paucam, se libram, mediocrem. 3. lib. aquæ.

Simplicia primum deliguntur, & in scriniola papyracea, vel similia digerantur. Si *Diosc.* qua seorsum maceranda sunt, aut simul ante macerentur: coquenda verò in lebetem in quo aqua iam caleat non tamen ferueat, iniiciantur, primum coctu contumacia, seu quæ viribus suis adhuc integris, longam sustinent coctionem, qualia ferè sunt radices, semina, fructus, cortices lignorum: *Diosc.* deinde illa quæ mediocriter: postremò quæ ob essentiæ tenuitatem, aut virium imbecillitatem, etiam mediocri coctione exanimantur. Id quod odore, sapore, colore natiuo mox perduto ferè declarant. Quamquam color viridis in adiantis, ruber in zizyphis magis intenditur: quia in his valenter est mistus, & adianti perpetuò virent. de quibus omnibus abunde libro præcedente, de coctionis ratione diximus, hæc dum
car

carbonibus accensis coquantur, quæ spuma supernatat, cochleari foraminulento deditur, & simplicia, præsertim graua, identidem rudicula tolluntur à fundo, ne vrantur, & leuia merguntur: vt coquantur, & vires suas aquæ tradant. Vbi quantum satis est cocta erunt omnia (quod ferè fit hora vna) & vim suam omnem in aqua iam quantum satis est consumpta deposuerunt (quod in multis simplicibus sapor propè aqueus relicto proprio declarat) igni aufer, & si vis in stanneam peluim, aut stannatam transuasa: tege disco mundo, horis quinque, sex, noctem, diem, macerari permitte. Post id tēpus igni parum diu redde, vt recalescant tantum: tūc per stamen cola, & exprime. Expressum vel procul ab igni vel potius igni redditū, ouorum duorum iniectis albuminibus in libras 9. 8. 10. scopulis agita diu, & permisce donec quantum potest spumescat. Mox saccharum in frustra comminutū, immitte, aut penidia, aut mel, & si qua sunt seorsum infusa, aut soluta, vt thamar Indi, cassia, agaricū. Postea coque, donec feruendo parum absit à supernatando & effluendo, efflataq; modice spuma decoctum sub hac clarum appareat. Tūc vt calet panno laneo puro cola, si est glutinosum, & quod primum permearit rursus cola, & si vis totum bis, aut ter cola, mutato
eti

etiam colo, si propter prioris sordem opus est. Nam quæ ita calida colantur, igni multum tenuata, permeant impuriora: si lento-
re carent, modicè refrigerata colentur: Panno etiam digitis molliter expresso, nequid
utilis materiæ in eo & fœcibus maneat, ne tamen adeò exprimas, ut sordis aliquid simul elicias, tunc enim iterum foret colandum. Vbi colando iam purum erit expressum, purgato intereà & ficcato lebeti redde, & igni lento percoque ad syrupi consistentiam, seu donec decocti vnciæ duæ, aut tres in libris singulis supersint.

Si autem mucosa quædam sint incoquenda, ut semina maluæ, cydoniorum, lini, fœnigræci, mastiche, tragacantha, gummi Arabicum, nodulo raro ligata filo longo & forti colato iam decocto incoque. Sūt qui tantum ante clarificationem incoquūt, alii ante & post. Postremò cum absoluta est coctio, expressum nonnulli abiciunt: alii nulla ratione in decocto retinent, cū vires suas ea iam tradiderint omnes, non etiā aliquas retinent, ut nodulus aromatum, rha barbari, scamonii, hellebori nigri, & aliorum de quibus libro superiore in expressione.

Si verò ex infusione simplicium post coquenda fiat syrupus, omnia simul infundantur, deinde coquantur. Sic enim vis eorum
huma

humori firmitus, & diutius impressa, coctione iusta dissipari non videtur. Aqua autem infunduntur largiore sicca, rara quam viridia densa, vt in syru. scæchados simplicium, verbi gra. parum tritorum lib. vna maceretur horis 24. libris septem aquæ, si aridiora sint libris octo, quarum vnā vel paulo plus ebibent: coquantur deinde igni lento ad partis tertiæ consumptionem, quod etiā citra infusionem coquendo, faciendum est: postea exprime, & reliquum, & lib. quatuor percoque cum mellis despumati, aut sacchari puri libris quinque ad syrupi consistentiam, & syrupi habebis lib. 6. & dimidiam, aut si hyems est, ad libras sex: si æstas, ad lib. quinque & dimidiam. Nam æstate syrupi magis coquendi quā hyeme ne ferueant humore excrementoso feruoris & putredinis causa relicto accedente externo calore hāc excitante, sacchari aut mellis purgati pondus par succo aut decocto quidam misceri volunt: alii verò etiam paulò plus ob nostrarum plantarum cruditatem, ob quam etiam diutius syrupi nobis sunt coquēdi, vt propè solum sacchari aut mellis pondus maneat percocto iam syrupo. Diutius etiā coquendum: sic succi, aut decocti plus est quā sacchari, aut mellis. Paulus tamen mellis partem vnā succi, aut aquæ partes tres coquit
ad

ad partim duarum consumptionem in rho-
doſtaſte ſucci roſarum ſextarios duos, mel-
lis ſextarium vnum coquit ad quartæ par-
tis consumptionem.

Coquuntur ſyrupi in vaſe quouis, ſed qui
acetati ſunt in vaſe lapideo vel terreo, ſed
plumbato, quod etiam Meſues rectè mo-
nuit in ſyrup. acetato ſimplici, ne acetum ex
ære æruginem eliciat quæ ſyrupum vitiet,
niſi vas æreum ſit ſtannatum, quale eſt quo
vtuntur ferè in officinis. In quibus coctio-
ne perfectæ ſcopus eſt ſyrupi conſiſtentia:
ſi verò antequam mel recipiant, cocta erant
parum, vt ad tertię partis consumptionem,
poſt mel acceptum magis ſunt coquenda,
vt oxymel de radicibus. Minus autem quæ
cocta erant donec tantum pars tertia rema-
neret, vt in oxymelite de calaminthæ me-
diocriter, vbi ad dimidias erant cocta, aut
mel perfectius coctum illis minus coctum,
ſecundis mediocriter coctum, poſtremis mi-
ſcendum eſt.

Si operis ſpecimen edis, aut etiam tecum
componis, aquæ libras quindecim cum Me-
ſue, aut potius viginti, libras ſex roſarum
macera horas octo, expreſſis roſis nouas
immitte, idque opus nouies repete: aut
ſi libras aquæ tantum quindecim miſces,
expreſſum pende, quod ſi diminutum eſt,

qu

quod deest suffice alio expresso trium aut quatuor infusionum.

Nicolaus. Syrupus rosatus sic paratur, rosas recentes

Hic præ-
sertim re-
cens me-
diocriter
purgat ma-
gis ex in-
carnatis,
ut in Me-
sue docui.

aqua feruente macera uase operculato, ubi hæc refrixerit expressis rosis & abiectis, iterum feruefiat, & easdem rosas recentes alias macera. Id opus toties repete, donec aqua rubeat. Hæc albuginibus purgata cum pari saccharo percoquatur in syrupum.

Parari omnino hic debet aut iulepus rosatus Mes. in syrupum coquendus, non autem eius loco semper (quod hodie fit) substitui syr. ex rosarum siccarum infuso simplici, vel duplici cum pari, aut paulo parciore saccharo cocto & colato, qui syr. rosarum siccarum est. Alius autem ex succo rosarum rubrarum fiat purgatio, cum pari saccharo, tertius ex infusionibus nouem rosarum, præcipuè incarnatarum purgatorius.

Nicolaus. Syrupus uiolatus, & nymphaeæ, & alij ex floribus eodem modo fiunt.

Mesues. Syrupus ex cydonijs fit ex libris decem succi cydoniorum coctis ad dimidias. Deinde biduo residere permisis donec clarescât. Tunc colentur, & cum libris tribus sacchari fiat syrupus.

Si saccharum est purum, eius lib. vna aquæ vinctis quatuor soluta tribus feruefactioni-

bus

bus in electarium coquitur, tunc succus cydoniorum pistillo valenter commiscetur, sunt qui parumper saccharo propè percocto incoquunt: si impurum est saccharum, eius libra in aquæ lib. vna coquitur, clarificatur, colatur, percoquitur in electarium, fit vt prius. Sunt qui succos citra coctionem residendo, & insolando purgant, deinde cum saccharo clarificant, colant, percoquunt. Alii aliter, vt ante diximus.

Syr. de granatis acidis, syr. de granatis dul- *Mesues.*
cibus, syr. de omphacio, syr. ex succo oxalidis,
eodem modo fiunt, & de ribes, & uua oxyacan-
the.

Similiter ex fructuum omnium, & herbarum succo fieri syrupus potest si ad dimidias coquatur, biduo residere permittatur, coletur, cum saccharo propè æquali percoquatur, in syrupi consistentiam.

Alii in his omnibus saccharum aqua pari solutum coctum modicè cum albuminibus purgant, colant, percoquunt in electarii, aut penidiorum consistentiam. Tunc vbi frigidit, succos ipsos per albumina in colo relicta colatos, & claros paulatim baculo miscant, qua componendi ratione succorum vis, præsertim frigida, vel aromatica integrior manet quam si ipsi coquantur. Alii suc-

cos hos residendo, & insolatu purgatos, saccharo, vt dixi, percocto cōprehēdūt. Quam componendi rationem omnino præfero ei quæ succos ad dimidias coquit.

Mesues.

SYRUPUS COMPOSITUS.

SYRUPVS saporis de pomis recipit succi pomorū redolentū lib. tres, succi buglosi domestici & sylvestris ana lib. duas, folliculorum sennæ unc. quatuor, croci drachm. duas, sacchari albi libras tres. Fit autem sic, senna contrita horis 24. succis macerata, semel aut bis feruescat, coletur: expressum post cum saccharo percoquatur in Syrupum: crocus autem panno lineo ligatus inter coquendum infricetur.

Mesues.

Syrupus portulacæ accipit seminum portulacæ tritorum lib. unam, horis 24. macerandam in
* Alij sex succi intybi cocti & purgati lib. * quatuor post-
uel etiam eā igni lento coque ad dimidias, & colatum cum
octo, ut eo sacchari lib. duabus percoque in Syrupum.

lari possit, Syr. adiantinus recipit glycyrrhizæ unc. succus e - duas, adianti albi unc. quinque, tempera cum
nim per se aquæ fontis lib. quatuor horis 24. coque ad dimi-
glutinosus diuise expressum percoque cum sacchari clarifica-
lētescit ad ti, aquæ adianti albi ana unc. octo.

būc infuso Ex adianti albi lib. vna, & vnciiis duabus
semine. glycyrrhizæ purgatæ & tritæ, decoctis in
aqu

aquæ libris sex ad consumptionem tertiæ partis cum sacchari libris tribus. Hic percoquimus, adianti albi, recentis penuria, alii cum sacch. libra, aut sesqui libra coquunt sine aqua adianti, alii adiantum album recens multum sine glycyrrhiza aqua macerant, exprimunt, cum saccharo clarificant, percoquunt.

Syr. rizophorum fit ex rizophis sexaginta, Mesues. violarum, seminis maluæ, ana unc. quinque, adianti albi, glycyrrhizæ, hordei mundati, ana unc. una, semi. cydoniorum, papaueris, melonis, lactuce, tragacanthæ, ana drach. tribus, coctis cum aquæ fontanæ lib. quatuor, & lib. sacchari duabus.

Aqua est parciore quàm ut possit colari, ob id vel augenda est, vel semen maluæ & cydoniorum, & gummi tragacanthæ nodulo ligata clarificato syrupo immitantur, vel dimidium nodulo coctioni ante clarificationem immittatur: reliquum iam clarificato, si autem muccaginem ex his extractam non clarificato immiseris, ægerrimè ob horum lentorem colatur: si colato, turbidus & impurus, ob id ingrator fit syrupus.

Syr. papaueris fit ex capitum papaueris albi & nigri, ana drachm. sexaginta coctis in lib. quatuor aquæ pluuiæ ad consumptionem lib. 2. Ibidem.

& dimidia, tunc percoquantur cum sacchari albi, & penidiorum anauncijs quatuor.

Largiore saccharo si condias, vt lib. vna, aut etiam duabus gratius erit, & citra multam coctionem facultati refrigeranti inimicam diutius seruabitur, cum pauco autē saccharo puro, si diu non erit seruandum est efficacius. Capita cum seminibus magnorū & paruorum siccorum & humidorum media macerentur 24. horis: & si sint sicciora, pluribus deinde coquantur, donec tabescāt: exprimantur cum saccharo, vel melle pro variis medici scopis, percoquātur in syrupum. Vide diacodium in Mes.

Ibidem.

Syr. acetatus simplex recipit aquæ fontis lib. quatuor cum sacchari lib. quinque coquendas in uase lapideo, ad dimidias semper despumando, tunc adde aceti albi clari lib. duas.

Sunt qui saccharum aqua solutū medicriter coquāt, albuminibus purgant, colant, percoquunt in electarii cōsistentiam frigescenti, paulatim baculo miscent acetum purum, vel per albumina in colo relictā colatum, idque ne candescat. Alii Nicolaum fequentes aceti albi partes duas cum saccharo purissimo coquunt & despumant, neque alter clarificant. Hic quanquam minimum, tamen compositus est.

Syr.

* Putatur inuentus, uel usu multo celebratus bizantiij unde illi nomen alijs à pretio denarij bizantini qui quibusdam ho die etiam

* Syr. acetatus cum radicibus recipit radicem bisantius apiij, fœniculi, intybi, ana unc. tres, seminum apiij, dicitur, un fœniculi, anisi, ana unc. unam, sem. intybi unci. de & syr. dimidiam. Hæc omnia igni lento coquantur ad quoq; hūc dimidias in aquæ fontanæ lib. decem, tunc addi- denarij uo tis sacchari lib. tribus clarificetur, deinde ace- cant. tum additur.

* Syr. Bizantinus recipit succi intybi, & * Syr. bi- apiij ana lib. duas, succi lupuli, buglosi hortensis, zātinus ab uel syluestris ana lib. unam, feruefiant semel & solute sine purgentur. Eius succi clarificati libras quatuor aceto est. igni lento coque in syrupum cum sacchari libr. Syr. bizā duabus, & dimidia interdum additur * ace- tinus ace- tum mensura succorum purgatorum dimidia: tatus. interdum rosarum unc. duæ, glycyrrhizæ, unc. Syr. byzā dimidia : spicæ nardi drachm. duæ sem. anisi, tinus cum fœniculi, apiij, ana drachm. tres succis inco- additioni- quantur. bus.

* Syr. de quinque radicibus accipit radicem apiij, fœniculi, petroselini, asparagi, rusci, ana * Incerti unc. duas, coque libr. sex aquæ fontis, ad tertiæ est autoris partis consumptionem expressum percoquitur cum sacchari lib. tribus, addendo sub finem ac- ti unc. octo.

Oxymeli simplex fit ex aceti parte una, mellis partibus duabus, aquæ partibus quatuor coctis in syr. consistentiam despumando.

Hodie sic coquunt quod diu seruandum est. Oxymeli autem Galeni ex aceti parte una, mellis partibus duabus, aquæ partibus hyeme octo, æstate etiam duodecim. Mel cum aqua primùm despumatur, vbi spuma redefiit, cum aceto iterum despumatur, refrigeratū albuminibus clarificatur, igni redditur parum diu, cū tollitur, cinnamomū ad drach. vnā in libr. singulas: dum refrixit, per pannum bis, ter colatur: addito si vis etiam tum cinnamomo iucundissimum, dies paucos loco frigido seruatur ex albo aceto melle pulchrius.

Acetum scillinum sic fit, scillæ laminas inter corticem & cor medias, acu lineā filo consutas tanto interuallo ne se contigant siccabis in umbra dies quadraginta, postea concisam cultello ligneo lib. unā dies alios 40. insolabis, in aceti boni lib. 8. in uase uitriato, strui orificij bene obstructi, postea colabis, & seruabis.

Sunt qui inter scillæ laminas ne se tangent, & ad odoris gratiam intersuunt sceniculi viridis, aut sicci stipites.

Ibidem. Oxymeli scillinum fit ex aceti scillini libr. dua

duabus, mellis despumati, lib. tribus decoctis despumando.

Ante mel sit despumatum, vt in melle rosato, sed quam spumam vi aceti scillini expuit, eam derade.

Oxysaccharum fit ex aceti unc. quatuor, sacchari lib. una, succi granatorum acidorum maturorum lib. dimidia. Nicolaus
saler. aliter fer N^o
cophar.

Saccharum si purum est aceto solutum, duabus aut tribus feruefactionibus coquitur in electarium, postea cum parum refrigerit, pistillo miscetur succus granatorum. Si autem saccharum est impurum, ex aqua coquitur & clarificatur, deinde aceto & succo percoquitur.

Syr. absynthij recipit absynthij Romani libr. dimidiam, rosarum rubrarum unc. duas, spice nardi drachm. tres, uini antiqui boni & odori, succi cydoniorum ana libr. * unam & dimidiam. * Alij, lib. duas & dimidia, ut
In his macera horis 24. predicta coque igni lento ad dimidias cum mellis lib. duabus, fiat syrupus.

Absynthium, rosæ, spica minutim concisa vino & succo macerantur, coquuntur, expressuntur, expressum cum saccharo clarificatum percoquitur in syrupum. Satius fuerit absynthium per se infundere, & rosas, & spicam simul, deinde infuso absynthii parum cocto addere alterum, & parum

simul coquere, exprimere. In expresso libr. sacchari dissoluti albuminibus clarifica, cola, tunc adde libr. reliquam sacchari, sed purissimi, vel per se clarificati. Si enim decoctum id cum duabus simul libris sacchari clarificas ob succi paucitatem non percolabitur, nisi succū, vt dixi, auxeris ad libr. duas & dimidiam.

* Sunt qui pomorum acido dulcium, ut ramburo-rū, & granatorum acido dulciū, tantū ana lib. duas & dimidiam miscent.

* minutim concise.

* que succos macerando oportos coquēdo reddit.

* Syr. menthæ recipit succi cydoniorum acidodulcium & dulcium, succi granatorum acidorum dulcium, acido dulcium, ana, lib. unam, & dimidiam * foliorum rosarum unc. duas, coque igni lento ad dimidias, * cum mellis uel sacchari lib. duabus fiat syrupus, aromatizetur cum gallia.

Succos potes sole, igni, quiete purgare, & his reliqua macerare, vel, citra purgationē. His cætera macerabis horis. 24. igni lento coque, exprimē, recoque, clarifica cum saccharo, vel saccharum clarificatum misce, cola, exprimē cum saccharo, expressum clarifica, colatur panno ægre & lente, sed tandem aut pannum muta, aut saccharum, vt prius partire.

Loco syruporum fumarie maioris & minoris hodie coquimus syr. ex succo solius fumarie cocto residendo, purgato, percocto in syrupum cum saccharo æquali.

Syr.

Syr. epithymi recipit epithymi boni horten- Mesues.
sis drach. uiginti, myrobalanorum Indarum, ci-
trearum ana drach. quindecim, cassuthæ, fuma-
rie ana drach. decem, thymi, calamintes, buglos-
si, stæchados, glycyrrhizæ, polypodij, agarici, my-
robal. emblicarum, & belleric. ana drach. sex,
rosarum, semi fœniculi, anisi, ana drach. duas &
dimidiam, pruna uiginti, uuarum passarum pur-
gatarum unc. quatuor. Thamar Indorum unc.
duas & dimidiam, sacchari libr. quatuor, sapa
lib. duas, fiat syrupus.

Pruna, uux, femina, polypodium in aquæ
libris octo coquantur, postea glycyrrhiza,
buglossus, fumaria: post myrobalani, cala-
minthæ, thymus: deinde propè coctis epi-
thymus, cassutha, stæchas, rosæ, agaricum,
addantur, ubi aquæ dimidium erit consum-
ptum, aufer igni macerari noctem vnā si-
ne, recalfactum exprime, expressum clarifi-
ca cum saccharo, & cola. Thamar Indi cum
decocti vncijs duabus creti & pensi, vt pur-
gatis pondus iustum expleant, syrupo ad-
dantur, minimum coquantur ad decocti sci-
licet consumptionem, & sapa syrupo soluta
misceatur: recoqui enim non debet. Sine his
duobus sapore iucundo præditis consisten-
tia fuerit liquidior, clarior & gratior, & ef-
ficax syrupus ad ea quæ promittit. Sunt qui

rectius agaricum, & myrobalanos seorsum infusos exprimūt, & aliis miscent, paulò ante collationem.

Mesues. Syr. stæchados recipit florū stæchados drach. triginta, thymi, calaminthes, origani ana drach. decem, anisi, pyrethri, ana drach. septem, piperis longi drach. tres, zingiberis drachmas duas, uuarum passerum purgatarum uncias quatuor, mellis libr. quinque conditur cinnamomi, calami aromatici, spicæ nardi, croci, zingiberis, piperis nigri & longi ana drach. una & dimidia, ligata in panno raro & appensa in syrupum.

Coquitur in aquæ libr. 7. vel octo ad libr. circiter duarum consumptionem, colatum cum sacchari libr. quinque clarificatur, colatur, propè percocto immergitur sæpe nodulus, & rudicula comprimitur: postremò in percocto appenditur. Vuæ, origanum, calaminthe, pyrethrum, zingiber, piper, thymus, stæchas hoc ordine coquantur.

***Despu-
mati.** Syr. glycyrrhizæ recipit glycyrrhizæ unc. duas, adianti albi unc. unam, hyssopi sicci unc. dimidiam, boris 24. macera, aquæ libr. quatuor coque ad dimidias, expressum percoque cū* mellis, sacchari, penidiorum ana unc. octo, aquæ rosarum unc. sex.

Hodie coquunt plerique sine maceratione

ne, quòd ex his facultas in aquam coquendo promptè trahi possit. Hæc rosarum aqua percocto iam syrupo addenda, sed coquendo consumenda, nisi cum quibusdam drach. tantum sex misceas, tunc enim recoqui non oportet, quia aqua tam pauca saccharū non recrudat. Sunt qui manè macerāt, post meridiem coquunt, penidia hæc fiant ex saccharo purissimo (nam impurum ægre colatur) hoc est, saccharum ad consistentiam penidiis debitam coctum, & pertritum pistillo ligneo in vase non autē manibus oleo, inunctis etiam cum amylo, tractum in penidia nempè illo saccharo impuriora.

Syr. hyssopi, recipit hyssopi mediocriter sicei, Mesues. radicum apij, sceniculi, glycyrrhizæ, ana drach. decem, hordei mundi unc. dimidiam, semi. maluæ & cydoniorum, tragacanthæ ana drachm. tres, adianti albi drach. sex, rizophæ, myza ana triginta, uuarum passarum purgatarū drach. duodecim: ficus siccis, daetylos pingues ana decem, penidiorum alborum lib. duas: fiat syrupus.

In lib. aquæ sex calidas iniice hordeum hora post dimidia radices si dantur recentes, elignatas tamen & cōcisas, horæ quarta parte post, fructus omnes, mox semina, & tragacantham linteo raro ligata, filo lōgo, post

postremò adiantum, penidia vt prius.

Ibidem.

Syr. prassij, recipit prassij unc. duas, hyssopi, adianti albi, ana drach. sex, glycyrrhizæ, unc. unam, calaminthes, anisi, radicum apij, fœniculi ana drach. quinque, ireos, semi. maluæ & fœnigræci ana drach. tres semi. lini & cydoniorum ana drach. duas, uuarum passarum purgatarum unc. quinque, ficus passas pingues quindecim, penidiorum mellis boni despumati ana lib. duas.

In aquæ libris octo radices primum, deinde anisum, vuæ, ficus, post prassium, hyssopum, calaminthe. postremò adiantum coquantur ad dimidias, horis sex macerentur, recalsiant, exprimantur, cum penidiis & saccharo clarificentur, colentur, percoquantur in syr. intereà identidem in id colatum, & si vis expressum immerso & confricato nodulo semina maluæ, lini, fœnigræci, cydoniorum continente.

Ibidem.

Syrupus intybi recipit succi intybi una seruatactione, deinde residentia purgati lib. octo, assume paulatim. saccharo. si impurum est clarificato. Si uerò minus est purum, succo dissolutum coquatur, cum albuminibus purgetur, coletur, percoquatur in syrupum, nam hic succus prompte corrumpitur, cum succus limonum, granatorum, cydoniorum, etiam per se seruari possint, & mul
tò

tò magis parum costi cum saccharo.

Intybum accipe cicorium syluestre non lactucam syluestrem vulgi endiuia seu intybum. Ne sit opus prætereà syr. duobus de cichorio simplici, & de endiuia simplici. Quod si in aliquibus scripturis intybus & cichorium requirantur, vel ipsum auge, vel satium & erraticum, angustifolium, aut latifolium, vel alias cichorii species misce.

Syr. arthemisiae Matthæi Gradi in cap. de mēsis sciendis lib. 9. ad Almanforem, recipit arthemisiae manipulos duos, pulegij, calaminthes, origani, melissophyli, persicariae, sabinae, sampsuchi, chamædryos, hyperici, chamæpitjos, matricariae cum flore, centaurij parui, rutæ, bethonicae, buglosi.

Radicum fœniculi, apij, petroselini, asparagi, rusci, saxifragiae, enule, dictamni, cyperij, rubiae, iridis, pæoniae ana manipulum unum.

Seminis iuniperi, libystici, petroselini, apij, anisi, melanthij, carpobalsami, costi, asari, pyrethri, cassiae lignae, cardamomi, calami aromatici, phu, ana unc. semissem. Quassata infundantur aquae fluuiali sufficienti horas 24. post coque ad aquae dimidia consumptionem. Tunc aufer igni, dū aqua tepuerit, frica manibus omnia

&

et cola expressum percoque in syrupi cum mel-
lis et sacchari quantitate sufficienti. Additur
interdum acetum acerrimum, uel scillites lar-
gius, parcius pro scopis uarijs, aromatizatur cin-
namomo et spica.

*Alius sim-
plicioris
est in usu.*

In aquæ libras octo coque primum radi-
ces nostrates, deinde femina, post herbas,
postremò pyrethrum, & aromata. Co-
ctum, asarum, cassiam, cardamomum, ca-
lamum aromaticum, phu ubi libræ qua-
tuor supererunt, fiat ut in cæteris, & cum sac-
chari & mellis ana libravna, & dimidia per-
coquatur, ut sit efficacius, quanuis plurima
multum amara recipiat, pauco melle & sac-
charo dulcoratur, persicariam astringentem
& frigidam, quæ maculato est folio nonnul-
li miscent: ego autem acrem & non macula-
tam usurpandam censeo, ut acria & menses
mouentia sint omnia nulla temperantia.

*Idem ple-
risque fit
simplex a-
blato rha-
barbaro.*

Syr. cichorii ex Gulielmo Placentino, recipit
cichorii manipulos duos.

Foliorum buglossi utriusque, lactuca, cicho-
rii hortensis, oxalydis, uiole nigræ, sereneos tri-
carie ana manipulum unum, rha barbari drach-
mas.

Herbæ tritæ coquantur in lib. duabus, aquæ
ad partis terciæ consumptionem, coeuntur. Adde
exp

expresso saccharo libras duas, clarificetur, & iterum coletur, reddatur igni, adde rha barbarum pulueratum panno lineo ligatum, & sepe confrica, donec syrupus erit percoctus.

Syr. cichorij alter ex Nicolao Florentino, recipit intybi satiui & erratici ana manipulos duos cucurbitæ, lichenis, lactuce sylvestris, & sativæ, fumarie, lupulorum, ana manipuli unum, bordei integri, balicacabi ana unc. quatuor, glycyrrhizæ, adiatii albi & nigri, & vulgaris, asplenij cassuthæ, ana drach. sex, radicum feniculi, apij, asparagi, ana unc. duas, coque in aqua sufficiente, cola, cum saccharo clarificatum & rursus colatum percoque in syrupum confricando in eius libris singulis rha barbari, drach. quatuor, panno raro ligatas cum spice nardi scrupulis quatuor. Dantur uncie tres cum emulsione seminum quatuor frigidorum maiorum.

Hi duo syropi hepatis obstructionibus, & intemperaturæ calidæ destinati, quia nominibus Barbaris & nemini intellectis constant, pelagus opinionum pepererunt. Nā erdiuia sylvestris & domestica, taraxacon, batissosere, scariola, cichorium, quid apud hos sit Barbaros nunquam possis ex ipsorum scriptis didicisse tam sunt ea plena crassa ignorantia. Propterea mihi videtur satius
cum

cum cichorii seu seridis genus omne eadem sit facultate, cichorium autē quod sylvestre est stomacho utilius & efficacius sit, ut syrupus hic ex solo fiat cichorio, aut cichorii succo, sed largiore, ut sit simplicissimus, cui si ad pompam voles alias seridis species miscere, & lactucam sativam & agrestem, & sohelum utrunque, & hieracium utrunque, & chondrillam luteam, ac ceruleam, & si quid aliud tam sativum quam agreste lacteū est, ac cichorii generis, nihil repugno, modo tamen non sis anxius in harum vocum Barbaris cum re corruptarum inquisitione. Assuesce igitur vocibus Dioscoridis, nec te afflicta desiderio barbararum vocum, quæ quid significant ne ipsi quidem qui hos syropos scripserunt, nec ipsorum alius quicquam unquam pernouit, aut certò definiuit.

Endiuvia (quod nomen ex intybo corruptum) Barbaris est quæ lactuca sylvestris Dioscoridis videtur. Thuscis autem vulgò endiuvia est intybus, seu seris, lato folio: scarriola verò ex seride etiam deprauatum est, intybus est sativus angustifolium.

Taraxacon seu altaracon, etiam Gatina-riæ aut cichorium est, aut dens leonis seu cichorium erraticum, latifolium Plinio dictum. Batissoseris Hermolao corruptum videtur ex baptifecula, quæ illi cyanus est, rub

ribus sic dicta quod seculam, id est, falcem
messoria remoretur. alii malunt baptissofe-
rim esse ferim, id est, cichoriū quoddam er-
raticum: in tritico frequens store cyanum re-
ferente, quibus magis accedo.

SECTIO TERTIA DE

Elegmatibus.

ELEGMATVM seu lintuum materiæ
ferè sunt Mesuæ partes plantarum. Ra *Lohoc.*
dices, vt glycyrrhizæ, scillæ, iridis, bryoniæ:
allii, ari, dracontii, cānæ vstæ, quod spodiū
Arabibus dicitur.

Herbæ, hyssopus, prassium, adiantum al-
bum, calaminthæ, brassica. Flos croci. Fru-
ctus, vuæ passæ, ficus passæ, dactyli, myxa,
zizypha, capita papaveris albi.

Succi radicum, glycyrrhizæ, scillæ.

Succi herbarum, brassicæ, prassii, fœnicu-
li, cannarum sacchari id est, saccharum, & ex
hoc penidia, mel.

Succi fructuum, mororum, batinorū, nu-
cum, myrtarum, pulpa cassiæ, sapa.

Gummi, tragacanthi, arabicum, myrrha.

Semina, papaveris albi, & inde syrupus,
psyllii, cydoniorum, maluæ, melonum, cucu-
meris, citreoli, amygdalæ dulces, amaræ,
strobili, auellanae, lactucae, portulacæ, lini,
fœnigræci, fœniculi, anisi, nasturcii, amyli,
farina fabarum.

Cortices cinnamomū, & alii cortices, radicis capparis, tamaricis, hellebori, petroselin. &c. Præter hæc aqua cui multa horum infunduntur, incoquantur, & ex animalibus pulmo vulpis, butyrum.

Ex his radices & herbæ teruntur si sunt siccæ, vel aqua incoctæ & tritæ, & cretæ aliis miscentur, spodium ducendo friatur.

Fructus purgati teruntur, cernuntur: sed dactyli intus & foris purgati ante decocto thoracico aliquo macerantur: capita papaveris albi macerantur, coquantur, exprimuntur, abiciuntur.

Succi omnes ferè hoc loco liquidi sunt, & ob id promptè miscentur: glycyrrhizæ autem succus, vel dissolvitur, vel in taleolas lectus, inter papyros siccatus, ut aliter calfactas. scilicet aliquoties pistillo & mortario teritur.

Gummi teruntur calfactis pistillo & mortario si est siccatione opus, vel in mucaginem solvuntur.

Semina si maiora sint, lepellata cultello inciduntur, ut amygdalæ, strobili, pistacia, avelanæ, fabæ, melonum, cucumeris, citreoli, si parva puluerantur, & si vis horum quædam ut papaveris post inciduntur, ex aliis etiam mucago extrahi, & reliquis misceri potest, ut ex semine lini, fœnigræci,
cyd

cydoniorum, psyllii.

Huius verò tempestatis elegmatum materia, magis sunt penidia, pilulæ albæ, bechicæ, electarium, vel pulueris E. diatraga-
cathi fri. diairis simplicis, & Salomonis dia-
calaminthes, dia hyssopi, diaprassii, saccha-
rum cādefactum, succus glycyrrhizæ, cassia,
cum syr. adianti, glycyrrhizæ, zizyphorum,
vel alio thoracico magis & minus calido,
tergente incidente, pro medici indicationi-
bus. Quibus misceri possunt etiam alia sim-
plicia prius dicta dulcia, amara, acris.

Tamen ex veterū elegmatis hodie qui-
dam retinēt elegma sanū, ex pulmone vul-
pis, diacodiō, diamorō, diacariō. De quibus
quia est abundè nobis dictum sectione ter-
tia Mesuæ, frustra hic repetenda nō fuerūt.

Sunt etiam qui compositum hoc medica-
mētū elegma cassiæ pro enematibus vocāt,
& sic parant. In libra vna decocti violarum,
maluæ mercurialis, betæ parietariæ, absyn-
thii coquunt mellis lib. dimidiam, & sub fi-
nem iniciunt pulpæ cassiæ fistulæ purgatæ
libram vnam.

SECTIO QVARTA.

SECTIO quarta de apozomatibus, &
infusis est: quia tamen horum nullum
hodie in vsu est, satius fuerit si quem vten-
di cupiditas cœperit, Mesuën consulere.

Quæ autem infusa & apozemata in rem præsentem hodie facimus, longè sunt ab illis diuersa, & tam parata facilia, vt vel pueris perspicua sint. Quapropter de his superfedere malui quàm parum necessaria, etiam intelligentibus inculcare, præsertim cum statuerimus aliquando dare typographis commentarium quendam nostrum de remediis medicis omnibus sumendis & admouendis: inter quem multa congerimus exempla apozematum, & infusorum hac ætate consuetorum, quæ ad medicum magis quàm ad pharmacopœum pertinent.

SECTIO QUINTA.

SECTIO quinta de antidotis seu electariis quorum materiæ ex omni medicamentorum simpliciũ genere petuntur. Hac formis quatuor præcipue parantur, sicca seu puluere, melle excepta, vel saccharo, vel alio humore.

Quoniam verò puluis horum est materia reliquarum trium formarum de puluere prius mihi fusius dicendum, quoniam hic varius fit modo, vt mox audies.

Vt autem planius intelligas, pauca quædam capita ex tritura ratione mihi sunt leuiter perstringenda, ne in compositionibus singulis hæc sint inculcanda.

Teruntur primùm radices acori, cyperi,
cof

costi,phu,gentianæ,glycyrrhi zæ,mei,zin-
giberis,& similia,& interdum coquuntur,
si electarium præsertim molle est futurum,
sed ante leuiter fractæ.

His mediocriter tritis semina fœniculi,
apii,petroselini,anisi,dauci,ameos,seseleos,
amomi,cardamomi,& similia adduntur.

Semina autem cucumeris,cucurbitæ,me-
lonis,citreoli,cnici,vt nuclei pinei,amygda-
læ inciduntur cultello per se,aut etiam sac-
charo pauco,ne pinguescant adiecto.

Posteà herbæ siccæ,cassia,cinnamomū,
aspalathum,calamus odoratus,caryophyl-
la,spica nardi,schœnuanthos.

Postremò flores rosarum,croci,epitymi,
forpicibus antè confecti.

Vuæ,daçtyli & similes fructus,vel per se
triti cernuntur impulsu manuum,aut cochlea-
ris,vt cassia,thamar Indi:vel secti cum sic-
cioribus teruntur.

Bdellium,opopanax,ammoniacum,opiū,
myrrha,vino,melle,vel alio humore sol-
uuntur,vel parua portione cum aliis ficcio-
ribus multis teruntur minutim prius secta,
sic os ordi cerui,rasura eboris.Turbith mo-
dice quassatum vbi erit in diaphœnico,ele-
ctario Indo vtroque & similibus,tunc sic-
ciora misceantur zingiber,piper & similia,
vt puluerari possit.Nam per se latefcit non

pulueratur si sit legitimum. Quæ industria scammonio, opio, & liquoribus, gummis, resinis terendo lateſcentibus confert: vel piſtillo & mortario calfactis illa ſiccare: ſed id multum virium à medicamento dig-
gerit.

Terenda prætereà tenuiſſime calida cū vrinas mouere ſtudemus, vt thymum, aſa-
rum, cuminum, vt in aurea, athanaſia, eſdra,
hæmagogo, diacurcuma, dialacca maiori-
bus E. aromatico: craſſius verò cum purga-
re ſtudemus, vt in antidoto hamech vtraq;,
in electario Indo maiore.

Per ſe teruntur rha barbarum, ſcammo-
nium, niſi quòd oleum amygdalarum dul-
cium vtrique à quibuſdam miſcetur, & po-
ſtrema miſcentur ac è propinquo, & clemen-
ter ne euolent, aut exhalent. Seorſum quo-
que thus maſculum, myrrha, maſtiche, ſuc-
cinum, gummi Arabicum, tragacantha, mo-
ſchus, caphura, ambra: ſed hæc tria ferè cum
pauca aqua roſarum, & poſtrema miſcentur
etiam è propinquo, qua ratione rha barba-
rum, & ſcammonium. Piora autem minu-
tim ſecta mortarium ſiccius poſtulant, vt
euphorbium, ſtyrax calamites, ſal gemma,
ſericum, anacardi etiam per ſe terantur.

Vniones, corallium vtrumque, lapidum
pretioſorum fragmenta in mortario lapi-
deo

deo vel æreo primum crassius teruntur, post-
eà super marmor, porphyrium, vel alium
lapidem durissimum ducentur, friantur,
affusa identidem pauca aqua rosarum, aut
buglossi.

Lemnia terra, ut bolus armenia per se est
friabilis, & humore aliquo soluta mox li-
quescit modo calcis.

Multa alia huc pertinentia ex modo
componendi theriacem scripto nobis. lib.
4. methodi medicamenta componendi pos-
sunt huc transferri, quale est illud quod
mortarium in quo prædicta omnia terun-
tur, & cætera alia præsertim præciosio-
ra, est tegendum etiam duobus opercu-
lis, ne quod est tenuissimum exhalet ac
evolet, eadem ratione quod iam est cre-
tum curiosè inuoluatur. Si electariis suc-
ci, vel humida alia ascribuntur, tollenda
sunt si hæc sicca & pulvere servaturus es
pyxidibus vitreis, ut ferè hodie fit si ve-
rò electarium formare libet molle, sunt
usui quæ forma veteribus magis placuit,
nam quæ hodie est electarii sicci, & solidi
forma, minus est usu frequens, nisi ad pala-
ti gratiam.

Si etiam dactylos, vuas, ficus recipit me-
dicamentum, tollantur, si pulverem vis, nisi
pauca cum magna siccorum copia puluerari

posse videantur, si autem electarium mole
conaris purgentur, secentur, terantur, cernā
tur, & aliis misceantur.

Si puluis ante electarii solidi compo-
sitionem amygdalas, strobilos, semina frigi-
da maiora, & similia recipit. Hæc vtendi &
electariū parandi tēpore misceātur, quia die
bus rancida fiunt, & compositum vitiant.

Pulueris vnc. vna, vel etiam drach. sex,
vni libræ sacchari ferè miscentur in electa-
rio solido: sunt qui parcius iniiciunt, non vt
grasius sit electarium, sed vt ipsis cōstet mi-
noris, præsertim cum pretiosa recipit, vt ele-
ctarium de gemmis, diambra exhilarans.

Pulueris verò vnc. 3. ferè tradūtur libræ
vni mellis despumati: sic tamen vt saccha-
rum, penidia, dactyli, amygdalæ, strobili, &
similia pulueris appellatione tunc non ve-
niant. Mel tamē crudū quadruplū omnium
puluerum miscet Mesues in antidoto dia-
moschu.

Cum verò pulueres miscentur, sit mel te-
pidum adeò, vt digitos admittat mel ipsum
vel fundū sartaginis quæ mortario vel alte-
rius manibus firmata sit oportet, quando pul-
ueres pistillo ligneo sunt commiscendi. Id
quod etiam seruandum est, si electarium so-
lidum es facturus, quod primū in offas ma-
zæ modo cogunt, deinde manibus & pistil-
lo

lo ligneo super papyrum puram complanāt
in flaminicæ placentæ figuram, mox cultel
lo fecant in bucellas, & tessellas, nunc rhom
boides, nunc quadratas, nūc triangulas (quas
lozengas vocant) nunc longiores digitorū
formas quas ob id manus Christi vulgus
vocat. Quibus prætereā pondus circumscri
bunt, vt drach. vnus vel plurium.

Porrò in antidotis mollibus, vt catholi
co, diapruno, antidoto, hamech cum cassia
& thamar Indi, cum humore aliquo soluta
cernuntur, thamar Indi ante per horam sunt
macerandi quam cernantur, vtraque verò
antequam soluatur, humor est pendendus,
vt intelligas an cum eo pondus iustum tha
mar Indorum & cassia postquam creuisti, re
tinueris. Eodē modo in manna & aliis eius
dem generis, quod etiam in pilulis seruandū
audies, dum lachrymas humore solutas cer
nes, aut colabis.

*Antidotus diambra Mesuæ recipit cinnamo
mi, daronici, caryophyllorum, macis, nucis mo
schatæ, folij, galangæ ana drach. tres spicæ nar
di, cardamomi maioris, & minoris ana drach.
unam, zingiberis drach. unam, & semissem, san
tali flauī, ligni aloës, piperis longi ana drach.
duas, ambre aureum unum, moschi drach. dimi
diam. Ant. de gemmis Mesuæ recipit fragmen*

torum saphyri, hyacinthi, sardinis, granatorum,
 smaragdi ana drach. unam & semissem, zedoa-
 rie, doronici, macis, corticis citri, sem. ocymi ca-
 ryophyllati, ana drach. duas, coralli rubri. succi
 ni, limaturæ eboris ana script. duo been albi &
 rubri, caryophyllorum, zingiberis, piperis lon-
 gi, spicæ, folij, croci, cardamomi minoris ana
 drach. unam, trocischorū, diarhodon, ligni aloës,
 ana drach. quinque, cinnamomi, galangæ, zurum
 bet ana drach. unam & semissem, foliorum ar-
 genti & auri ana aureum dimidium, moschi bo-
 ni drach. semissem, ambra drach. duas.

Ambra moschus per se terantur, coralliū
 & pretiosi lapides, aut per se singuli, aut o-
 mnes simul quo dixi modo, cætera simulte
 renda, sed ordine seruato.

Ant. exhilarans Galeno ascripta recipit a-
 pud Nicolaum, succi pomorum dulcium & odori-
 ferorum. succi cydoniorum, succi florum borragi-
 nis, *florum basilici.

*seminis
 alijs.

Vini ueteris

Croci, macis, zedoariæ.

Xylobalsami, caryophyllorum.

Corticis citri, galangæ.

Nucis moschatae, styracis cala-
 mite.

} ana drach.
 } quinque.

Ca

Caphura, ambra, moschi ana drac. unā, anisi,
 thymi, pithymi, rasura eboris ana drach. duas,
 margaritarum, ossis à corde cerui ana drach.
 unam, auri & argenti puri ana scrip. unum, sac-
 chari quantum sufficit.

Antidotum hanc non esse Galeni plane
 conuincunt macis, zedoaria, caryophylla,
 galanga, moscho cariō, caphura, ambra, mo-
 schus, simplicia Galeno ignorata, & ebur,
 margaritæ, os à corde cerui, aurum, argen-
 tum, saccharum, sumi nondum cœpta Gale-
 ni seculo, aut saltem infrequentia. Saccharū
 cum succis coquendum, cui percocto & re-
 frigerato pulueres miscendi sunt.

Sacch. lib. 7. in aqua dissolutæ & coctæ,
 additis ad postremum his succis coquantur
 quantum satis est ad comprehendēdas vn-
 cias circiter septem huius pulueris. Electa-
 rium lætificans Nicolai Alexādrini ab hoc
 est diuersissimum.

Hi pulueres tres antidotorum præcipuè
 nobis sunt in vsu, quamuis Mesue & Nico-
 lao humore aliquo excipiantur in electariū
 molle, vt nobis tempore vtendi in ele-
 ctarium solidum saccharo per humorem
 idoneum, sed paucum soluto percocto, vt
 pulueris vnc. vna habeat sacch. vnc. 12. vel
 pul. horum iuribus & cōdimentis miscetur.

Præ

Præter hos autem alii, quia vſu rari à nobis conſultò prætermittuntur, præſertim ea fuſius in Meſue & Nicolao interpretatis, unde poterit pharmacopœus corrogare, ſi quâdo parare imperetur. Tales ſunt antidotus diacalaminthæ, diatrion pipereon, diſpoliticum, diahyſſopum, diaſennæ, diaco-

Ponderibus uariat ſtum, diairis Salomonis, diapenidion, diacomeron, diatragacanthũ calidum, diamargariton calidum, alia eius generis permulta.

Nicolaus Alexãdri nus, ex quo Salernitanus ſcri- Nunc de antidotis dicendum quæ ob id opiata vocantur, quod harum multæ opium recipiunt, quibus aliæ conſiſtentia ſimiles nomen idem vulgo ſunt ſortitæ.

poſit, nec Galeni me Antidotum catholicum Nicolai, Galeni ſcriptum, recipit folliculorum ſennæ, caſſiæ fiſtulinæ purgatæ, thamar Indorum ana unc. octo, rha

recentes barbari, uiolarum, polypodij, aniſi ana unc. quatuor, glycyrrhizæ, raſæ, penidtorum, ſacchari cantum humi deſacti ana drac. quatuor, ſeminum quatuor frigiditas ex- gidorum, purgatorum ana unciam unam. Polycremento- podij alterius lib. unam, tritam, in aqua coqueſa exhala diu, colatum percoque in ſyrupum cum libris octo rit aquæ ſacchari. Caſſiã & thamar Indos in colati parte libris 12. diſſolue, cola, ſyrupo iam percocto adde, poſtre- ad lib. 4. mo pulueres adijce.

cõſumptio nem. Senna, polypodiũ, glycyrrhiza, aniſum, violæ ſimul terantur, rha barbarum per ſe

*ſe

* Nihil tamen tenuiss. quia purgatorium est medicamentum

* semina. 4. frigida maiora excorticata scalpello minutim concidantur cum saccharo & penidiis. ne pinguescant. Cassia & si recentes sunt thamar Indi per se cernantur potius, quam cum decocti portione solvantur, ne sint ad accepti humoris consumptionem coquenda. * Vbi ex decocto polypodii syrupus erit percoctus, & ab igne depositus, iam modicè refrixerit, cassia & thamar Indi creta parte syrupi dissoluantur, mox syrupo misceantur, postea pulvis prædictorum, postremò rha barbarum & concisa semina paulatim addantur pistillo ligneo probè permiscendo. Si verò cassiam & thamar Indos decocti portione, vt vnc. duabus solueris & colaris, probè percocto ipsi syrupo misceantur, vt coctione acceptum humorem deponant. Hodie sunt qui delicatius, & efficacius componunt, sed sumptuosius, sennæ enim vnc. sexdecim in libris quatuor, rha barbari vnc. octo, in libra dimidia decoctis radicis polypodii infundunt, sennæ expressum cum sacch. coquunt in electarii prope consistentiam, expressum rha barbari miscent paulatim extra ignem, deinde cassiam thamar Indos creta & pulueres,

non ureticum.

* Si uerò thamar Indi decocto soluantur & cernuntur, id penedum, ut intelligas si cretorii thamar Indos pon- dus quasi- tu habes. Diadama scenon dici- tur Nico- lao Alexā drino & uiridia da- mascena eligit.

Diaprunum simplex Nicolai recipit pruna

Da

Damascena matura centum. Hæc aqua ad dissolutionem percocta ubi modicè refrixerunt, exempta inde & manibus confricata per cribrum cernuntur, cortices & ossa abijciuntur. Aqua

* & cola- hæc cum dimidia uncia uiolarum recocta * cum ta. sacchari libris duabus in syrupum percoquitur

Vel potius addendo pulpæ prunorum prædictæ libram unā.

si potes si- Hæc ubi coquendo crassescere incipient, cassiæ ne humore recenter extractæ, thamar Indorum ana uncia

cernendo una in portione parua prædictæ aquæ dissoluatur, coletur, admisceatur, semper spatula mo-

ut in catho uendo, dum perfectè omnia hæc erunt cocta, au-

lico dixi. fer igni & adde spatula semper miscendo puluerem sequentem santali albi, & rubri, spodiij,

rha barbari ana drach. tres: rosarum, uiolarum, seminis portulacæ, intybi, oxyacanthæ, succi gly-

cyrrhizæ, tragacanthi ana drach. duas: quatuor seminum frigidorum maiorum purgatorum

ana drachmam unam. Si uerò purgatorium uis medicamentum ab igne ubi abstuleris, adde

Nicolaus alexandri. scammonij præparati unc. dimidiam in libras

drach. 7. singulas.

in lib. singulas mi-

scet. Sunt qui scammonii drach. sex, alii vnam ciani vnam miscent libris singulis, sicque ne-

scientibus medicis imponūt, fit enim, vt medicamentum valentius purget, quod tamen clementius existimabat medicus instituisse

An

Ant. diaphœnicon Mesuæ recipit phœnicon
 cirrhon, id est dactylorum fuluorum aceto per
 triduum maceratorum partes centum, peni-
 dorum cum aqua hordei coctorum partes
 quadraginta, turbiti partes triginta quin-
 que, amygdalarum purgatarum partes tri-
 ginta, scammoni partes duodecim: rin-
 giberis, piperis longi, cinnamomi, macis, ga-
 lange, ligni aloës, foliorum rutæ siccorum,
 anisi, fœniculi, dauci ana partes duas & semis-
 sem. Probè trita hæc omnia melle despumato
 excipiantur. Lib. tribus

Dactyli intus & foris purgati quo sunt *nam lar
 sicciore, eò diutius & largiore aceto sunt gius antè
 macerandi, quo recentiores & humidiores, trituram
 minus diu & parciore aceto macerentur. effunden-
 Quin si præhumidi sunt citra macerationē dum facul
 teri possunt aceto pauco interim affuso: fe- tatis dacty
 rè autem nobis sunt passi, purgati igitur, & lorum ali
 particulatim secti aceto parciore* sine igni quid secum
 maceretur, triduo in vase filiceo, vel vitria trahit.
 to tecto, pistillo ligneo in mortario lapi-
 deo curiosè terantur, manu cernantur per
 cribrum setaceum, vel stamen, vel reliquæ
 pelliculæ eximantur. Potes cum his amy-
 gdalas depellatas terere & cernere, aut cul-
 tello minutim concidere, uti & nucleos pi-
 neos (quos nonnulli penidiorū loco adhibēt)
 sed

sed cum culpa dactylorum ad acetum consumptionem sit parum coquenda amygdalæ pinguescerent, ob id melius inciduntur & cum puluere reliquo miscentur. Mellis lib. sex aqua dupla despumata dum aqua consumpta ad libras tres* redierint, & cydoniati liquidi consistentiam habeant, dactylos misce, parum diu coque, ut acetum exhalet. Quidam saccharo excipiunt in electarium solidum, ut & diacnicum bene tamen coquatur, & loco siccior reponatur, ne rancidum fiat. Nicolai Alexandrini diaphœnicon carni dactylorum drac. centum recipit, cætera multum ab hoc diuersum est.

* sunt enim pulueris uncie nouem si drac. partem accipis.

Ant. hamech apud Mesuen, recipit myrobalanorum flauarum unc. quatuor, cepularum Indarum, rha barbariana drachmas duas, agarici, colocynthidos, polypodij querniana drac. sexdecim, absinthij, thymi, sennæ ana unc. unam uio larum drach. quindecim, epithymi unc. duas, anisi, rosarum, fœniculi ana drach. sex, succi fumarie lib. unam, pruna numero sexaginta, uuarum purgatarum unc. sex, macera omnia sero lactis dies quinque in uase uitreato, oris angusti, obturati.

Hodie me Post hos semel feruefac, cola, in colato dissolue lius expres cassie fistule purgate unc. quatuor, thamar Insu cum sac dorum unc. quinque, manne unc. duas, frica saccharo in synibus, iterum cola, colato adde sacchari lib.

una

unam & dimidiam, scammonij unc. unam & di-
midiam, coque ad mellis crassitudinem, tunc pau-
latim puluerem hunc insperge. Myrobalano-
rum flauarum, cepularum Indarum ana unc. di-
midiam, bellericarum, emblicarum, rha barba-
ri, seminis fumarie ana drach. tres, seminis ani-
si, spice nardi, ana drach. duas.

rup. per co-
quitur &
refrigera-
to miscen-
tur cassia
& thamar
indi crete

Polypodium, senna, myrobalani, anisum
crassiuscule terantur, agaricum raptim minua-
tur, colocynthis, rosæ, thymus, epithymus,
absynthium, minutè forpicibus incidantur, & scam-
monium cultello: vel forcipe in taleo-
las, pruna, vuæ intus purgentur: violæ inte-
græ, agaricū, rha barbarū, colocynthis cum
cæteris: quinque dies macerentur succo fu-
marie, residetia, & insolatu etiam post vnā
feruefactionem purgato, & sero lactis cola-
to quātum omnia tegat, vt libris tribus: sed
agaricum, & colocynthidem nodulo ligare
præstiterit. Sexto die id totum leuiter co-
quatur, coletur mediocriter exprimendo.
(Fortis enim expressio ex materia illa ma-
cerando & coquendo velut putrefacta ter-
reum quoque extrahet.) Colati portione
idonea dissolutā cassiam & thamar Indos,
alia portiuncula mannam cocto ex reliqua
colati parte syrupo, cum sacchari lib. vna &
dimidia misce minimum coque: his enim

cum parte
decocti,
postea pēsi
& scam-
monium co-
ctum.

coctio longior, aut vehementior vires adi-
mit, quapropter ne omnino coquantur, qui-
dam sine humore purgatam cassiam, & tha-
mar Indos percocto & tepenti syrupo mi-
scent, quo scilicet tempore adduntur pul-
ueres aliorum & scammonium coctum. Se-
rum sit lactis caprini recēs mulcti, & in rem
præsentem coagulati immisso semine car-
dii beatae Mariæ confracto. Eius feri lib.
sex semel feruefiant, albuminibus duobus
purgentur: vbi refrixerint, colentur: aut si
celerandum est, ter colabis etiam calidum.
Caprae autem nigrae, & ex cornis serum hîc
quidam expetunt, vt lacpractici ad calculû
frangendum.

*Ant. benedicta Nicolai recipit turbith ele-
sti, sacchari ana drachm. decem, scammonij co-
sti, hermodiactylorum rosarum ana drachmas
quinque, caryophyllorû, spice nardi, zingiberis,
croci, saxifragiæ, macropiperis, anomi, carda-
moni, seminis apiij. salis gemmæ, galangæ, macis,
cari, fœniculi, sem. asparagi, rusci, lithospermi
ana drac. unam, mellis quantum sufficit.*

Turbith, scammonium, hermodiactylos
trita negligentius, vt purgent magis: reli-
qua tenuius, vt in corpus magis ferantur, ex
triturae disciplina rectè quidâ volunt. Tur-
bith, esulæ, sacchari ana drach. decem, scam-
mo

monii drachm. quinque, quædam exemplaria habent, cum etula in Nicolao Alexandrino taceatur, in eodem scribitur turbith saccharique ana drach. viginti, scammonii drach. decem, sed reliquorum omnium ana drach. duæ, quæ pondera omnia dimidio diminuit Nicolaus Salernitanus, sunt qui etiam scammonii drach. duas, alii drach. duas & semissem miscent.

Hierapicra, id est sacra amara Galeni, recipit cinnamomi, mastiches, asari, spice nardi, xylobalsami, croci ana drach. sex: aloës drach. centum, mellis quantum sufficit.

Sic Galenus Romæ componi solitam suo tempore scribit: & aloën, nunc lotam, nunc illotam, nunc largiorem, nunc parciorē miscendam pro variis medicorum scopis: & croci sufficere drach. quinque. Plura de hac antidoto leges in Mesue.

Ant. hiera diacolocynthidos Practij recipit stæchados, marrubij, chamedryos, agarici, colocynthidos ana drachmas decem, opopanax, sagapeni, petroselini, aristolochiæ rotundæ: piperis albi ana drachmas quinque, cinnamomi, spice nardi, myrrhæ, polij, croci, ana drach. quatuor. Opopanax & sagapenū mortario terantur adiecto melle tenui, id est quā liquidissimo: trita cætera & cribrata melle ad comprehendendū sufficienti excipiuntur.

Scribo-
nius lar-
gus.

Quæ ad hanc hieram hodie celebrari cœptam magno mortalium commo do pertinent, fuissimè in Mesue docuimus. Si puluerem & siccam hieram cupis, liquores fractos purgatos aliis particulatim iniectos, cum his puluerantur. Si autem vis electarium molle, liquidissimo melle dissoluti colantur.

Ant. Philonis recipit piperis albi, hyoscyami albi ana drach. uiginti, opij drach. decem, croci drach. quinque, spicæ, pyrethri, castorij ana drachmam unam, mellis despumati quadruplo omnium excipe. Addunt aliqui moschi scriptulum unum.

De philonio Romano & Persico lege Mesuen, mihi satis est hæc veterum descriptio. In hac antidoto pulueris vncie tres mellis libr. singulis miscentur, vt in aliis plurimis, à Philone Iudeo philosopho Platónico doctissimo, vt scribit Nicolaus Alexandrinus, dicta.

Ant. de baccis lauri Rasi recipit foliorum ruta siccorum drach. decem, seminis ameos, cumini, melanthij, ligustici, origani, cari, dauci, amygdalarum amararum, piperis nigri & longi, mentastri, acori baccharu lauri, castorij ana drach. duas, opopanacis drachm. tres, sagapeni drachm. quatuor, mellis cocti pondus omnium, tritis terendis fac electarium molle.

Ho

Hoc electarium pilularum consistentiam habebit ex tam paucō melle, nisi sagapenū & opopanax alio melle liquidissimo dissoluantur & colentur, vt in hiera diacolocynridos. Hodie mel pulueribus quadruplum miscent, sed puluerum nomine opopanaxem & sagapenum non censent, sic est gratius, sed imbecillius.

E. diacnicū Arnaldi uillanouani recipit pul. Diacar-
E. diatragacanthi frigidi unc. semissem, carnium thami-
 cydoniorum unc. unam, medullæ cnici, hermodactylorum ana drachmas quatuor, zingiberis albi drachmas duas, scammonij cocti drachmas tres, turbiti albi drach. sex, mannæ, granatæ drach. duas, mellis rosati colati unc. unā, sacchari unc. octo cum saccharo sufficienti fiat electarium.

Caro cydoniorum siue cydonia in partes. 4. plures pauciores diuisa, & vt sunt integra saccharo condita terantur, & per stamen colentur, cuius loco si cum nostratibus cydoniatum capias in drach. eius duabus vna erit sacchari, aut mellis drach. vel etiam largius. Tunc verò id vt manna melle rosato soluta colatur per stamen, semen cnici ex-corticatum, vel inciditur, vel cum saccharo teritur, & pulueri turbiti, hermodactylorum & zingib. simul tritorum miscetur,

scammonium verò per se. Vbi saccharum paulò vltra quàm electario conuenit est coctum, (quia liquida mox addenda ipsum vt sic dicam recrudabunt) adde cydoniũ, mannam, mel rosatum simul trita & colata. Sũt qui pul. diatragacanthi omittunt, & cydoniatum cum melle subactum immittunt in sacchari lib. vnã percoctam cum aquæ vnciis 4. vel sex, si impurius est saccharum, & ob id despumandum, postea pulueres reliquos. Alii aliter.

Elec. de succo rosarum Nicolai recipit sacchari, succi rosarum rubrarum perfectarum ana lib. vnã uncias quatuor santalorum alborum & rubrorum & citreorum, ana drachmas sex, spodij drach. tres, scammonij cocti drach. duodecim, caphuræ script. unum, ad excipiendum, succus cum saccharo in syrupum percoquatur.

Cui misce santala & spodium puluerata, postremò scammonium & caphuram, vtrũque per se tritum.

Cum Mesuæ sit solenne vnciis singulis compositionum scammoniatarũ dare scammonii cocti circiter scriptulum vnum, hũc Nicolaus dat propemodum scriptula duo, ob id rectè quibusdam videtur scammonii drach. octo, huic composita sufficere, tamẽ etiã drach. duodecim scribit Nicolaus Alexand

xandrinus cap. 309. lib. de cōpositione medicamentorum secundum locos, ex quo Nicolaus Salernitanus & alter Nicolaus prae-positus sua descripserunt. Succo partiori cōmodius fieret. Alii etiam componunt E. rosatum colagogum Mesuæ.

E. diarhodon abbatis Nicolai recipit, santali albi & rubri ana drachmas duas & semissem, tragacanthi, gummi arabici, spodij ana scriptula duo, asari, mastiches, spice nardi, cardamomi, succi glycyrrhizæ, croci, xylalbës, caryophyllorum, galliæ moschatæ, anisi, marathri, cinnamomi, rha barbari, seminis basilici, oxyacanthes, cichorij, portulacæ, cucurbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, ana scriptulum unum, margaritarum, ossis à corde cerui ana scriptulum dimidium, sacchari candefacti, rosarum ana unciam unam, drach. tres, caphuræ grana septem, moschi grana tria & dimidium, confice cum syrupo facto ex aqua rosarum.

Pulvis huius vt aliorū vitrea pyxide operculata seruatur, & vtēdi tempore excipitur syrupo rosato percocto. Vel sacchari delecti lib. vna dissoluitur, lib. dimidia aquæ ex rosis albis recentibus destillatæ, vel rosarū siccarū decocti, vel succi rosarū rubrarum recentiū, & coquitur ad iustam crassitiem.

Vbi refrigerando iam multum concreuit, pulueris prædicti drach. sex iniiciuntur, raro plures: & curiosè pistillo ligneo, vt prædixi, miscentur: semina quia citò rancescunt & cætera corrumpunt, misce tantum vten- di tempore. Moschum plerisque abomi- nabilem, & cephalagicum, ne misce, vt ne- que caphuram, nisi doctus est medicus qui imperet.

E. aromaticum rosatum Gabrielis apud Me- suen recipit rosarum rub. drachmas quatuorde- cim, glycyrrhizæ rasæ drachmas septem, ligni aloës, santali flauī ana drach. tres, cinnamomi drachmas quinque, macis, caryophyllorum ana drachmas duas & semissem, gummi Arabici, tra- gacanthi ana drachmas duas, & partes duas drachmæ unius, nucis moschatae, cardamomi ma- ioris, galangæ una drach. unam, spicæ nardi, am- bræ cineritiæ ana script. duo, moschi scriptulum unum, syrupi rosati quantum sufficit.

E. diamargariton frigidum recipit santalo- rum omnium florum uiolarum, seminis melonum excorticati, trocischorum diarbodon ana drach. duas s. rici crudi ossis à corde cerui, spodij, doro- nici Romani, been albi & rubri, spicæ nardi, cro- ci ana scriptula duo, margaritarum integrarum & pertusarum, rasuræ eboris, saphyrorum, bya-
cin

cinthorum, smaragdorum, iaspidium uiridium, ligni aloës, seminis intybi & oxalydis, ambraë cineritiæ ana drachmam semissem, auri optimi drachmam unam, caphura scriptulum unum, moschi grana duo.

Aliter Nicolao, aliter aliis, sed hoc nobis est in usu frequentiore.

E. diatrion sanalon Nicolai recipit, santali albi, rubri, flauī, rosarū, psyllij ana solidos duos, rha barbari, spodij, succi glycyrrhizæ, seminis portulacæ, ana solidum unū & dimidium, amyli, gummi Arabici, tragacanthi, seminis melonis, citreoli, cucumeris, cucurbite, cichorij domestici ana solidum unum, caphura scriptulum unū & dimidium, syrupi rosati quantum sufficit, aliq pondus rosarum quadruplum miscent.

Dimidium est descriptionis Nicolai Alexandrini, nisi quod saccharū habet pro psyllio, & cichorii domestici non meminit loco syrupi: fit cum saccharo in aqua cōmuni aut rosata soluto.

E. Diatrageacanthon frigidum Nicolai recipit, tragacanthi albi unc. duas, gummi arabici unc. unam, drachmas duas, amyli unc. unam, penidiorum uncias tres, glycyrrhizæ, seminū melonis, cucurbite, cucumeris, citreoli ana drachmas duas, caphura scriptuli semissem, syrupi uio-

lati, aut iulepi uiolati quantum sufficit.

Saccharo aqua communi, vel rosata soluto excipitur hodie.

E. Diarhis simplex Mesue recipit radicis iris dis unc. semissem, sacchari candefacti. E. diatragacanthi frigidi ana drachmas duas.

Saccharum aliud aqua rosarum soluitur ad hæc comprehendenda, libræ autem vni sacchari vnciam pulueris vnam capiēti dum refrigeratur, si albumen oui vnus vel potius succi limonum vnc. duæ, fortiter & diu misceas, vtrunque hoc electarium euadet longè albissimum. Sacchari vnc. vna, aqua rosarum soluta, cum margaritarum pul. tenuissimi drach. vna, fit manus Christi perla ta vulgò dicta.

SECTIO SEXTA

de pilulis.

MEDICAMENTVM cur forma pilularum fingatur interdum, abundè diximus in Mesue, initio sectionis sextæ: hoc autem loco dicenda sunt quæ ad modum pilulas seu potius pilularum offas & magdalias componendi pertinent. Vel electaria humore aliquo egebant comprehendi præsertim mollia, sic & pilulæ, & trocisci. Is autem est magna parte mel despumatū vel
ros

rosatum, syrupus rosatus vel similis, interdum muccago tragacanthi, ita ut omnino sit glutinosum, quod pilulas debet comprehendere, ut melius velut in mazam misceantur, & mista cohæreant, ac ne simplicium facultas promptè exhalet, si ossa siccitate interhiet, sed intus probè conclusa melius firmetur. Ob eā causam quas pilularum species aqua, aut succo vult comprehendere Mesues aut Nicolaus, hodie nos excipimus melle, in quo succus hic ad sui consumptionē sit percoctus. Quod succo cōprehensæ non cohærent, sed hordeacei, aut furfuracei panis modo promptè friantur, mox siccantur, & canescunt firumque ducunt putredinis indicē & autorem. Ob eam rem videtur Nicolaus pilulas sine quibus, fœniculi succo exceptas manibus oleo rosato, aut communi inunctis formari, & nos alutam, aut pergamenam ossæ inuoluendæ debitam oleo quoque oblinimus.

Si tamen in vsum præsentem fiant pilulæ, possunt succo excipi, quod in multis videntur scriptores innuisse, dum ciceris scilicet orobei, aut orobi, aut piperis magnitudine pilulas formandas imperant. Est tamen quando succi emplasticam efficiunt materiam, quando scilicet his emplastica alia solvuntur, ut aloë, scammonium,
sag

sagapenum, ammoniacum, gummiarabicum, tragacatha. Tunc etiam pilularum massam rectè cōprehenderint. Omnia in pilulis crassius terenda quā in electariis, nisi quod utrobique lapides pretiosi, & congeneria tenuissimè sunt pulueranda, & colocynthis, ne partes quas permeat vlceret.

Quæ verò lachrymæ, siue liquores suis, siue gūmi, siue resinæ, si sunt adhuc molliculæ, pistillo calido, in mortario calido terentur & puluerabūtur, aut humore idoneo dissoluetur, vt alia capiāt. De succis recentibus iam diximus, de siccatis seu sapis idē iudiciū quod de lachrymis, interdū tamē prædictæ lachrymæ, si puræ sunt, pistillo calido in mortario calido humore pauco superdato subiguntur, fiuntq; idoneæ pulueribus aliis comprehendendis, vt in pilulis foetidis, sagapeni & similibus. Si autem sint impuræ, dissoluitur humore quæsito, colantur, coquuntur ad humoris consumptionem, pulueres tunc adduntur & permiscuntur.

Magdalia seu offa, seu massa inuoluitur, vbi siccata est quantum satis est, aluta, alba, potius quā rubra, vt vires illas infectricū materialium pilulæ in se non trahant, aut pergamena, sed vtraque, oleo rosato, aut cōmuni est ante subigēda, vt massam diu mollem seruet & transpirare vires eius prohibea

beat, obstructis oleo emplastico poris, non tamen ita quin humiditas, si qua adhuc superest excrementosa digeratur. In vsum autem non veniant pilulæ si potes, nisi iam fermentatæ, non tamen vetustate exuccæ, & exanimatæ: sed nec ita molles, vt in ore diffuant, sed consistentia mediocri fiant, aut plures, pauciores, maiores, minores pro eius, qui sumit natura, & aliis medici scopis. Si autem deuorare nequit, minimæ fiant, & syrupo aliquo inuolutæ cochleari aliquo simul deuorentur. Alii ne ingratum earum saporem percipiant, syrupo remollitas saccharo tegunt, alii foliis auri æquius, quàm nonnulli membrana prunorum, aut vuarum, aut cerato liquido. Nam carne prunorum, aut pomorum coctorum inuolui non magis prohibeo, quàm pane missali in vinum merso. Os quoque ante & post ablui potest vino, aqua, alio, vt lingua hoc imbuta saporem tetrum non sentiat: & si quid ei hæserit, tergeatur, potest etiam vini loco pomi buccellam mandere & succum deglutire, aut aliud aliquid iucundum præsertim astringens. Sunt quoque qui os vino vel alio implent, & pilulam ori immittunt, cum vino illo deuorandum, idque toties repetunt, donec omnes deuorarint: quod ad celeriore pilularum actionē facit, nō ad diuturniorē,
&

& ventriculum lædi pilularum præsertim durarum contactu vetat, & quibus friget ventriculus confert, vt quibus is aut hepar insigniter calet, cum ptissana, vel humore alio deuorari possunt, manus etiam ligare, & eas ac nares aceto, aut frigida aut oxycrato madefacere est vtile. Quæ præcepta sunt communia etiã his qui medicamenta alia quauis forma sumperint, quando vomitus eorum timetur, Et præter hæc alia multa doctè à Mesue descripta libro primò.

Pilulæ aureæ Nicolai recipiunt aloës, scāmōnii cocti ana drach. quinque, rosariū, seminis apij ana drachmas duas, & semissem, anisi, feniculi, mastiches ana drach. unam, & semissem, croci, pulpæ colocynthidos ana drachmam unam, cum aqua infusionis tragacanthi fac massam.

Tragacanthi drach. vna aquæ vnc. duabus maceretur ad dissolutionem super cineres calidos coletur panno raro: hac muccagine paulatim affusa cōprehende pulueres, hodie tamē syrupo vel melle rosato cōprehendūt omīssa tragacātha, neq; mea sentētia in foeliciter, aloë, scāmōniū, colocynthi, mastiche seorsum quo sepe dixi modo terētur, simul autem semina, rosæ, crocus, ambo hæc prius minutim concisa dimidium est compositionis Nicolai Alexandrini, in quo etiã
ma

mastiche non scribitur.

Pilule coctie Rasis & Mesue recipiunt, pulueris hieræpicæ Galeni drach. decem, colocynthidis drachmas tres, & scriptulum unum, scammonij drach. duas & semissem, turbith, stœchados ana drach. quinque.

Syrupo vel melle rosato excipe, turbith, & stœchas simul teruntur, cernantur. Nam stœchas ægre teritur licet florulenta sit, nisi inter papyros siccetur, antè, quomodo etiã vis eius facilè exhalat.

Alij ex Nicolao Galeni coctia sic parant, aloës, absynthij, colocynthidos, scammonij ana partem unam, mastiches partem dimidiam, cum succo scniculi uel absynthij, uel solani, forma massam.

pil. Gal.

ex aloë li.

i. c. ph. p.

Nicolaus Alexandrinus Galeni non meminit, & vocat pilulas diacolocynthidos, hisque miscet aloës, scammonij cocti ana drachmas quatuor, colocynthidos, mastiches ana drachmas duas, bdellij drachmā vnā cum succo absynthij fac orobea catapotia.

Pilule sine quibus esse nullo apud Nicolaū recipiunt, aloës lote drachmas quatuordecim, mirebalanorum, flauarū, cepularum, bellericariū, emblicarū, Indarū, rha barbari, mastiches, absynthij, rosarum, uiolarum, senne, agarici, cassiubæ ana drach. unā. Tēperentur scammonij bene trite &

In Nico-

lao Alexā

drino non

inuenio.

pu

puluerata drachma sex & dimidia succo fœniculi, quantus scammonio per pannum colando, & pulueribus alijs ad pilulas comprehendendas sufficere uidebitur, quæ manibus unctis oleo uiolato uel communi, sed arte dicta loto formentur.

Senna myrobalani, absynthium, rosæ, violæ, casuptha simul: rha barbarum, aloë, scammonium, mastiche per se puluerentur, licet autem succo fœniculi purgato parua coctione & residentia, in quo dissolutum sit scammonium comprehendere possint, tamen ferè scammonium per se tritum & cretum alijs pulueribus miscent, omnesque simul mistos excipiunt melle, cum quo succus fœniculi coquendo sit consumptus.

Succus ab
synthij sic-
catus ho-
die nõ ser-
uatur, i-
gne tamen
in re præ-
sentẽ sicce-
tur.

Pilule rha barbari Mesuæ, recipiunt rha barbari drachmas tres, succi glycyrrhizæ, succi absynthij, mastiches ana drachmam unam, myrobalanorum flauarum drachmas duas & semissem, seminis apij, fœniculi ana drachmam semissem, trocischorum diarhodon drachmas tres & semissem, hiere pieræ drachmas decem, formatur.

Hi troci-

chi ex

Succus fœniculi, hîc ut in alijs cum melle Mesu. se- coquendo est consumendus, myrobalani, & aloë 7 re succi concisi simul terenda, rha barbarum, petendi. mastiche, trocischij per se.

Pil

Pilule aromaticæ Mesuæ, recipiunt cinna- Elephagi-
 momi, cubebæ, ligni aloës, calami aromatici, manæ aqua
 cis, nucis moschatæ, cardamomi, caryophyllorum, sextupla.
 asari, mastiches, schœnuath, spica, carpobalsami Mesuæ in
 ana ucciam unam, absynthij sicci rosarum ana aloë.
 drachmas quinque, trita crassius coque ex aquæ * Aloës
 libris duodecim ad partium duarum cōsumptio- unc. sex
 nem, frica, cola, exprime. Expressi huius libris seu seli-
 duabus macera libram unam aloës, prius aqua bræ dat
 pluuiæ sæpe lotam & siccata tribula, sicca. Illi ibidē ex-
 misce myrrhæ, mastiches ana drachmas quinque, pressi lib.
 croci drachmas * tres, omnia macera, reliquo unā, ergo
 expresso, tribula, sicca. aloës unc.

Siccatur aloë primum in umbra, post in 12. seu lib.
 sole Mesuæ cap. de aloë. Hæc verò omnia, rectè dat
 vel seorsum quassanda, vel dura crassa cum expressi
 duris crassis, mollia tenuia cum mollibus te lib. 2. unc.
 nuibus, postea in aquā mittenda omnia hæc semissem.
 tantum confracta, vt promptius aqua per- Mes. ibi-
 meet, & vires ipsorum in se trahat, maceran dem.
 tur, igni lento coquuntur ex aquæ libris octo
 ad dimidias (nam tam larga aqua longā po
 stulat coctionem, quæ his aromatibus vires
 aut minuit aut adimit) reliquarum quatuor
 librarū dimidium aloë primum per se ebi-
 bet, prius tamen aqua fontana lota & sicca-
 ta, reliquum dimidium cum puluere tenuis-
 simo myrrhæ, mastiches, croci semel aut po

A

tius paulatim cōbibet eadem aloë, & priusquam siccetur, massa fingatur, æstate potius fiant, quàm parte anni alia, vt prōptius siccetur aloë.

Pilule lucis maiores Mesue, recipiunt rosarum, uiolarum absynthij, turbith, colocynthidos, cubebarum, calami aromatici, nucis moschate, spicæ, epithymi, carpobalsami, xylobalsami, schænuanthi, mastiches, asari, caryophyllorum, cinnamomi, cassiæ, croci, seminis rutæ, anisi, apij, fœniculi ana drach. duas, myrobalanorum quinque, rba barbari ana drachm. quatuor, agarici, sennæ ana drach. quinque, *euphrasie drach. semptem, aloës bonæ pondus omnium, excipe succo fœniculi.

* Surculi summi cū floribus siccati.

Colocynthis, agaricū, aloë, mastiche per se terantur: cætera simul misce omnia & cōprehende melle cocto, cum succo fœniculi ad ipsius cōsumptionem, seu donec mel valde glutinosum euaserit.

Pilule scatiidæ maiores Mesue recipiunt sagapeni, ammoniaci, opopanax, bdellij, colocynthidos * rutæ agreßis, aloës, epithymi ana drachmas quinque, hermodactylorū, esule ana drachmas duas, scammonij drachmas tres, cinnamomi, spicæ croci, castorij ana drachmam unam, turbith drachmas quatuor, zingiberis drachmam unam & semissem, euphorbij drach. unius partes du

* Eius pœnuria horrejem substituimus siccam.

duas, dissolue lachrymas succo porri, & colato Mesues. comprehende omnia.

Liquores quatuor primi succo porri calfacto dissoluti & colati, coquuntur ad consumptionem multi succi, deinde cætera mista comprehendunt. Scamoniū tñ & euphorbiū liquores per se puluerantur, nisi recentia sunt, & mollia: talia enim etiam dissolui possunt.

Pilulæ de hermodactylis maiores, recipiunt hermodactylorum, aloës, turbit, colocynthidos, myrobalanorum flauarum, bdellij mollis, sagapeni ana drachmas sex, opopanacis, euphorbij, sarcocollæ, castorij, rutæ agrestis, apij ana drachmas tres, croci drachmas duas & semissem, comprehende succo brassicæ.

Melle cui incoctus sit hic succus excipiuntur omnia hæc puluerata: nam etiam puluerari possunt hi liquores pauci & sicciore cū multis siccis: vel potius ut prius, liquores hi succo brassicæ calfacto soluti, colati, recocti omnia alia comprehendant.

Pilulæ arthriticæ Nicolao recipiunt hermodactylorum, turbit, agarici ana drachm. quatuor, ris cinna-
* cassiæ lignæ, spicæ, caryophyllorū, xyl'obalsami, carpobalsami, zingiberis, mastiches, fœniculi, seminis in
li, seminis lithospermi, seminis asparagi, rufci, no bacca eius
sarū, salis gemmæ ana drach. semissem, aloës pon rubra con
dus omnium, comprehende succo fœniculi. dii.

Succus in melle coquendo consumitur, quo melle vires succi adepto cætera excipiuntur, pilulas ex semine cucumeris agrestis & alexandrinæ podagricis & arthriticis vtilis scribit Nicolaus Alexandrinus, hanc verò descriptionem non habet.

Pilulæ fumarie Auicennæ recipiunt myrobalanorum flauarum, cepularum nigrarum, scammonij ana drachmas quinque, aloës drach. septē, omnia ter imbuantur succo fumarie, & toties siccantur, postremò fac massam.

Imbui debent succo fumarie non excipi, sed melle cui succus hic incoctus fuerit, multò facilius ob myrobalanorum siccitatem, sole siccantur quàm aromaticæ.

Pilulæ assieret Auicennæ recipiunt pulueris hieræ picræ unciam unam, mastiches, myrobalanorum citrearum ana unc. semissem, aloës unc. duas, cum syrupo stæchados, forma offam.

Hic syrupus aut cæteris ob lentorem idoneus est his pulueribus comprehendendis & seruandis à situ ac putredine.

Iris Illyrica aut florentina.

Pilulæ ex agarico Mesuæ recipiunt agarici drachmas tres, radicis ireos, prassij, myrrhæ ana drachmam unā, turbiti drachmas quinque, hieræ picræ drachmas quatuor, colocynthidos, sarcocollæ ana drachmas duas, excipe sapa.

Vin

Vinū ad dimidias aut tertias coctum, id est sapa crassitie & lentore est idoneum his cōprehendendis, & à putredine ac transpiratione in aërem vindicandis.

Pilulæ ex hiera recipiunt, pulueris hieræ picæ Galeni unciam unam, cum melle rosato, fac massam.

Similiter ex omnibus hieris & antidotis aliis fieri possunt massæ pilularum, sed melle opus est tanto parciore ad pilulas quàm ad electaria, quanto pilulas electariis esse oportet duriores.

Pilulæ mastichinæ consiliatoris recipiunt mastiches drachmas quatuor, aloës drachmas decē, agarici drach. tres, cum succo artemisiæ, singe massam.

Hæc tria seorsum trita mastichæ, si vis cum pauca aqua dulci, melle excipiuntur, cui succum arthemisiæ incoxeris.

Pilulæ stomachicæ Mesuæ recipiunt aloës drachmas sex, mastiches rosarum ana drachmas duas, syrupo rosato excipe. Pil. ante cibum.

Pilulæ rusæ, seu communes recipiunt croci, myrrhæ ana unciam unam, aloës uncias duas, cōprehende uino aromatico. Aloë est a te, & statu pestilē-

Pilulæ bechicæ Mesuæ recipiunt succi glycyrrhizæ, sacchari ana aureos sex, amyli, tragacanthi, amygdalarum dulcium, ana aureos quatuor, ti lauāda.

comprehende muccagine seminis psyllij, aut cydoniorum.

Possunt comprehendere muccagine tragacanthi, ut sequentes.

Pilulae albae fiunt ex sacchari libra una, in uncia muccaginis tragacanthi soluta, & diu tribulata.

SECTIO SEPTIMA DE trociscis.

QUID trociscus & cur hoc nomine, & aliis appellatus, abunde nobis dictum est sectione septima Mesuae. Horum autem vel compositio hic fieri non potest ut trociscorum theriacorum, vel usus intercedit, ut iam paucissimi sint in officinis compositi. Quia verò componendi rationem habent pilulis finitimam (in ambobus enim pulveres humore aliquo excipiuntur) longo sermone mihi egere non videtur. Ob id paucis eos perstringam, quod adhuc sunt usu quotidiano, quibus verò aliorum erit necessitas. Mesuen & Nicolaum Alexandrinum consulant.

Trocisci de gallia moschata Mesuae recipiunt ligni aloës crudi partes quinque, ambrae partes tres, moschi partem unam, glutinis, tragacanthi, cum aqua rosata extracti, quantitatem illam comprehendere sufficientem: fiant trociscis

cischi magnitudine foliorum myrti, sigillentur, reponantur in uase uitreo, alij ambra oleo balanino in uase uitreo soluant, & hoc oleo cetera comprehendunt.

Trocischi de gallia moschata Nicolai Alexandrini recipiunt mastiches uncias duas, gummi unciam unā, caphuræ scriptulum unum, quod trita mollissimè, cum aqua rosarum formentur in trociscos, in umbra siccentur, terentur subtilissimè oleo iasmino, sambaceum uocant, incoquantur, adde cinnamomi, caryophyllorum, nucis moschatae, ana semiunciam, fac trociscos, illine troscio aqua rosarum soluto.

Deben & mustelinū uocant.

Malè in Nicolao, olei sambucini vnciae quatuor & malè coquit ad dimidias, hodie mastiche trita super cineres calidos ex olei drach. vna soluitur, pul. gummi & caphuræ additur affusa pauca aqua rosarum.

Trocischi alypta moschata, recipiunt ladanī Nicolai purissimi, unc. tres, styracis calamitæ unc. unam Alexandrini. & semissem, styracis rubri unciam unam, ligni aloës drachmas duas, ambrae drachmā unam, caphuræ script. unum & dimidium, moschi script. dimidium, aque rosarum quantum sufficit.

Ladanum per se negligentem & crassius teratur, styrax vterq; simul parum teratur, & per cribrum rarū cernēdo purgetur: deinde tria hæc catino imposita sole æstiuo vel

sine hoc vase duplici liquetur potius, quam mortarii, aut pistilli caliditate vehementi, mox vt liquata sunt pistillo in mortario, sole vel igni probè siccatis, diu tundantur addendo paulatim puluerem ligni aloës. In mortario alio tere amygdalas aliquot oleo fas, easque vbi mortarium, & pistillum illeuerint, abiice: ibi tere primùm ambram, deinde caphuram, & moschum aqua rosarum pauca affusa, misce reliquis, & forma trocischos. Hæc parandi ratio propè tota ex eodem Nicolao est sumpta.

*assa fetida.

Trocischi de myrrha Nicolai recipiunt myrrhæ, foliorū rutæ, mentastri, pulegij ceruini, rubiæ, *opi Partici, sagapeni, opopanacis, ana drachm. tres, lupinorū pertritorū, drach. quinq; fiāt trocischī cum succo rutæ ponderis drach. duarū.

Trocischi de agarico Mesuæ recipiunt agaricum electum pulueratum, qui cum uino cui infusum sit zingiber formatur in trocischos.

Trocischi de spodio recipiunt spodij drachm. quatuor rosarum rubrarum drach. septem, seminis portulacæ, succi glycyrrhizæ. ana drac. duas, mucæ agine seminis psyllij comprehende in trocischos drach. unius.

Spodium arabū sit verum nō ebur vstū, ne autem accipe spodium Græcorum rem fornicariam pompholygi affinem nunquam
su

sumendam: sed solum ad mouendam.

Trocischi de terra sigillata Mesuæ recipiunt ^{* in troc.} sanguinis draconis, gūmi Arabic i assi, * ramich, ^{Mes.} rosarum, seminis rosarum, amyli assi, spodij, acacia, hypocisthidos, balaustij, boli armenie, terræ sigillatæ, id est sigilli Lemnij, corallij, unionum, succini, tragacanti, papaueris nigri ana drach. tres, & semissem, sem. portulacæ assi, cornu cerui usti, thuris, nucum cypressi, ana drach. duas, cum aqua arnoglossi fac trociscos.

Trocischi de succino Mesuæ recipiunt succi- ^{Diaele-} ni aureos sex, cornu cerui usti, gummi Arabici ^{Ara seu di} assi, corallij usti, tragacanthæ, acaciæ, hypocisthi ^{acarabe.} dos, balaustij, mastiches, cancamiloti, papaueris nigri assi ana aureos duos, thuris, croci, opij ana aureum unum & semissem, fac trociscos cum muccagine seminis psyllij.

SECTIO OCTAVA DE pulueribus.

PULVERES initio antidotorum non-
nihil attigimus, ubi horum pulveres py-
xidibus vitreis ferè seruari diximus, & inter-
dum præsertim vtendi tempore in electa-
rio solida formari. Sæpe etiam initio mel-
le, vel alio excipi, seruari, coqui, ea suo calo-
re natio, seu (vt cum vulgo dicam) fermentari. De pulueribus aliis si quides sollicitus:

A 6

ex Mesuæ sectione octaua repete, tantum addam pulueres condimentis destinatos.

Puluis minutarum specierum recipit zingiberis albi lib. vnam, piperis boni vnc. quatuor, nucis moschatae vnc. duas, caryophyllorum, granorum paradisi ana vnc. vnam, cinnamomi electi semiunciam fiat puluis.

Puluis albus recipit zingiberis albi & purgati lib. vnam fiat puluis. Puluis eximius finis vulgò dictus, recipit zingiberis albi se- libram, granorum paradisi vnc. duas, tritis his simul misce croci drach. duas, & acetum paulatim affunde, vt croci colorem induat, diu & multum tunde simul omnia.

Librae vni sacchari misce cinnamomi vnciam vnam, habes puluerem ducis.

SECTIO NONA

de oleis.

OLEI genera quatuor demonstraui-
mus in Mesue, quorum primum est
oleum ex oliuis maturis, aut immaturis ex-
pressum, quod oleum absolutè dicitur,
aut cum vulgo oleum commune. Alterum
est quod ex seminibus oleaginis expri-
mitur. Tertium quod vi ignis tollitur aut
descendit. Quartum quod oleo constat:
sed qui plantarum partes ac animalium sunt
in

incoctæ.

Primum genus tanquam cuius perspicuū sciens omitto, reliqua tria persequar.

Oleum igitur amygdalarum dulcium *Secundum genus.* fit ex amygdalis non depellatis, in mortario lapideo pertrititis, in offas collectis, quæ calentis aquæ vapore, in quo diu subiguntur manibus, vbi calent calatho spartaceo, aut sacco cannabino calenti inuolutæ, torculari calido exprimuntur in oleum clarissimum & dulcissimum. Aliter quoque fieri in Mesue docuimus.

Sic fit oleum ex amygdalis amaris, pistatiis, strobilis, nucibus auellanis, Indicis, balaño myrepfica, nucleis persicorum, cerasorum, seminibus cucurbitæ, cucumeris, melonum, ricini, staphidos agriæ, cnici, cannabis, lini, papaueris, hyoscyami, & cæteris oleaginibus, quæ etiam per genus tertium extrahi possunt.

Mesues. Oleum laurinum fit ex baccis lauri maturis recentibus, tritis in pila, incoctis aqua, & torculari expressis.

Sic ex baccis recentibus myrti, iuniperi, terebinthi, lentisci fieri potest oleum simplex. In usu autem frequentiore est cõpositum, de quo in quarto genere. Laurinum autem id ex Gallia Narbonensi vbi magnus est ha

harum baccharum recentium prouentus, ad nos mittitur.

**Tertium
genus.**

Mesues.

Oleum ouorum fit ex uitellis ouorum elixando duratis triginta aut circiter, qui manibus friati in sartagine plumbata frignantur igni mediocri, mouendo cochleari donec rubescant, & oleum ab his resoluatur & profluat.

Alios huius olei modos lege in Mesue, alii sacculo & torculari exprimunt.

Mesues.

Oleum iuniperi fit segmentis ligni iuniperi, uase solido conclusis, incenso circa id igni luculento, ut in uas subiectum descendat oleum.

Cætera ad hoc oleum pertinentia & ad alia, quæ eodem fiunt modo ex Mesue repetite, item quæ ratione fiat oleum philosophorum, tartari, & alia eius generis permulta, quæ, quia ibi fusius sunt explicata, neq; multo usu non celebrata, nunc putavi pluribus verbis explicanda.

**Quartum
genus.**

Olea quarti generis ex plantarum, & animalium quorundam partibus, ubi harum vires macerando, & coquendo traxerunt, collantur, exprimunturque, & humor siquis in oleum largior transiit, coctione absimitur. Et quæ olea cum succis liquidis fiunt, aut sic cis quidem vel liquoribus: sed humore, ut vino solutis ad humoris consumptionem percoquantur, ne humor ille excremento-
sus

sus oleo putrendi, & situm ducendi occasio-
nem afferat, succi consumptionem indicat
oleum spatula iniectum igni, nam si ardet,
pulum est: si crepitat succum habet adhuc re-
liquum. Ad hæc feruendo in lebete crepitat
cum succo, & bullas egerit: ubi absumptus,
tranquillum est, & gutta in manu succum
subiectum ostendit oleum supernatans.

Olea quibus flores miscentur æstiuo in-
solatu magis coquuntur, aut igni lento, aut
utroque.

Olea ex animalibus facienda viua ipsa reci-
piunt, ut in his moriantur scorpiones, serpen-
tes, ranæ, formicæ, vulpes.

*Oleum rosatum Nicolao sic fit, Rosarum tri-
tarum sesquilibra coquitur diu in olei loti libris
duabus uase duplici, tela alba exprimatur &
torculari.*

Hodie rosas recentes, etiam non exun-
guatas oleo omphacino. aut loto, dies, aut *Quartum*
etiam menses aliquot in sole macerant vase *genus olei*
vitreo, aut filiceo. Postea hyeme, aut ut *per impres-*
tēpore pauco succo rosarū aut vino adiecto *sionem.*
coquunt in vate duplici ne vrendo graue-
olentiam acquirat, sicque reponūt. Similiter
ex floribus violarum chamæmeli fit *Mes.*
chamæmelinum cum oleo dulci etiā in va-
se duplici coquendum & ex floribus melilo-
ti, anethi liliorum, iridis, leucoii lutei nym-
phææ:

phææ: sed à liliis apices crocati tollendi.

Oleum cydoniorum. Oleum melinum fit ex cydonijs acerbis tritis, in oleo omphacino sufficienti insolatur dies quindecim, deinceps cum succo cydoniorum coctis in uase duplici ad horas circiter quatuor. Carnem & succum muta, rursus insola, & coque ut dixi, idque bis aut ter repete, cola, repone.

Cydonia sunt qui cortice & semine purgent, purgatione tamen nihil opus est, nisi impura sint aut semiputria.

Mesues. Oleum mastichinum recipit olei rosati unc. duodecim, mastiches unc. tres, uini boni unc. octo, coque ad uini consumptionem.

Fit hodie ex oleo vulgari, cum tamen aut rosato, aut omphacino, aut saltem loto confici debeat, in vase duplici. Cōsumptio- que propemodum vino mastiche pertrita paulatim affunditur continenter mouendo, donec erit liquata & permista. Coctiōe longiore examinatur.

Oleum myrtinum recipit myrtarum recentium selibram, olei omphacini, aut loti sesquilibram: insola, aut coque cum uini albi austeri uncijs quatuor ad uini consumptionem. Fit etiam per expressionem, & per decoctionem in aqua, donec oleum supernatet quod concha separandum est.

Ol

Oleum nardinum Mesue recipit spica nardi uncias tres, uini & aque ana uncias duas & dimidiam, olei sesamini selibram, coque in uase duplici lento igne horis circiter quatuor, sæpe mouendo.

Seu ad aquæ & vini consumptionem: sed prius infundatur spica aquæ & vino. Fit etiam sæpe oleum nardinum descriptione Nicolai Alexandrini efficax: sed sumptuosum magis, à quo etiam componendi modus abundè explicatur.

Oleum costinum recipit costi amari unc. duas, casie unciam unam, extremitatum sampsi-
chi unc. octo, uini odori quantum * sufficit in-
fundere hoc biduo, olei sesamini lib. duas, coque
horis septem, seu ad uini consumptionem, expri-
me, reponere.

Mesues.

*unc. octo

aut circi-
ter.

Aut costum verum, galanga maior hodie dictum, sumèdum, aut eius loco radix enulæ campanæ, aut silphii, aut similis, potius quàm quæ vulgò est in officinis qualitatibus insignium experts.

Oleum rutaceum fit ex folijs rutæ recentibus, oleo maceratis, & estate tota insolaris, quæ exacta coquitur, exprimitur, reponitur, sic fit oleum menthe, absynthij.

Oleum euphorbij fit ut oleum mastichinum.

Eup

Euphorbium enim tritum, aut si recens & molle est, minutim confectum oleo cum uino feruenti paulatim immittatur, & ad uini consumptionem semper mouendo coquatur.

Oleum castorij Nicolai fit ex castorij unc. una, cocta in olei lib. una, ad consumptionem tertie partis castorem retinenda.

Coquitur etiam id oleum cum paucio uini, ut unc. duabus nam si per se coquatur, & oleum vrendo nigrescit, & castorium vane scit. Potest tamen sine uino in sole coqui saepe mouendo.

Oleum uulpinum Mesue sic fit, Vulpes integra tantum exenterata coquitur in aque fluuialis & marine aut salse, ana sextario uno, olei antiqui clari sextarijs duobus & dimidio, coque ad aque consumptionem, & uulpis carniū dissolutionem exprime & repone.

Oleum lumbricorum fit ex lumbricis in uino albo diligenter lotis, & oleo, & paucio uini rubri incoctis ad uini consumptionem, deinde colatur & exprimitur leuiter oleum, ac reponitur. Sunt qui tritos deinde lumbricos eidem oleo permiscant in unguenti formam, nec inutiliter.

DE VNGVENTIS SE-

ctio decima.

Paulus. c. **V**NGVENTVM, quia partibus inungitur, dictū, crassius est oleo, liquidius
20. lib. 7. ce

cerato, vt ex vnguentis Galeni, & aliorum
cōstat, huius materiæ sunt plātatum partes,
& multæ animalium, metallica etiam & ter
rea quædam in his succi recētes, & fluidi co
quendo absumuntur, vt in oleis, iidē si sunt
sicci, aliquo sunt humore dissoluendi.

Si herbæ in vnguenta recipiantur, vel pul
uerantur si sunt siccæ & aliis miscētur, vt me
tallica & terrea, & alia plurima: vel humore
aliquo, vt vino macerantur, etiā virides co
quuntur, exprimuntur: deinde reliquis vinū
id vel aliud incoquitur, ad sui consumptio
nem. Liquores sicci & gummi, & resinæ, vel
teruntur quādo sunt sicciora: vel pistillo ca
lido soluuntur, vel humore idoneo, quādo
præsertim sunt humidiora.

Fiūt aut vnguēta nūc igni, nunc sola sub
actione, sed longa, vt vnguentum ex lithar
gyro nutritū cū oleo, aceto, aliis, & quæ alia
similiter nutriti diximus lib. 2. Sic argentū
viuū citra ignē aliq̃ miscetur, quod in va
porem promptè totum abeat.

Vnguētis, ceratis, emplastris, æstate minus
olei, ceræ, & similium corpus dantium mi
scemus: hyme plus quod huius frigiditate
etiam liquidiora cogantur, & duriora appa
reant, æstate contra etiam sicciora per col
liuationem mollescant.

Cera cum oleo liquata igni aufertur, &

B

refrigerando continenter mouetur, vbi iam modicè coiuit pulueres paulatim permiscen-
tur, idque ne fiat grumosum vnguetum. Alii
vbi refrigerando coiuit in sartagine cochlea-
ri, aut spatha ferrea in bracteolas deradunt,
in mortarium inaponūt, & adiectis paulatim
pulueribus diu tribulant. Quod præceptum
plurimis his vnguentis est commune.

Vng. regis Vnguentum aureum Mesuæ recipit ceræ fla-
uæ unc. sex, olei boni lib. duas & semissem, tere-
binthine unc. duas, resinæ pineæ & colophonie
ana unc. unam & semissem, thuris, mastiches, ana
unc. unam, croci, drach. unam.

Cera ex oleo liquata pulueratæ resinæ
affunduntur, his liquatis terebinthina mox
igni aufertur, vbi refrigit, puluis reliquo-
rum adiicitur.

Vnguetum pompholygos spurium recipit olei
rosati unc. decem, ceræ albæ unc. quinque, cerusæ
lotæ unc. quatuor, plumbi usti, pompholygos ana
unc. duas, thuris unc. unam. Coque oleum rosatum
cum succo solani ad ipsius consumptionem, tunc
adde ceram: deinde reliquorū puluerem tenuis-
simum misce in mortario, ubi refrigit, quo di-
xi modo.

Ceræ vnc. duæ, aut vnc. duæ, & dimidia
fatis sunt vnguento. Hæc enim quantitas
emplastrum fecerit, pompholyx verā mi-
sce

ſceatur non vt hodie cadmia.

Vnguentum baſilicum minus Meſue recipit
refine picis, cere, ana olei quantum ſufficit.

Tetrapharmacum hoc Galeno & Paulo
aliter fieri docuimus in Meſue. Cera in
oleo liquata, pix & refina puluerata ini-
ciuntur, quibus liquatis igni aufer. Si verò
craſſius tritam picem immittas, quia tardius
liquatur, ob id diutius ignem tolerat, & ve-
lut vritur, nigrumque facit tunc vnguen-
tum. Cere & refine vnc. dimidia, olei vnc.
duæ, picis vnc. vna.

Vnguentum Aegyptiaci Meſue recipit eru-
ginis aureos quinque, mellis aureos quatuorde-
cim, aceti acerrimi aureos ſeptem coquenda igni
ad iuſtam craſſitiem.

Mel cum aceto primùm aliquandiu co-
quitur, deinde additur ærugo & percoqui- Gal. lib. c.
tur. Iuſta autem craſſities ex notis prius di- ph. 9.
ctis intelligitur, hoc eſt, ſi eius portio vaſi
ſtanneo, aut marmori impoſita & refrigera-
ta coëat, nec adhæreat. Aerugo coctione
transmutatur in rubrum, ſicque minus terret
vnguentum ægros quàm viride.

Vnguentum album Raſis recipit cere al-
be unc. unam, ceruſe in aqua roſarum lotæ unc.
duas, *olei roſati unc. quatuor. Sunt qui addunt * Vnc.
paucum aceti, alij etiam unc. unā lithargyri, alij unam.

caphuræ drac. duas, alij duo albumina ouorum,
omnes recte pro uario medici scopo.

Hodie plerique addunt omnia hæc præ-
ter lithargyrum. Alii olei vnc. 12. cerusæ,
ceræ albæ ana vnc. 4.

Vnguentum desiccatiuum rubrum nothum re-
cipit cadmiæ lapidæ, terræ sigillatæ, ana unc.
4. lithargyri auri, cerusæ, ana unc. tres, caphuræ
drach. unam, ceræ unc. quinque, olei rosati & ui-
olati ana uncias sex.

Præstantius esset cum solo oleo rosato,
& eo facto ex oleo omphacino, quia magis
stringeret & siccaret.

Lithargyros cum oleis aliquandiu nu-
tritur super ignem, cera deinde liquatur in
his, deinde reliquorum puluis tenuis. pau-
latim adiicitur.

Vnguentum enulatum spurium recipit radi-
cis enulæ campanæ costæ cum aceto, & tritæ, &
cretæ lib. unam, axungie porci, olei communis,
ana unc. tres, ceræ nouæ, argenti viui, salua homi-
nis ieiuni extincti, terebinthinæ lotæ ana unc.
duas, salis communis puluerati unc. semissem.

Cera in oleo liquatur, axungia, deinde,
post additur enulæ pulpa, deinde argentum
vium, & sal, post id terebinthina. Sunt qui
argenti viui loco salubrius miscent sulfur,
alii vtrunque omittunt.

Vng

Vnguentum populeum Nicolai recipit oculo- A multis
rum populi lib. dimidiam foliorum papaueris ni huic dupla
gri, mandragoræ, hyoscyami, solani, semperuiui aut tripla
parui & magni, lactuce, personatæ, cotyledonis, cõponitur.
uiolæ nigræ, summitatum rubi tenerrimarũ, ana
unc. tres axungie porci sine sale lib. 3.

In hac regione populi flores & herbæ in
idem tempus non incidunt. Nam oculi po-
puli Martio erumpunt, herbæ Iunio vigent:
ob id oculos ipsos in mortario per se teri-
mus, deinde cum dimidio axungie porci pur-
gatæ (iæuum dulce vocamus) multũ diũque
tũdimus, in vase operculato recõdimus heb-
domadas s. 6. menses duos, dum herbæ vi-
geant. Hæ incisæ & per se pistillo ligneo tri-
tæ, quia simul ob lentorem, & multitudinẽ
non possunt cum oculis populi, & sepo co-
quantur, cernuntur omnia, & si opus est pa-
rum recoquantur, reponuntur: vt tamen vi-
reat magis, superadde coctioni solani triti
manipulos duos, non maleficorum more
æuginem.

Vnguentum tripharmacum Mesuæ recipit li Vng. de li
thargyrum leuissimè tritum in mortario ad iu- thargyro
stam crassitiem, tribulandum cum aceto & oleo nutrito.
uicissim & paulatim affusis: si uerò coquis ad ace-
ti consumptionem, & lithargyri fusionẽ, ut cras-
sescat magis, fiet emplastrum.

* Dictum Vnguentum * apostolorum Auicennæ s. can.
quia sim - recipit terebinthine, cere albe, resinæ, ammo-
pliciter 12 niaci ana drach. quatuordecim, eruginis, opopa-
constat nacis ana drach. duas, aristolochie longæ, thuris
quot fue- masculi, bdellij ana drach. sex, myrrhæ, galbani
runt apo- ana drach. quatuor, lithargyri drach. nouē, bdel-
stoli. lium si molle est, ammoniacum, opopanacem cum
aceto macerabis nocte una, post ridie calefac, co-
la, iterum pende: & ponderi horum legitimo, te-
rebinthinam permisce, quæ tam bellè hæc, ac cæ-
Olei libræ tera comprehendet, ut uix sis erraturus: lithargy-
sint æstate rum autem in oleo nutries aliquandiu sine igni
due, hye - friatum. Post igni trade: ubi calet, ceram immit-
te tres. te. Hac liquata igni aufer, liquores, ut dixi, para-
tos misce: ubi refrixit, reliquorum puluerem pau-
latim adijce, & bdellij si est siccius, quale nobis
est adulterinum.

Rarum usu, tamen ob componendi &
miscendi magnam difficultatem sæpè ad
operis specimen probandis seplasiariis para-
ri imperatur.

Emplastrum apostolicum Nicolai Ale-
xandrini ab hoc diuersissimum est, & con-
stat simpl. viginti & vno.

Vnguentum martiatum cum Hermolao,
vel Martianum cum aliis, & de althæa, &
Arragon, & Agrippæ (quæ quatuor vulgus
ole

olea 4. calida vocat) quia raro componuntur, omni si, ex Nicolao petenda si componendi necessitas inciderit, & vnguentum in gratiam comitis cuiusdam ad menses cohibendos scriptum, quia omnibus & solis astringentibus constat, ut emplastrum contra rupturam, si tamen componendi cupiditas tibi inceserit, aut etiam necessitas, nobis scribitur in fine vnguentorum Mesuæ cum vnguento citreo, & aliis non paucis hodie obsoletis: quanquam & vnguentum citreum, etiam hodie quidam componunt, incerti tamen quid amentum dulce sit.

Nam sunt qui lapidem vitri (quam axungiam vitri vulgò vocant) alii gypsum lucidum, alii aliud. Forte autem corrupta vox ex amianto lapide quo adulterant hodie alumen scissille illi aspectu simillimum, sed alumen vrit, amiantus est dulcis. Eadē ambiguitate tenetur in antalli lapide, & in gersa serpentaria quam vocem ex cerusa, syncope, n, corruptam esse est perspicuum. Est enim velut aut cerusa, aut amyllum (sic enim etiam quidam vocant) ex radice ari, vel dracūculi depellata, trita, ficcata citra lotionē his aliis post lotionem cum aqua rosarum.

Cerote & cerelæon Græcis nobis ceratum à cera dictum, medicamentum consistencia quodammodo medium inter vnguenta

& emplastra.

Mesue.

Ceratum Galeni refrigerans recipit ceræ albæ per ablutionem unciam unam, olei rosati ex omphacyno facti uncias quatuor, fiat ceratum in uase duplici, quod dum est refrigeratum, multum diuque ex aqua frigidissima, & postremò pauco aceto albo puro subigatur.

Non esse autē ceratum hoc aqua & aceto imbuendum nisi tempore vtendi, abundē ex Galeno in Mesue sectione vndecima docuimus. Postremò aqua rosarum imbuunt hodie quod probo, sed diu seruari nolo, præsertim aëre calido, quia vires suas perdit, & graueolentiam acquirit.

Ceratum santalatum Mesuæ recipit ceræ albæ, drach. triginta, olei rosati lib. unam, rosarum drach. duodecim, santali rubri drach. decem, santali albi & flauiana drach. 6. boli Armeniacæ drach. 7. spodij drach. 4. caphuræ drach. 2.

**Spodium
Arabū nō
Græcorū
Calidum.**

Refrigerato iam cerato & raso puluerē in mortario miscēt, paulatim potius quā inter refrigerandum, vt antè vnguenta dixi.

Ceratum Galeni stomachicū recipit unguenti nardini optimi, ceræ odoræ & pinguis, & lotæ ana unc. unā. si hyems est: si uerò æstas ceræ drac. septem, liqua in uase duplici, refrigerato deinde & raso adde pulueris mollissimi aloës, & mastiches ana drach. unam.

Suc

Succus omphacii aut absynthii quando *Refrige-*
addenda, in Mesue dixi. Hoc aliter Mesues *rans.*
cōponit ex Galeno, sed mutatis aliquot sim-
plicibus & ipsorum pondere.

Ceratum Galeni stomachicum alterum reci-
pit olei melini, ceræ albæ lotæ ana unciā unam,
hypocisthidos nnc. semissem, fiat ceratum.

Hæc duo cerata stomachica ex Galeno
vsurpanda potius suaserim, quàm quæ hodie
sunt ex Nicolao & Mesue, quanquam &
id clemens, & efficax fuerit. Illud calidissi-
mum quod non esse Galeni caryophylla,
nux moschata, macis, cubebæ, galanga, pla-
nè indicant.

Ceratum, stomachicum Galeni ex Nicolao
recipit menthæ, absynthij, maioranæ, starchados
Arabice, foliorum lauri, chamæmeli, rosarum,
ana manip. unum, cinnamomi, spicæ nardi, nucis
moschatæ, caryophyllorum, macis, cubebæ, galan-
gæ ana unc. dimidiam, thuris, mastiches ana unc.
unam, puluerata excipe ladani, ceræ ana unc.
octo, olei chamæmelini, laurini, spicini, mastichi-
ni, rosati, ana unc. una & dimidia.

Oleum laurinum, rosatum, chamæmeli,
cum cera & ladano liquantur, mox igni au-
fer, & trade mortario, cætera misce multū,
& diu tundēdo, donec erit glutinosum cum
oleo spicino, & mastichino.

B s

Ceratum aliud Mesuæ recipit rosarum, mastiches ana drachmas uiginti, foliorum absynthij siccorum drachmas quindecim, spicæ Indæ drachmas decem, excipe cere puræ uncias quatuor, olei rosati lib. una, & semisse simul igni liquatis, mox aqua rosarum aliquoties lotis, deinde uino ueteri, succo, cydoniorum, & pauco aceti.

DE EMLASTRIS.

HAEC emplastrum cum r, & adiectiuè medicamentum, emplastrum sine r, Galeno dicitur, Latinis tamen placuit potius dicere neutro genere emplastrum, quos hîc sequemur. Emplastrum autem est medicamentum corpori admouendum, durum valdè & solidum ex omnibus propè medicamentis, præsertim pinguibus & siccis coactum.

In emplastra enim recipiuntur omnes plantarum partes, metallica itè & terrea omnia. Multæ etiam partes animalium ac interdum animalia tota.

Ex his autem quædam vires solas emplastro distribuunt, ut vinum, acetum, aqua, succi liquidi, hæc enim ad sui consumptionem coquuntur. Alia corpus tantum, & materiam emplastro conferunt, nullam verò aut minimam virtutem largiuntur, ut li-
tha

thargyros, cera, oleum commune, recens, & frequenter resinae. Reliqua propè omnia & corpus & facultatē aliquam emplastro impertiuntur. Ex quibus patet scopos componendorum emplastrorum præcipuos esse duos facultatem, & consistentiam crassam, duram, glutinosam. Duos verò alios odorum & colorum minus esse præcipuos, & magis in ægrorum gratiam quàm medicinali naturam, recipit tamen ob apprehensionem, magni quoque sunt momenti, præcipuè odor. Is enim bonus cerebro, cordi, vtero, commodare possit: malus nocere, in sumendis verò coloris, & præter hos saporis magni quoque ratio est habenda, ut in methodo componendi medicamenta ostendimus.

Ex his radices, cortices, ligna, folia, surculi, flores, fructus, semina sicca, & simul puluerata, vel cum aliis, ferè postrema miscentur cocto emplastro cum aristolochia, gentiana, chamæleon remoto ab igni emplastro à Galeno miscentur: si qua verò ex his recentia & viridia sumantur, vel ex humore aliquo coquantur, cernuntur, miscentur: vel succus ex his si succulenta sint tritis expressus incoquendis aliis seruit, & in vaporem exhalat, viribus tamen relictis, ut in emplastro de genua. Id quod etiā
muc

muccaginibus commune est, sed minus hæ ob lentorem exhalant.

Oleum tamen & mel adhuc multum ab- solutis emplastris superest.

Qui verò succi constantes & corpulenti (vt aloë, hypocisthis, glycyrrhizæ succus, acacia, glaucium, lycium, elaterium, meconium) in emplastra veniunt, si recentes sunt, aliquo rei propositæ idoneo humore sol- uuntur, qui coctione prius est consumendus, quàm illi composito misceantur, aut saltem simul incoquendo cōsumetur. Si autem sic- ciores sunt, tamen adhuc teri contumaces, pi- stillo calido, & ob calorem ficcante teran- tur, nisi si qui sint friabiles, vt aloë, scammo- nium, tam succus, quàm liquor. Dicti verò succi omnes refrigerari iam incipienti em- plastro miscendi sunt, vel dum cerati consi- stentiam habet emplastrum, si illorum suc- corum substantiam & facultatē manere vo- lumus in emplastro.

Sed succi sicciores, vt rarius in emplastra recipiuntur: sic liquores, gummi resinæ, me- tallica omnino frequentissimè.

Liquores autem vt galbanū, opopanax, sagapenum, ammoniacum aceto vel vino vel alio competenti humore macerati dis- soluuntur, colantur, coquuntur ad humoris illius consumptionem, in emplastriq; con- sist

sistentiam coguntur, tuncque pondus illorum quæsitum in scriptura sumitur. Si verò horum duo, tres, quatuor in idem emplastrum recipiuntur: sed pondere diuerso, vt in emplastro diuino, separatim liquores singuli sunt macerēdi, dissoluēdi, colandi, coquēdi, vt cuiusq; per se pondus legitimū accipiat id quod ante hanc per colum purgationem fieri probè non potest ob ramentorum, feminum, sordium, & aliorum largam in multis horum mitionē. Si verò puri sint, aut cultello purgati, potes initio statim pendere, & mox simul dissoluere, colare, & emplastro propemodū cocto incoquere ad humoris alicuius consumptionem. Quod si iam dissoluti, colati, appēsi, & per se cocti ad emplastri crassitudinem, vt dictum est, uenerint, percocto iam emplastro iniiciuntur. Sunt qui terebinthina pauca, si hanc recipit emplastrum, percoctos prius resoluāt quàm iniciant.

Gaibanū ligneo pistillo tusum aliquādo cæteris ab igne depositis iniicitur, aliquādo parū incoquitur, raro multū: ammoniacum sepe multū coquitur, aut separatim, aut cum emplastro, interdum minus: est quando digitis ad ignem, vel solem dilatatum mox ubi alia, sed remota sunt ab igne sublata iniicitur, donec lique scat.

Amm

Ammoniacum solum impositum squa-
lida & arida reddit emplastra, nisi cera & re-
fina, vel alia ad emplasticam confectionem
idonea misceantur.

Vinum verò, acetum & alia id genus co-
quendo tota consumuntur, viribus tamē (vt
dixi) in medicamento relictis pro varia ace-
ti & vini natura. Neque enim idem potest
acetum ex vino austero, & acetum ex vi-
no valenti, adhuc tenue, purum, album va-
lentius est, in tenuādo & penetrando quā
contrarium: sic vina medicamētis varia ex-
petuntur, nunc austera in emplastris epulo-
ticis: nunc generosa, quale Falernum, si dige-
rendum valentius est. Ob id à medico sunt
hæc distinguenda in suis scripturis.

Oleum emplastris primā ratione misce-
tur ad coctionem, deinde vt emplastrum
fiat anodynum, resoluens, molliens, vt quē
medicamenti vis acris, vel austera obtun-
datur.

Oleum commune emplastris miscetur,
vt materiam præstet: sit quē cum cera liqua-
tum, & mistum emplastrorum corpus, cui eu-
phorbium vel alia misceantur. Sæpe autem
ad metallicorum coctionem adhibetur, vel
solum, vel cum aqua, vel aceto, vel vino.
Solum cum axungia in emplastro diachalci-
teos ad lithargyri & chalciteos coctionem:

sol

solo item vel cum dictis humoribus lithar-
gyros laeuissima ferè veteribus coquitur ad
sordium consistetiam, metallicis quibusdā,
vt squamma æris, cerussa, nunc initio adie-
ctis, nunc postea, pro variis medici scopis.

Oleum verò vetus quanquā & materiam
præbeat, tamen ad digerendum miscetur: id
quod quanto vetustius est, tanto in id effica-
cius. Eadem ratione omphacinum oleum,
vel simile ad astringendum & refrigeran-
dum miscetur: lotum ad refrigerandum, &
dealbandum. Composita quoque olea om-
nia, & vnguenta in emplastra immitti pos-
sunt, vt præter materiam, facultatem quoq;
suam immittant.

Additur etiā oleum, vt resinarum ficcio-
rū, & ceræ vetustioris ficcitatē corrigat: id
quod resinæ recentiores quoque præstant.

Oleum hyeme vnguentis quibusdam, cæ-
ratis, emplastris largius miscendum quàm
æstate, à cuius calore semifusum, mollius
reddit vnguentum ceratum, emplastrum, vt
durius idem oleum ab hyemis frigore con-
cretum. Eadem ratio resinarum, liquidarū,
& siccarum, minus & ceræ, vt olei partē co-
tylæ quartam hyeme, æstate octauam: mi-
scet Galenus, interdū cotylas olei quatuor
hyeme, tres æstate idē miscuit. Resina tamē
& cera quanto pinguior, humidior, recen-
tior

tior, tanto paucior tam hyeme quàm æstate miscenda est: sed tamen parciore adhuc æstate quàm hyeme.

Mel panaciæ & aliis quibusdam emplastris miscetur, ut corpus præbeat emplastrum, & prætereà ficcet, tergeat, digerat, à putredine vendicet.

Quauis enim emolliendi uis exigua cere adsit, tamen illius causa non iniicitur.

Cera in emplastris solum materiæ locum habet non efficaciam virtutis adiuuat, ut interdum resina, non tamen omnibus, ut potest materiam aliunde sortitis cera miscetur, aut resina. Nam emplastrum diachalciteos neutrum recipit, quod consistentiam emplastri iustam suppeditent lithargyros, chalcitis, & axungia à membranis purgata, cum oleo cocta. Ad hæc quibus ladanum miscetur si lantum est, ceræ vicem sustinet, ut ea non sit addenda.

Porro cera vel est recēs, & ob id pinguis & glutinosa magis. Hæc quæ æstate parciore est miscenda, ut oleum hyeme, largiori manu utrunque, & ratione eadem pices, & resinæ. Quæ verò cera est ficiore, vel natura, vel tempore hæc minus diu coquenda, & sæpè oleo aliquo vel resina liquidiore humectanda. Adde, quod cera alba seu natura, seu lotionem ad candorem quoque interdum additur. Propoleos ferè eadem quæ ceræ consistentia & ratio, sed facultate trahendi vehementer

menti est prædita, quàm cera, vel nullã vel minimam obtinet, quanuis nõnihil digerit, sed inter digerens & tractorium aliquid inter est Galeno initio lib. 7. c. ph. g. Propolis ob id ferè semper remoto ab igni emplastro miscetur, ne vis eius attractrix exhalet.

Gũmi thuris omniũ frequentissimè in em *Gummi.* plastra Græcis veteribus recipitur, myrrha & sarcocolla non rarò, bdelliũ & styrax interdum, cætera rarissimè, nisi quod caphuram, & alia quædam Arabes ac neoterici frequenter hodie suis emplastris commiscunt.

Thus autem persæpe miscetur empla- *Vt lib. 5.* stris ad obtundendam aliorum valentiorum *meth.* violentiam nonnunquam vt materiã præ- *Manna* beat emplasticam, præsertim quod recen- *Græcorũ.* tissimum est ac pinguisimum, nonnunquam vt affectus causam coquat, & modicè digerat. Rationibus iisdem manna ipsis miscetur, ac præter eas vt modicè astringat. Gummi alia ferè miscentur quo emplastris facultatem aliquam suam largiantur, ac non multò ante resinas iniiciuntur, idque quia substantia sint aquea & crassiore cū resinæ sint aeræ magis & tenuiores, vt in simplicibus diximus. Si verò gũmi sint liquida & recentia eorum quæ humiditatem multam, & virtutem in emplastro manere velimus parum diu incoquantur. Quod præceptum succis,

C

liquoribus, resinis, & aliis permultis est commune: quia coquendo sicciora euadunt, & viribus velut exanimantur.

Gumi liquores semper in fine misceantur, & succi sicci: quæ si humore aliquo fuerunt soluenda, ad illius consumptionem prius coquantur, post misceantur, quando emplastrum incipit refrigerari. Succo liquidi in emplastro de ianua coquendi cum oleo. Herbarum virides in emplastro gratia dei cum vino coquantur ad eius consumptionem. Ex oleo coquantur emplastra, ut apostolicum, ceroneum, oxycroceum, diuinum, & contra rupturam, diachylon, vel ex succis, ut emplastrum de ianua: vel lacte, ut emplastrum gratia dei.

Chalcanthum aceto solutum depositis ab igne paulatim miscetur Galeno cauente ne efferuescat. Aesustum, ærugo, chalcitis, magnes, bolus Armenica, terra Lemnia, sulfur, auripigmentum, & cætera puluerabilia in fine depositis ab igne miscentur. Adeps super ignem miscetur semper agitando, crocus humore solutus dum fiunt magdaliæ & moschus miscentur.

Resine.

Resina lentiscina, terebinthina, laicea, pitynia seu pinea, picca, abietina, cupressina emplastris miscentur sæpè ad consistentiam ipsorum constituendam tantum, seu ut mater

ter

teriam & corpus emplastro cum aliis præbeant, interdum vt lentorem & glutinosam qualitatem impertiantur, cum per alia emplastrum pinguis expers, nec adhærēs per se partibus est, at per se promptè excidens.

Est quando vt virtutem aliquam emplastro afferant digerendi, tergendi, siccandi, vel aliam cuique seorsum resinæ peculiariter, vt in ipsarum historia docui in simplicibus. Quantum autem vniuscuiusque sit miscendum, & quādo coctioni sit vna quæuis miscenda, postea suis locis audies.

Terebinthina quanuis valentius quàm cera emollit, ac prætereà calfacit, & digerit: sæpè tamen emplastris iniicitur, vt ea tantum reddat glutinosa, non vt facultatem aliquam, vel nouam tribuat, vel augeat, Aliæ item resinæ similiter pingues eadem ratione.

Quando autem ea miscetur, & simul liquores, aut succi sicci. His humore idoneo solutis, colatis, ad humoris consumptionem coctis, rectè commiscetur terebinthina, deinde ambo percocto emplastro, & ab igni deposito permiscetur, vt ignem nullum, vel minimum sentiat terebinthina. Siue per se siue cum aliis in emplastrum veniat, vt in emplastris diachylo maiore, de meliloto, de muccaginibus.

METALLICA.

METALLICA sunt autē admodum curiosè terenda, & cribro tenui cernenda, vt promptius liquentur si liquabilia sunt, vel ne contactu nos offendant si non liquantur, etiam si liquabilia sint.

Ex his verò quæ liquantur libro superiore docui in liquatione.

Liquatur lithargyros cū aqua, vel oleo, vel vino, vel aceto, vel oleo iunctis horum aliquibus, quæ tamen coquendo absumentur, & liquandi celeritatem lithargyro afferunt, vt post audies.

Lithargyri & cerusæ ana lib. .i. si cum olei & aquæ ana libr. vna, parum diu aëre puro igni splendente coquantur, album fiet emplastrum: sed vt adhæreat parū terebinthinæ, vel resinæ similis addendum, si molybdæna addatur fiet cineritium, si lithargyros & oleum sint lota, albius fiet emplastrum, albedinem præter dicta emplastro conciliat cera alba, oleum lotionē albatū, pompholyx, spodium, calx, ossa vsta, & pisciū testæ vstæ, farina, si plus cerusæ accipiat quàm lithargyri albius fiet: sed minus tenax.

Aerugo citra coctionē cerato mista emplastrum facit viride: melius fiet si ærugo in sole ex aceto acri pluribus diebus læuigetur, quod enim est in ea mordax, sic mitescit.

scit. Si verò æruginem cum aliis initio mediocriter coxeris emplastrum facies melinum, id est coloris mali cydonii: si liberius, rufum fiet. Rufa item & fusca efficiunt chalcitis vsta, auripigmentum, sandaracha, pix nigra, bitumen, gagates lapis, & alia ante miftionem nigricantia, quæ si largiora miscentur, nigrum faciunt emplastrum. Melinum etiam fiet si ærugo lithargyro ad spissitudinem cocto addatur, & iterum coquatur, donec vrendo rufescat.

Cadmia fornicaria, vt etiam lapidosa prius ex vino, vel alio liquore idoneo diu trita fit melior, & ad fusionem aptior.

Cerusa interdum additur emplastris, vt refrigeret, siccet.

Interdum ad albedinem conciliandam, interdum ceu apta tantum conficiendo emplastro materia, vt in emplastro heræ ex duabus aristolochiis.

Si candidum vis emplastrum lithargyri loti & cerusæ ana lib, i. cum olei vnciis nouem coquitur parum diu ob paucum liquorem (coctio enim longa nigredinem affert) sed medicamentum tunc minus est glutinosum, & adhærens: quale vt fiat quidam tere binthinam, vel colophoniam maximè perlucentem miscent, ne colorem vitient, aut medicamēti virtutē, Alii eadem ratione ceram

albam adiiciunt, vt cerusa emplastris mul-
tis ad albedinem cōciliandam miscetur: sic
ad ruborem nimium sinopicum, veteres mi-
scuisse docet Gal. lib. 6. c. ph. g. vt autem fit
fuscum emplastrum, squamma æris additur,
& ignis fit ex tæda loco lignorum, ibidem.

Interdū per se ex oleo coquitur lithargy-
ros ad spissitudinem, tuncque puluerata ce-
rusa spergitur, vt fiat emplastrum album.
Cerusā potest initio misceri, vt sal, & alia
metallica, & terrea, & cū lithargyro coqui
quando nihil ad albedinem cōferet, sed ne-
que ad aliud quā materiā, nisi quod valen-
tius ficcet quo diutius coquitur: sic lithargy-
ros & metallica ac terrea alia.

Lithargyri enim vsus in emplastris du-
plex, si enim nō liquetur, materiæ solidū ha-
bet rationē: si liquetur præterquā quōd cor-
pus glutinosum emplastro præbet, etiā fic-
cat, idque magis quo diutius cocta erit, fitq;
sic medicamentum glutinantius.

Si lithargyros ex oleo coquenda sit, & ei
emplastro addantur mucagines, lithargyrū
prius extra ignem pauco oleo nutrias: dein-
de igni trade, & mucaginē paucam, vt vnc.
duas affunde, prohibebit oleum & lithargy-
rum vri: si non requiritur mucago igni len-
to diu coquatur.

Lithargyros oleo duplo incocta: satis
glut

glutinosum facit emplastrum sine resinoso, aut ceroso corpore, multò magis si triplo.

Si emplastrum recipit lithargyrum, cerum cum vino, aceto, aqua, oleo, vel succo alio fluxili, prius sine igni illa nutriantur in mortario cū pistillo: deinde coquātur igni lento, donec corpus (vt dicūt) sumat, & crassum glutinosumque euadat. Lithargyros enim coquenda diu ex humore aliquo, vt ficans magis, & glutinosum reddat emplastrum. Eadem ratione metallici reliqua, & terrea coctione longa sicciora euadunt, non tamen glutinosa, nisi quæ liquantur. Nam quæ glutinosa prius erant cum his cocta, liquores, gummi, resinae, cera, mel, siccata magis lentorem glutinumque amittunt. Oleum verò lentum, sed minus ob iunctam humiditatem multam glutinosius euadit, vt vetustate siccoctione. Adde quòd fusè coquendo lithargyros, & oleo vnita probè, olei glutinositatem auget, tum quòd in pristinam duritiem non redit, tum quod siccando liquiditatem olei consumit. Vnde etiam citra fusionem lithargyros leuissimè trita, diu cum oleo mediocri subacta, in emplastri formam perducitur, praesertim si id in sole, vel aëre aliter calido fiat.

Contra, ærugo, chalcitis, squamma æris, & similia diu coquantur, vt vites eorum

vehementes coctione longa obtundantur,

Quanti-
tas. Ladanium autem & galbanum, & propolis, & plurima alia vires tantas non habent: quæ obtundendo veniant ob id nihil, aut nimium coquantur.

Lithargyri libr. tres, chalcitheos vnciæ quatuor cum olei lib. tribus, & axungiae lib. duabus coquantur: præstat tamen prius in mortario miscere illa omnia, quam in cacoabo coquantur. Lithargyrus & cerusa ex pari sibi oleo & aqua si coquantur, medicamentum fiet fragile, cuti non hærens, si maiorem liquidorum mensuram acceperint, & ob id diutius coquantur, glutinosum euadet medicamentum. Lithargyros fusa cum aqua & oleo largo blandum, & glutinosum, & album facit emplastrum.

Lithargyri lib. vna ex aceti & olei ana lib. duabus, cocta ad liquationem, glutinosum admodum facit emplastrum, magis si ex vtriusque ana lib. tribus coquatur: quod si vno die toto coquatur, nigrum fiet ac splendens.

Eadem ratione si cum largo vino & oleo liquetur. Viribus tamen maxime variat pro coctionis mensura, & aceti, vini, aquæ, olei varia in differentiis suis natura: quas differentias medicus pharmacopæo in scripturis suis explicare debet. Præstantius autem fiet
hor

horum quodque, si lithargyros ex his liquoribus, vel singulis, vel coniugatis æstate sole calido multum teratur singulis diebus quindecim.

Oleum hyeme largius emplastris miscetur quam æstate, à cuius calore semifusum fit mollius emplastrum, ut à frigore concretum durius, eadem ratio est resinarum liquidarum, aut minus siccarum & ceræ.

Resina aut cera quanto pinguior, humidior, & recetior, tanto parcius tam hyeme, quam æstate miscenda est.

Si medicamentum facturus es simile ac opis unguentis, & ceratis liquidis, oleum sit quadruplum ceræ. Si ad emplastri speciem durum, ceram oleo æqualem misce, maxime si cera sit vetusta & sicca: si verò recēs est ac pinguis, pauciore oleo quam cera opus est, ut ceratum emplastri consistentia fiat, maxime per æstatem: ut si facis ceratū diaphorbi, accipe ceræ drach. 6. olei drac. 6. vel drach. quinque, euphorbi drachmam unam. Quodd si resinam miscebis, ut glutinosius sit medicamentum, oleum minue. Cera enim ad liquiditatem multo pingui eget: resinæ verò si sint aridæ, paucio: si liquida, siccam aliquam substantiam ad emplastri consistentiam postulant. Quantum autem resinæ cerato misceas, coniectabis

experientia. Terebinthina enim triplicata ceræ mista, vide an emplastri habet spissitudinem, si erit siccius, auge resinam: si mollius minue, vel ceram auge.

De propoli eadem quæ de cera ratio, si enim pinguis & recens est, parcius miscenda est ad emplastri formam, si vetus & sicca, largior potest misceri.

Si medicamentum iam cerati habet consistentiam ut emplastrum fiat, ceræ tantum tertia pars vel quarta misceatur: si adeps miscenda est, & ea humidior, ceræ dimidium addendum est.

Si cerā parem miscebis oleo, emplastrū medicamentum fiet aëre temperato. Si vero cera vetus est, & arida, & aër frigidus, paulò plus olei: si autem cera pinguis, & aër calidus, paulò minus olei quàm ceræ, ut ceræ pinguis lib. vni, olei vnc. duodecim, ceræ verò siccæ vnc. tredecim, pro ceræ consistentia, quantitate, & aëris in calido & frigido temperatura. Ut autem pinguedine lenta cuti adhærere possit, resina additur præcipuè terebinthina liquida parte ad ceram tertia, vel quarta.

Quando ceræ miscentur liquabilia, quæ frigida ubi concreuerint solida sunt, pauca cera opus est, ut in basilico tetrapharmaco recipienti ceræ, resinæ simp. colophoniz picis

cis seu taurini pares portiones.

Quando præterea ceræ mista sicca sunt, vt metallicorum pulueres, farinæ, pauca miscetur, vt emp. ex semi. lini. Olei veteris lib. duæ, ceræ vnc. 20. resinæ colophonix, adipis suilli ana lib. 1. & dimid. lithargyri li. 1. cerusæ, & muccaginis feminis lini ana vnc. sex, thuris vnc. quatuor, farinæ tenuissi. vnc. vna. Muccaginis, sem. fceniculi, lini, radi. althææ, & oleum incoquit Paulus in diaphillo, dum bullire desierint, id est ad muccaginis consumptionem.

Ex metallicis præsertim si pauca liquida addantur, statim durissima euadunt emplastra, ob id parua quantitate paranda, præsertim si hyeme paranda sunt, ceræ, olei, adipum, medullarum, gummium, resinarum, butyri, liquorum recentium, & succorum glutinosorum misuram cum ficcis, primam coniectura quadam artificiosa ex singulorum quantitate & consistentia præsumimus: non planè scientes quale crassitudine tandem medicamentum sit futurum: Sed cum mista sint omnia, clarum sit an tenebrius, vel durius æquo sit redditum: quare in secunda compositione diligentius à nobis coniectanda est legitima cuiusque quantitas.

Olei mensura est coniectanda ex his quibus

bus miscetur, & coctionis quātitate, & aëris temperie: nam metallica sunt coquēda diutius quæ siccare sine morſu volumus, ac glutinosiora eſſe, ob id largius oleum requirunt: quod ſi paucum habent, & minus diu coquenda & friabilia ſunt, niſi reſina aliqua coëant. Quod ſi cum oleo & acetovel vino coquitur, quo plus aceti vel olei accipit, eo magis ſiccabit emplaſtrum.

Quæ ladanum accipiunt, non egent cera & contra, quia ladanum ceræ loco ad ſiccorum medicamentorum vnitatem faciendam uſurpatur. Multæ ceræ miſtura medicamenti vim aufert, cera recētiffima molliſſima, pinguiſſima, pauco humore oleoſo eget. Vnus coquendi modus in omnibus emplaſtris nō eſt ſimiliter vtilis, ſed colorē, & ſæpe facultatē immutat. Poſſis enim ceruſam ab initio cum lithargyro coquere, ſed candorem ex longiore coctione perdet, & aſtrictionem, & refrigerationem: magis tamen ſiccabit, ſi cruda iniicitur, contrā, ſi cocto iam lithargyro ad mellis conſiſtentiā, omnia hæc mediocriter.

Coquendi
modus &
ordo.

Dum lithargyrum & alia metallica coquis igni, ſpatha ferrea moue ne vrantur, quod fundum ob inſitam grauitatem promptè petunt.

Lithargyro ad conſiſtentiā cocta addu

duntur adipēs, resinae, gummi, manna, cera, dum cocta adeò sunt omnia, vt digitos non inquinēt, galbanū, & ærugo, & opopanax, aristolochia, panacis radix, chamaeleontis radix, gentiana, myrrha.

Lithargyro ex oleo liquata cera, & terebinthina adduntur, vbi cocta sunt adeò, vt manus non inquinēt, ammoniacū manibus dilatatū additur, deinde lana succida, vsta.

Quod si sepum & mannam thuris accipiat, illa ante ceram miscentur, & assidue mouentur: post vbi mutata erunt & liquata, ceram, & picem aridā, & terebinthinam, donec amplius manus non inquinēt: tunc adde galbanum, post æruginem, & opopanax aceto dissoluta.

Lithargyro ex oleo cocta squamma laeuissima miscetur semper mouendo, deinde chalcites ex vino calido acrimoniā, exuta, vel aceto trita, paulatim miscetur.

Si bitumen, pix, cera, resina, propolis spissato illi addantur, quibus liquatis ærugo, & pyritis lapis ab igni sublato, & modicè refrigerato alumen, galbanum subactū manna iniicitur.

Myrrha, bdellium, thus, opopanax ex aceto teruntur, interdum & ichthyocolla minutim concisa prius, puluis lanæ succidæ, manna, galbanum, extra ignem iniiciuntur.

Ter

Terebinthina & cera adduntur lithargy-
ro ad consistentiam cocto, deinde ammo-
niacum digitis dilatatum, tunc & ærugo &
squamma æris: post hæc ipsum æs vstum, pi-
tyinam, & ceram, post hæc metallica.

Coquendi
finis.

Finis coctionis emplastrorū est, cum sco-
pos prius dictos attigit: consistentiam scili-
cet legitimam cum viribus expectatis, colo-
rem quoque quæsitū ac odorem. Consisten-
tia autem iusta, hoc est crassa, dura, glutino-
sa, & adhærēs cognoscitur, quādo emplastri
portio exēpta, & refrigerata in aëre, marmo-
re, metallo, vel aqua, vel alio, digitos non
inficit, & omnia in vnū probè coierunt: nec
fragile, sed tenax, ductile, rumpi cōtumax,
duritiæ ceræ igni, vel alio calore mollitæ.

Vires autem emplastri expetitas cogno-
sces si quas frangi noluit medicus, integræ
sunt, nec igni dissolutæ, quas auctas vo-
luit, vel fractas, coctione longa, vel alio-
rum mistione auctas & fractas coniectura
quadam colligis, quæ an certa fuerit, expe-
rientia & vsu emplastri probauit medicus.
& tibi postea insinuabit. Ignis ipse non mo-
dò vehemens aut clemens, sed subiectorum
ratione, & diurnitate emplastri, vim aliā
alia mutat: nam vehementior vrit, & deni-
grat: vti & diurnior & fumosus, & qui ex
tedis fit, vel aliis fumum multum & cras-
sum

sum ob resinofam substantiam edentibus,
& in aëre crasso, & nebuloso factus. Contrā
verò clementior coquit, & qui ex lignis fit
ficcis, ac sine fumo, sinceram & splendidam
flammam edentibus in aëre puro.

Lithargyros flamma acri & cōtinua in-
terdum coquitur, interdū igni lento. Probè
coctum est emplastrum diachylon Nicolai
Alexandrini, quando in eo vesiculas ebulla-
re & subsistere videris, cap. eiusdem. 104.

Pyxide rubra quædam, alia lignea, alia *Repositio.*
pelle excepta reponuntur, ferè tamen ho-
die Democratis exēplo li. 5. c. ph. g. *μαρσα-*
λίας manibus facimus, quas papyro circun-
damus.

Emplastrum diachylon commune Mesuæ sic *Diachylō*
fit, lithargyri tenuissimè triti, & à plumbo, & album.
scoria purgati unc. una & dimidia, cum olei an-
tiqui clari unc. tribus in mortario * lapideo
pistillo ferreo diu conquassetur & agitetur, * reo ho-
post igni lento coque, rudicula semper mouen- die.
do, donec lithargyrum crassescat: tunc igni au-
fer, ut paulatim frigescat, sine. Interim unc.
tres muccaginis ex semine lini, & sanigræ-
ci & radice maluæ, extractæ parum feruesac,
deinde illam paulatim lithargyro & oleo pro-
bè pistillo ligneo permisce: postremò percoque
omnia simul ad iustam spissitudinem. Si uis irac-
tum

Si puluerẽ tum facere, misce, aut oleum irinum pro com-
 ireos mi- muni, aut pulueris ireos unciam unam in lib. sin-
 sceas oleũ gulas, si addatur muccago, se. meliloti, anodynum
 aliquot e- magis euadet.

tiam tum
 miscendũ.

Hodie sic paramus, sunt qui semina lini
 & fœnigræci purgata sordibus, & radicem
 maluæ mundam & contusam nonnulli tri-
 duo aqua macerant, super prunas clemen-
 tes, deinde semper mouendo coquunt ad di-
 midias, & colant. Eius colati libram vnã
 cum oleo aliquantisper coquunt, postea
 puluerem lithargyri miscent, & continen-
 ter rudicula mouentes coquunt, donec bul-
 las & stridorem edere desinat, seu donec
 marmori vel aquæ frigidæ infusa portiuncu-
 la & refrigerata idoneam habere consisten-
 tiam videatur.

Si lithargyros & oleum diligenter sint
 abluta, multò albius erit emplastrum. Ni-
 colao Alexandrino recipit olei veteris vnc.
 42. lithargyri vnc. 36. radicis maluæ agrestis,
 & ibisci, fœnigræci, seminis lini ana vnc. 12.
 radices & semina in aquæ phialis tribus tri-
 duo infusas, igni lento coque ad dimidias,
 cola: expressi libram vnã cum oleo ali-
 quandiu coque, dein puluerem lithargyri
 quantum satis est incoque semper mouendo:
 dum percoctum erit, hoc est, dum vesiculas
 bull

bullare & subfidere videris aufer igni: dum
refruxerit, conde. Lithargyrum cum oleo vi
di diu agitari in mortario metallico pistillo
ferreo, abluit: sed dum ignē attigit, nigrui,
maximē vt diachylo ineptissimū videretur.

Lithargyrum vbi in vas igni inpositum
miseris, oleum paulatim affundatur, semper
miscendo pistillo ligneo vbi probē erunt
mista, partem meliorem muccaginis affun-
de & coque, dum ea videbitur cōsumpta: re
liquorum paulatim adice semper mouēdo.

Cum autem lithargyrum promptē vra-
tur motu per spatham ligneam latam assi-
duo est opus, qui eam à fundo vasis separet:
ignis prater eā sit blandus, & affundatur vt
dictum est, muccago.

Album autem fiet vt vulgò expetitur, si
muccago parū habeat se. fœnig. id enim lar-
gius flauum facit emplastrum, addunt non-
nulli salem paucum initio extrahendæ muc-
caginis, vt clarior & albior sit. Lithargyros
item benē lota aqua cōmuni vel salsa, albe-
dinē addit, & coctio mediocris. Nā multa
& vstioni propinqua flauitiem & ruborē &
nigrorem impartit. Si verò violēta est flam-
ma, etiam mox nigredinem dat lithargyro.

*Empl. diachylon magnum Mesuæ recipit li- Proportio
thargyri puri, triti & creti unc. 12. olei irini, lithargyri*

D

ad oleum anethini, chamæmelini ana unc. octo, muccagi-
 bic eadē, nis, seminis lini & scængræci, & radicis althææ,
 quæ prius. & ficuum pinguium & uuarum passarum, succi
 ireos, & scille, æsypi, ichthyocollæ ana drach.
 duodecim & semissem, terebinthinæ unc. tres, re-
 sinæ, pini, ceræ flauæ ana unc. duas, compone ut
 diachylon commune.

Ichthyocol-
 la etiā pi-
 scis est.

Muccagines vt prius emulgeantur, oleo-
 que lithargyros in mortario vel vase in quo
 coquenda est diu ante coctionem nutriatur
 semper mouendo, deinde igni lēto coqua-
 tur, dum crassescere incipit muccago paula-
 tim affundatur, hac propè cōsumpta igni au-
 feratur emplastrū, affundatur succus it eos &
 scillæ, & ichthyocolle glutinis muccago, cū
 vino et aqua simul mistis & coctis extracta.
 His consumptis coctū est emplastrū, & cera
 minutim secta & pini resina miscendæ his li-
 quatis, terebinthina & æsypus extra ignem
 miscenda, quia coctionem non sustinent.

Empl. de muccaginibus spurium recipit muc-
 caginem, sem. lini & scængræci, & althææ, & me-
 dian corticis ulmi ana unc. quatuor & semis-
 sem, olei, liliorum, anethi, chamæmeli ana unc.
 unam, Ammoniaci, galbani, opopanacis, sagape-
 ni ana unc. semissem, ceræ nouæ unc. uiginti, te-
 rebinthinæ uncias duas, croci drachmas duas.

fac

fac emplastrum.

Muccagines vt dictum est extrahantur cor-
tice vlini medio benè prius cōtuso, eadem
oleis incoquendo consumantur, olea resi-
dendo purgentur, vel linteo sine expressio-
ne colentur: his calentibus cera particulatim
secta liquefiat, & liquores isti quatuor ace-
to * soluti, & linteo colati cerelæo calido
misceantur: postremò extra ignem terebin-
thina probeque omnia commisceantur, &
caue ne ingrumos abeat. Crocus tritus mar-
mori inspergitur & manibus fingēdo mag-
dalias immiscetur.

*uel cha-
mæmeli
& melilo-
ti decocto.

Empl.de meliloto Mesue recipit, meliloti unc.
sex, florū chamæmeli, se. sarnigræci, rad althææ,
absynthij, sampsuchi, baccarum lauri ana drach.
tres, cardamomi, cyperi, ireos, cassiæ, spica nar-
di, seminis apij, ameos, anisi ana drach. duas &
semissem, ammoniaci drach. decem, styracis, bdel-
lij ana drach. quinque, terebinthine unc. unam
& dimid. ficus pingues duodecim, sepi hircini, re-
sina ana unc. duas & semissem, ceræ unc. sex, olei
sampsuchini & de spica ana. q. sufficit insunden-
dis & extendendis omnibus.

Vt ana un-
ciam unā.

Sepum hirci colatum refina, cera in oleis
liquentur, ficus pingues aut parū humecta-
tæ probè tritæ per mantile, aut stamen, aut

D 2

cribrum setaceū cernantur, prædictis misceātur, deinde ammoniacum & bdellium in aceto soluta & colata. postea terebinthina, postremò vbi refrixerit, pulueres creti radicū, herbarum, florum, aromatum, & simul cum his styrax per se diligenter tritus. Si verò ficus essent pauciores, & puluis largior, nec is cernendus, possunt hæminutim cōcissæ cum aliis teri, baccae lauri excorticandæ. Sunt qui Ammoniacum & bdellium aqua (cui melilotus, chaniæmelum, & fœnumgræcum sint incocta) dissolui malunt, ut emplastrū fiat emolliens magis: sed aqua illa ægrius soluuntur: quàm aceto essentia tenuitate promptius ipsa tota penetrante & dissolvente.

Empla- Empl. ceroneū Nicolai recipit picis naualis
strū cero- colatæ, ceræ ana unc. duas, & drach. tres, sagape
ma Nico- ni unc. duas, ammoniaci, terebinthinæ, colophonie,
laus Ale- croci, ana unc. unam, & drach. tres, aloës, thuris,
xādrinus. myrrhæ ana unc. unam, opopanax, styracis, gal-
 & primæ bani, mastiches, aluminis, sœnigræci, styracis ru-
clafis dra bri, bdellij ana drach. tres, lithargyri drach. unā
ch. 7. 2. & dimidiā, sagapenū, galbanum, opopanax, am-
drac. 6. ter moniacum fracta uel potius incisa uino tecta no-
tie. 4. ste macerentur: coquantur ad uini dimidij con-
quartæ. 3. sumptionem, colentur, tunc picem colatam mi-
 sce,

ſce, ſpathula moue, hac liquata ceram: qua fuſa quintædu-
colophoniam colatā, poſtea ſtyracem piſtillo caſ & gal-
lido tritum fruſtatim adde: hinc maſtichen, thus, banum, ex
myrrham: bdellium, trita, creta aliquandiu poſt qua bdell-
iniſce, terebinthinam, alumen, lithargyrum, ſœ- liū & con-
num græcum percoctum affunde in aquam frigi- ſitentem
dam, extracto aquam omnem manibus exprime ideſt ſty-
cum puluere, aloës ſuper marmor oleo laurino riacem ru-
unctum ſubige, cum puluerato croco finge offas brā in ſex
manibus eodem oleo unctis. tam ſepa-

Sed Nicolaus Alexandrinus lithargyrū ret drach.
tenuiſſimè tritum, cum oleo quantum ſatis una utri-
eſt. percoquit, deinde picem addit: hac liqua uſque con-
ta, ceram, aqua fuſa lachrymas colatas, am- tētus ut li-
moniacum, ſagapenum, opopanacem, galba thargyri
num, ſtyracem vtrunq; , terebinthinam, & drac. dimi
ſpatula probè miſcet. Hinc colophonie, thu dia.
ris, maſtiches, bdellii, aluminis, myrrhæ, ſœ-
nigræci, puluerem paulatim miſcet, vbi per-
coctum eſt, in aquam iniicit. Ceroma autem
propriè oleum quo luctaturi ſe perfundūt.

Hodie melius picem & colophoniam li-
quatam colant, ceram in ea liquant, ſagape-
num, ammoniacum, galbanum, opopana-
cem, bdellium, vino ſoluta & collata co-
cta que ad vini propè totius conſumptionē,
paulatim miſcent, deinde terebinthinam,
poſtremò puluerem reliquorum tenuiſſimè

tritorum & cretorum, crocum verò inter subigendum super marmor & oleo manus vngunt, ne his emplastrum adhæreat. Vel potius liquoribus, vt dixi, coctis particulatim miscetur cera, resina, colophonia liquata, vel cera particulatim iisdem miscetur: & hac fusa, reliqua duo liquata paulatim miscentur: sic enim citius & perfectius in corpus vnũ coeunt. Si verò simul vel liquores ceræ, pici, colophonix, vel cōtrà liquoribus, ceram, picem colophoniam affatim iniicis, liquores fundum ob grauitatē petentes vrētur: & cū aquosi sint ægrius, aliis pinguibus summum leuitate sua petentibus miscebuntur: nisi fortē tandem iam vel vsti vel semiusti. Vide diligenter, ne aloë, & myrrha vrātur, & grumosum reddant emplastrum.

Alii secreto quodam modo Ammoniacum, sagapenum, opopanacem, galbanum, bdellium vino soluta, cocta ad emplastri cōsistentiam, terebinthina paulatim mista sine igni remolliunt, non modo in ceroneo hoc, sed etiam emplastro præcedenti de meliloto & aliis, deinde liquatam ceram cum pice & colophonia miscent, postremò reliqua.

Nico Ale Empl. oxycroceum Nicolai recipit picis naturalis, croci, colophonix, ceræ ana unc. quatuor,
ter

terebinthinae, galbani, ammoniaci, myrrhae, ma- ma classe
stiches, thuris ana unc. unam, & drach. tres: Gal unc. duode-
banum & ammoniacum aceto nocte una mace- cim, in se-
rentur, postridie liquantur igni, colantur, iterum cunda. 4.
coquuntur ad partis aceti consumptionem: addit aceti phia-
tunc picem naualem colatam, hac fusa, ceram, lam unam
qua liquata colophoniam, deinde terebinthinam miscet.
aliquandiu post mastichen, thus, myrrham, sem-
per spatula mouendo. Cocta in aquam frigidam
immitte, manibus hanc totam exprime, super
marmor oleo inunctum cum puluere croci molli,
& offas finge.

Alii picem naualem colatam, colopho-
niam ceram liquant, his adhuc calidis galba-
num & ammoniacum in aceto dissoluta &
colata miscent. His coctis mastichen, thus,
myrrham, postremo terebinthinam, & ubi
iam refrixit manibus mollendo & subigen-
do super marmor, puluerem croci confun-
dunt: hyeme vero addi potest olei unc. una
ob emplastri ficitatem.

Nicolaus Alexandrinus picem cum par-
te aceti, in olla noua coquit ad aceti consum-
ptionem, cum reliqua ammoniacum, thus in
mortario terit & soluit, & coquit semper
mouendo, cauens ne acetum exiliat. Cum
acetum est consumptum, galbanum, myr-

rhama, mastichen addit, his feruefactis crocum pulueratum miscet, deinde in mortarium fundit, & fingit magdaliones. Sed modi alii placent magis.

Oxycroceum vocatur ab aceto macerante, galbanum & ammoniacum & croco largiore. Nā eius vncias quatuor recipit, ceroneum verò tantum vnciam vnā & drachmas tres. In ceroneo præterea liquores vino macerantur, cætera multum conueniunt, sed illud valentius, hoc propter crocum largiorem sumptuosius, quem variè minuunt. Ob id vt vilius sit, croci vnc. tantum duas hodie miscent, dolo parum malo cum crocus vires medicamento maiores non largiatur, quàm ceroneo, vt causa sit nulla, cur hic adeò augeatur sumptu parū necessario, nec viribus adeò æstimandis.

Empl. de Ianua Nicolai recipit succorum apij, plantaginis, betonice ana lib. unam: cere, picis, resinæ, terebinthinæ ana lib. semissem, forma emplastrum.

In succis his reliqua tria sunt igni lento coquenda, & continenter mouenda ad succorum consumptionem, postremò terebinthina mista semel, aut bis feruefaciēda. Alii terebinthinæ partem dictis simul incoquūt, reliquam extra ignem miscent, vt siccitatē ali

aliorum emēdent, sicq; formam emplastro meliorem impertiunt. Succos per se in sapas coquerem potius, deinde liquatis aliis miscerem. In neutro Nicolao inuenio hoc emplastrum, vt neq; tria sequentia: sed tantū ex his ceroneū, oxycroceū, apostolicum.

Empl. gratia dei Nicolao recipit, terebinthinæ lib. semissem, resinæ lib. unam, ceræ unc. quatuor mastiches unc. unam, uerbena, pinpinella, betonica ana manipu. unum, herbæ hæ tusæ ex uino albo ualenti coquantur, ad uini tertiæ partis consumptionem, cola, herbarum substantiam abijce, in colato cera, resina, mastiche coquantur ad corporis idonei constitutionem, aufer igni, terebinthinā adde, spatula moue, fac emplastrū.

Herbæ hæ recentes incisæ, tusæ in vino albo potenti ad sui dissolutionem percoquantur, colentur, in colato vini reliquo cera & resina ad colati propè consumptionem coquantur: tūc mastichen adde, postremò terebinthinam, semel feruefac, aufer igni, ubi refrigit finge in offas cylindrales.

Alii in colato resinā solam coquant: hoc propè consumpto ceram addunt, postremò terebinthinam extra ignem, & ubi refrigerari incipit, mastichen pulueratā permiscēt. Vterque hic modus, quā Nicolai est præstantior, quod mastiche coctionem non su-

stineat ob essentiae tenuitatem.

Hodie ut sit albius, addita paulò largiore terebinthina trahunt modo penidiorum.

Empl. ad berniam Nicolao recipit picis naturalis, aloës ana uncias tres, lithargyri, ceræ rubræ, colophonie, galbani, ammoniaci, ana unc. duas. Visci à quercu uncias sex. Boli armenie, utriusque symphyti, gypsi utriusque aristolochie, lumbricorum terræ, gallarum ana uncias quatuor, myrrhæ, thuris ana uncias sex, terebinthinae unc. duas, sanguinis humani lib. unam. Pellis à ueruece mox ubi ablata est, horis. 24. coquatur, deinde expressa pelle & abiecta uiscum quernum in hoc iure diu coctum ubi fuerit, igni auferatur, addaturque terebinthina, lithargyros, colophonia, hinc mastiche, thus, myrrha, galbanum, ammoniacum, lumbrici terræ paulò post symphytum maius & minus, gypsum, bolus armenia: igni tunc redde, & adde sanguinem humanum, aristolochiam longam & rotundam, postremo aloën, semper spatula agitando, impone marmori, quod oleo uiolato inunxeris & manibus subige. Iterum biduo aut triduo in mortario continenter teratur.

Aliud est In decocto prædicto pellis aretinæ recē-
Arnoldi tis visci baccae ad sui dissolutionem perco-
Villanova ctæ, colando expressæ abiiciuntur, additur
 li

lithargyros, aliquāto post cera, pix, colopho-
nia, coquendo semper mouenda ne vrantur:
coctis his, & aqua prope consumpta, galba-
num ammoniacum, vino soluta & creta,
myrrha, terebinthina, ab igne depositis, sed
adhuc calentibus, thus mastiche, lumbrici in
vino purgati & vino alio probè seorsum co-
cti. Tempore nimis durescit, nisi addatur
oleum. Alii post colatum visci extra ignē
addunt ceram, colophoniam terebinthinā,
aliquantō post iniiciunt liquores dissolu-
tos, colatos, coctos, vt saepe dictū est. Lithar-
gyros, gypsum, thus, myrrha bolus armenia,
sanguis humanus &c. teri habilia.

Empl. diuinum Nicolai recipit galbani, myr-
rha ana unc. unam & drach. duas, ammoniaci
uncias tres & drach. tres, opopanacis, mastiches,
aristoloch. longē. æruginis ana unc. unam, lithar-
gyri & olei communis ana lib. unam & semis-
sem, cere nouæ unc. octo, thuris unc. unam &
drach. unam, bdellij uncias duas, magnetis unc.
tres, misce omnia ut decet.

Lithargyrum cum oleo diu ante coctio * Id quod
nem nutriatur, postea ad spissitudinem vsq; ei cito,
* coquatur: tunc adde ceram minutim con- quia pati-
cisam: qua liquata aufer igni, & adde gal- cum est o-
banum, ammoniacum, opopanax, bdell- leum, acci-
liū, si molle est in aceto vel vino dissoluta dit.

&

& colata & cocta: deinde puluis myrrhæ, bdellii, si est siccum, mastiches, thuris, aristolochie, magnetis: postremò ærugo, ne si diu coquatur, emplastrum fiat rubrum, sit tamen medicamentum adhuc valde calidum, alioqui, ob ipsius solidam duritiæ ægre permiscerentur omnia. Si verò flauū vis semiuistam æruginem impone, vel coquendo talem reddes: si rubrū (quale Narbonensis Gallia præfert) eius æruginis drach. duas, vel quatuor dum coqui cœpit lithargyros immitte, reliquas eius drach. in fine, si non vis ita coloratum, totam misce postremum.

Emplastri forma per coctionem fiunt hodie vnguentum tripharmacum, & vnguentum de cerusa.

Empl. apostolicum Nicolai recipit, lithargyri unc. sex, ceræ mauricæ, colophonie ana unc. duas, propoleos, uisci querni ana unc. unam, ammoniaci, cadmiæ lapidis ana drach. sex, masti-

** Prasij uiches, thuris ana unc. semis. terebinthine, bdellii ridis Niopopanacis, galbani, myrrhæ, sarcocolle, æris tol. Alex. usti, squammæ æris, æruginis, dictamni, aristolocætera cōchia rotundæ, *mumiæ ana drach. tres.*

sentit, nisi Lithargyrum & oleum diu simul nutrita, coquuntur, semper mouendo ad emplastrum consistentiam, seu donec scutellæ imposita, ceræ, aut mellis modo coacta sint: tunc

ce

cera, colophonia, mastiche, thus, myrrha, bdellium, propolis, viscum quernum, terebinthina in his quo scribuntur ordine liquetur. His fufis igni auferatur, adde paulatim: ne efferueant liquores, ammoniacum, opopanacem, galbanum dissolutos aceto aut vino, colatos, coctos ad aceti aut vini consumptionē, vt dictum est, recoque, deinde pulueres sarcocollæ, cadmiæ lapidosæ, æruginis, squammæ æris, æris vsti, dictāni, aristolochiæ, dum erit percoctum, hoc est aquæ frigidæ portione iniectum duratur, & digitos tractatu non inquinat glutinoso adhæsu, tūc totum aquæ frigidæ iniiciatur: dū refrixit, exemptum manibus, oleo laurino inunctis, fac magdalias. Nicolaus Alexādrinus lithargyro, cum oleo ad emplastri consistentiam percocto, ceram, galbanum, terebinthinam propolim, colophoniam seorsum & modico interuallo addit: postea, æs vstū, cadmiā commiscet, probè semper feruefaciendo, deinde opopanacem, ammoniacum, bdellium, viscum, myrrham, thus, mastichen, sarcocollam, squammam æris cum paucō aceto trita in mortario, & in lactis formā deducta miscet, & coquit spatula certatim mouēdo.

Empl. de uigo recipit olei chamæmeli, anethi, de spica, de lilio ana unc. duas, adipis porci vitul.

an

ana lib. unam, euphorbij drach. quinque, thuris
drach. decem, olei laurini, fescunciam, adipis ui-
peræ unc. duas & semissem, ranas uiuentes sex,
lumbricorum in uino lotorum unc. tres & semis-
sem: succi radicum, ebuli & enulæ ana uncias
duas, schœnuanthi, stæchadis, matricariæ ana ma-
nip. unum, uini odoriferi lib. duas, coque omnia
simul ad uini consumptionem: coletur. colato ad-
de lithargyri aur. lib. unam, terebinthine claræ
unc. duas, cum cera alba, fiat ceratū, aut unguen-
tum, addendo in fine, styracis calamitæ fescun-
ciam, & igni ablatum pistillo tribuletur, donec
tepidum erit, tunc adde argenti uiui salina extin-
cti unc. quatuor, misce diu pistillo.

Hoc emplastrum ascripturus non eram,
quod argentum habeat viuum à cuius usu
omnium maximè abhorreo, propter noxas
à prioribus designatas, à recentioribus expe-
rientia quotidiana plusquam vellent cogni-
tas. Sed publica vtendi eius consuetudo, ne
omitterem effecit, accessit ad id Petri Gru-
sellii olim mihi in re medica condiscipuli,
nunc verò medici longè præstantissimi, elo-
gium de hoc emplastro à se non semel ma-
gnis successibus vsuipato in articulorum &
reli quarum partium neruosarum doloribus
etiam hæreditariis, non solis Hispanā luem
cōcomitātibus in corporibus carnosiss.

ra

ra composita medicamēta describere, mihi
 visum nō est, quod etiam in his multa idem
 promittunt, & præstant, ob idq; ociosa vide
 ri possint. Integrum autem cuius docto, vel
 noua adiicere, vel ex his quædam expunge
 re, aut saltem mutare, vt simplicibus cōstet,
 vel pluribus, vel paucioribus, vel non idem
 pollentibus. Huc pertinet quod nullo nego
 tio quiuis potest ex Mesue & Nicolao Ale
 xandrino potius quā ex Salernitano quoties
 opus erit, alia corrogare. Nobis hoc labore
 suffecit experiri quid hac in re aliquādo præ
 stare poterimus. Quapropter paucis singu
 la tantumque leuiter perstrinximus, cum
 plurima superaddere nobis licuisset, nisi vo
 luissemus prolixitate auditorem deterrere
 nouitium vel obruere. Est autem id totum
 velut imago quædam rudis tantum eorum
 quæ post scribemus: sed paulatim mihi phar
 macopœi sunt melioribus assuefaciendi, vt
 postea non fugiāt maiora. Cum non igno
 rem in horū facie plurimos omnino & indo
 ctos, & rerū omnium imperitos, & stolidos,
 dicam audacius, & maleficos, & haud dubiè
 veneficos, qui hunc laborem nostrum accu
 sabunt tanquam parū vtilem, imò noxium,
 scio calumniabuntur, quod hactenus mise
 ris mortalibus ægris rectè esse consultum
 per Arabicæ familiæ placita planè mentien
 tur.

tur. Sed hi non ita multò post etiam inuiti intelligent quàm fuerit in hũc diem iniqua ipsorum conditio, & volent nō volent, sub nostra hæc præcepta cogentur, ne frugibus inuentis glandes defendere amplius illis liceat. Intereà verò quia nihil suis his cum amaracino vnguento est, musis & purioris pharmacopœetices studiosis scribo id quantum quantulum est: quod oro manu grata accipiant, & secum repetent, quam non fuerit facile rem hætenus intentatam excitasse. Id quod iudicare facillimum his est, qui scripta sua aliquando publicarunt multo studio, cura, industria, vigiliis, ingenii summis viribus comparata. Qui verò nihil adhuc ediderunt, ignari nostrorum laborũ, ad calumnias sunt propensissimi, sed hæc seges ingratos tulit, & feret omnibus annis. Hisque ingratis seruire nephas est, vt est apud poëtas. Boni igitur consule: & fronte non ingrata sume lector candide nostrum hoc tirocinium, intereà dum huius medicinae partis specimen apparamus, longè pulcherrimum, foecundissimum posteritatis memoria dignissimum.

FINIS.

INDEX RERVM
NOTABILIVM, HV-
IVS OPERIS, NVNC
PRIMVM AD-
DITVS.

A



Cacia no-
stras qui-
bus rebus
constet

197

Acacia nostras quando
bona 74

Acetum album nigro
valentius 71

Acetum scillinum 326

Acori radicū notæ 37

Adeps 94

Aegypto aquā nili tur

bidam uasis figulinis

crudis colari docet

Gal. 234

Aeromeli uel Mannæ

electio 72

Aerugo sincera 88

Aerugo citra coctionē
terato mista empla-
strum facit uiridem
404

Aerugo 87

Aes ustum ibidem

Affectibus hepatis pul-
uerata tenuiter de-
bentur 151

Tenuius lienis ibidem

Tenuissimè renum &
uesticæ affectibus ibidē

Agaricū quale sit opor-
teat 38

Aloë optima 74

Aloë decocto aromatiū

imbuta siccatur 179

Alumen scissile 190

Ambar describitur 84

*

INDEX.

Ambra	95	Antidotus exhilarans	
Amilum faciendi mo-		Gale. adscripta	346
dus	177	Antidotum catholicum	
Ammoniacum	78		348
Ami	55	Antidotum diapheni-	
Amomum describitur		con-Mesue	351
ibidem		Antidotum hamech a-	
Amomum quale lauda-		pud Mesuen	352
tur	ibidem	Antidotum benedicta	
Amygdale ut proben-		Nicolai	314
tur	57	Antidotum hiera dia-	
Amygdale que impro-		colocynibidos	355
bantur	ibidem	Antidotum philis	
Anacardi notæ ibidem			356
Anisum	55	Antidotum de baccis	
Animalium partium		lauri	ibidem
tritura	133	Apozematum sectio	
Animalium partes du-		quarta	349
re, uste, uel rasa, uel		Apri dentes limandi	
limata per se terun-			134
tur	136	Lucij	ibidem
Animal purgante me-		Elephantis	ibidem
dicamento de postum		Aquam uino mixtam	
lac reddi phlemago-		hederaceo uase extra	
gum	126	hes	ibidem
Antidotus diābra Me-		Aqua uini diu seruatur	
sue	345	quare	247
			Aq

INDEX.

Aquam Cicerum secun- scriptio 58
dam cur capiamus in Bdellium quid 83
Mesue dictū 299 Quale eligendū ibi-
Arborum fructus qui dem
fiant purgatrices 114 Quomodo adultere-
Aristolochie radices tur ibidem
quando legenda, & Bolus armenia. 93
quando effodiende
39

C

Armenius lapis 91
Aromata 97 **C**Admia fornaca-
Aromata quedam qua ria 89
industria humectes Cadmia lapis ibidem
docet Mesues 181 Cadmia, lapis calami-
Aromatizatio quid no naris uulgo dicitur
bis uocatur 234 ibidem
Aromatizatio ad quid Eius usus ibidem
ibidem & 236 Calamus aromati of-
Aromatizatio diuersa ficinarum tamen si di-
rum rerum 235 uersus à uero cala-
Arsenicum quid. 86 mo aromati. easdem
habet uires 69
B Calami aromatici de-
scriptio 40
BAlaustium diu te Calefactionis scopi ua-
ri debet 123 rij 173
Balani myresticæ de- inde ad longum

INDEX.

Calidas modicè damus	plenam trituram su-
poriones medicas 175	stinet 148
Calor moderatus co-	Centaurij magni radix
Etionis autor esse po-	40
test 209	Cera omnium facilli-
Calore mollescunt quæ	mè liquatur 173
171	Cera bonæ notæ 72
Cantharides 96	Cerussa 89
Cancrorum præpara-	Ceratum quid 391
tio 115	Ceratum Gale. refri-
Cancami 81	gerans quæ recipiat
Caphura ibidem	392
Capparidis flos ut in usû	Ceratum santalatum
uenit 123	Mesue ibidem
Carpobalsamum 60	Ceratum Gal. stomachi
Cassia fistula ibidem	cum ibidem
Caryophyllum lauda-	Ceratum Gale. stoma-
tur quale 50	chicum alterum 393
Cardamomum ut opti-	Ceratum stomachicum
mum 56	Galen. ex Nicolao
Cassutha ut lecta minus	ibidem
marcescat 52	Chalcitis 88
Cassie delectus 70	Chalcanthum ibidem
Castorium 95	Chaphura 138
Centaurij parui flores	Chrysocolla 91
51	Cinnamomi electio 69
Centaurium paruum	Citrium & Arantium

miq

INDEX.

- malum 59 & inde ad longum
 Clarificatio quid & Coctionis & tritura re
 quare fiat 227 tio propè est eadem
 Clementer friāda, quo 216
 rum uirtus attritu uio Colatio cribationi est
 lento promptè exha- persimilis 230
 lat 143 Colationis differentie
 Coagulum qui euadat ibidem
 efficacius 114 Colamus quedam citra
 Coccum gnidium 60 coctionem 233
 Coctio medicamento- Colis tribus usi sunt ma
 rū quomodo fiat 208 iores nostri 231
 Humor cui incoquun- Eorum differentie &
 tur ut plurimum aqua usus ibidem
 est 194 Colorationis cause
 Coctionis aliquot exem 236
 pla 211 Coloratio multarū re-
 & inde ad longum rum 237
 Coctio non solum ignis Colocynthis & centau-
 sed etiam solis calore rium plenam coctio-
 fit 210 nem tolerant 218
 Coctionis instrumenta Quæ contra ibidem
 omnis generis sint ua- Colocynthis quomodo te
 sa 213 ratur 138
 Coctionis finis 214 Colocynthydis medulla
 Coctio diuersarum re- 59
 rum 215 & 216 Colocynthis septembri

INDEX.

legitur	79	Conditura quarum re-	
Colo magnitudine et		rum fit	249
textura mediocri uti		Et quibus rebus fiat	
mur in presentia	232	ibidem &	250
Colocynthis accuratis-		Condienda quomodo	
sime debet teri	148	cōdiantur	250 & 251
Colore iudicantur me-		Coni optimi	58
dicamenta	4	Coquimus medicamen	
Colorum differentie		ta cur	211
ibidem		Conseruationem nihil	
Conditura multarum		tam uiciat quam pu-	
rerum	299 & 300	trefactio	243
&	301, 302, 303,	Cortex radicum asari	
304		42	
Conditura seminum &		Corticum delectus	69
aliorum quorundam		Corallus lapis	92
304 & 305, & 306,		Corticum tritura	131
& 307		Costus	41
Conditorum sectio pri-		Crassum quid	13
ma	296	Cribrationis ratio ea-	
Confricationis usus ua-		dem est quæ tritura	
rius	194	160	
Confricatio rerum in-		Cribrationis differen-	
fusarum aut etiam		tie multe	161
costarum colationem		inde ad longum	
& expressionem ad-		Crocus optimus	51
iuuat	192	Crocum nouo quodāmo	
		do	

INDEX.

do terunt	139	da	206
Cuminum unde bonum	55	Destillatio quid ibi-	
		dem	
Cupressi pilulae	59	Destillata uapore a-	
Cnici semen	56	que calentis uires &	
Cucumeris agrestis fru-		qualitates integrus	
ctus	60	retinent	207
Cubebe	ibidem	Destillantur que plum	
Cydonia	59	bo omnino improban	
Cyanus.	91	da	ibidem
		Despumatio quid	223
		Detergens quid	14
		Diamorū quousque co-	
		quamus	215
D A&yli qui pro-		Diaphœnicon antido.	
bandi	61	Mes.	351
Delectus medicamen-		Diaprunū simplex Ni	
torum symplicium un-		colai	349
dè sumatur	12	Diasatyrion	297
Delectus corticum	69	Dictamni uires & de-	
Delectus cassiæ	70	scriptio	41
Densum quid	13	Dissolutio quid	165
Densum per metapho-		Dissolutio tritura que	
ram	ibidem	dam esse uidetur	
De calefactione qua-		165	
tenus tractet	174	Dissolutionis cause mul	
Destillationis instru-		te	ibidem
menta unde peten-			

INDEX.

Diffolutionis plurimæ differentiæ 167	Elegmatum sectio ter- tia 337
Inde ad longum	Elegmatum materiæ ibidem
Doronici radix qua- lis 41	Electariorum tracta- tio 340
Dracunculi radix quæ do legenda ibidem	Electarium diacnicum 357
Duratio mollitioni cõ- traria & in quibus fit nobis in usu 171	Electarium de succo ro- sarum 358
Quibus fiat ibidem.	Elect. diarhodon abba- tis Nicolai 359
E	Emplastrũ gratia dei Nicolai 425
Laterij notæ ex quo petendæ 75	Emplastrum ad her- niam 426
Electarium aromati- cum rosatum Gabrie- lis apud Mesuen 360	Emplastrum diuinum Nicolai 427
Elect. diamargariton frigidum ibidem	Emplastrum apostoli- con Nicol. 428
Electa. diatrion sancta- lon 361	Emplastrum de Vigo 429
Elect. diatragacanton frigidum ibidem	Emplastrum quid 394
Elect. diairis simplex Mesue 362	In emplastra que re- cipiantur ibidem
	Emplastrum, album quo

INDEX.

- quomodo fiat 404 & quid reuera sit ibide²
 405
 Emplastra, quæ reci- Eryngij radice condi-
 piunt ladanum non e- tum 296
 gent cera 412 Et quomodo esse opor-
 Emplastrorum coctio- teat antequam con-
 nis finis 414 diatur ibidem
 Emplastrum diachylon Esule minoris radice
 electio 42
 415 Euphorbij electio 77
 Emplastrum diachylon Euphorbii Nouitij in
 magnum Mesue 417 festum 140
 Emplastrum de mucca Extinctio cur fiat 268
 ginibus spurium 418 & 269
 Emplastrum de meli- Expressio quid 191
 loto Mesue 419 Expressione diuersi mo-
 Emplastrum ceroneum di ibidem & 192
 Nicolai 420 Extractio succorum tri-
 Emplastrum oxycro- tura constat & ex-
 ceum 422 pressione. 196
 Cur oxycroceum uo-
 cetur 424
 Emplastrum de ianua
 Nicolai ibidem
 Epithymum Barbarum
 quæ lectum minus ci-
 to marcescat 52
 Epithymum Græcorum

F

Fartura conditu-
 ra quedam dif-
 ferentia est 258
 Et quando fiat ibi-
 dem

INDEX.

Figura ad medicamen	rendus	123
ti delectū maximè ne	Florum nullus coctionē	
cessaria	5 recipit	219
Ficus passæ habentur	Flos capparis ut in u-	
præstantissimæ	61 sum uenit	123
Eorum descriptio ibi	Fornacaria cadmia	89
dem	Forma medicamento-	
Ficus uitiosæ quæ	62 rum	239
Fistula cassiæ	60 Friabile quid	14
Florum delectus	49 Frixio ferè in sartagi-	
Flores centaurij par-	ne fieri intelligitur	
ui	51 254	
Flores ubi reponantur	Et quomodo res mul-	
39	te frigantur ibidem	
Flores quando legendi	et 255. et 257	
49	Frigendi modus	256
Flos balaustium	50 Fruticose herbe dum	
Flos nymphææ	52 sunt semina prægnan-	
Flores uix per annum	tia, demetendæ	30
seruari possunt	54 Fructuum delectus	56
Flores quomodo per an-	Fructus externi præ-	
num seruantur	248 stantiores habentur	
Flores siccati parū diu	ibidem	
terendi	122 Fructuum cōmunes no-	
Florum multorum no-	te	58
mina	ibidem Fructus immaturi ad	
Flos camomillæ diu te-	maiores astringentē	
	clib	

INDEX.

clibano siccatur 180	ptimus ex Creta 78
Fruetus Syrupis conuenientes 309	Graue quid 13
Flores ibidem & 310.	Gummiu delectus 80
	Gummi oleæ Aethyopice 81
	Damnatur quale ibi.
	Gummi iuniperi ibidem
G	Gypsum. 90
G Alla quæ laudatur 62	
Galanga quid 43	
Galbanum 78	H
Gal. docet, Aegypto a-	
quam Nili turbidam	H Elleborus albus
uasit figulinis crudis co-	qualis 41
lari 234	Helleborus niger 42
Gallus ad ius purgato-	Hematites 92
rium 96	Hermodactylus qualis
Gallinacius quando bo-	probetur 44
ni sit succi 116	Herbarum delectus 47
Gelatina quæ fiat 205	Herbarum plurimæ ui-
Gentiana 43	rides in usum recipiuntur ibidem
Glandulæ mammarum	
quando meliores 114	Herbæ quando legende 48
Glycyrrhiza 43	
Glycyrrhiza parū diu coquenda 218	Herbæ quæ nec florem nec semen edunt quando colligendæ ibidem
Glycyrrhizæ succus o-	Her

INDEX.

Herbæ nūc uirides nūc sicca teruntur	121	Infundimus medica- menta quare ibidem
Herbæ antè secandæ aut frangendæ, quam terendæ	ibidem	Infunduntur potissi- mum hodie purgan- tia medicamenta ibi- dem
Herbarum radices quæ siccentur	178	Et humor cui insun- duntur maximè ua- rius est
Herbæ quot annis sunt mutandæ	247	ibidem
Herbæ ad syrupos pro- priæ	309	Infusio purgantium me- dicamentorum diuer- simoda
Hepar ficatum	116	183 & inde ad longum
Hirci præparatio ad calculos comminuen- dos	115	Ignis alimenta coctio- ne sint sicca & odora
Hiera picra Galeni	355	210
Hypocistis qualis	75	Iris qualis optima
Hyssopus colligenda Me- sue quando	52	44 Iuiuba 62 Iulepus rosatus 308 Iulepus uiolatus ibi- dem
I		Iulepus clarus & pur- gatus sacchari uice præstantissimum est in Syrup. 312
Infusio humecta- tioni proxima	181	Italicas plantas, & cre- ticas ad thiriacam & ali
Infusionis tempus ua- rium	182	

INDEX.

alia medicamēta prae Et post ad longum
ponit Galenus. 32 Leue quid 13

L Lentum quid in solidis
corporibus 14

Lentum quid in hu-
midis corporibus ibi-
dem

L Achrymæ mul-
tū siccatae frian-
do per se, aut cum a-
lijs excepta, pulueran-
tur 130

Lac uacca, caprae &
asinae 73

Ladanum quale proba-
tur 75

Lapis iudaicus 92

Lapides pretiosi facili-
cius puluerantur su-
per lapidem 144

Lauatio purgationis
species 276

Lauantur quæ, quæ
promptè liquantur
277

Et multarum medi-
camentorum laua-
tio diuersa ibidem

Lignorum tritura 131

Ligna quantum radi-
ces teri postulant ibi-
dem

Lignum Gaiaci 67

Agallochum ibidem

Liguisticum unde lau-
datur 55

Lignorum delectus 67

Liquatio quid 172

& quæ modico, &
quæ multo calore li-
quantur ibidem

Liquationis necessitas
magna est 173

Liquidis medicamen-
tis uasa, quæ conue-
niant 31

Liquores solum colo-
pur

INDEX.

purgantur post dissolutionem	226	Eorum differentie & usus	ibidem
Liquorum delectus	75	Mammellarum glandulae	
Liquores, qui in emplastris recipiuntur		quando meliores	114
396, 397, 398, 399, & 400		Malum punicum	63
Liquores & gummi semper in fine emplastris misceantur	402	Malaxare quid vulgo significet	171
Lycium faciendi modus	198	Mastiche laudatissima quae	79
Lythargiros oxaleo nutritur	90	Deterior	ibidem
Lythargiri usus in emplastris duplex	406	Medicamenta quaedam quomodo excipiantur seu ut vulgo incorporantur	238
Lythargiros.	86	Medicamenta reponenda quantum opus est sint sicca oportet	244

M

M Acis quomodo
esse debeat
70

Magnes 92

Maiores nostris tribus

ust colis 231

Eorum differentiæ
usus ibidem

Mammarum glandulae
quando meliores II 4

Malum punicum 63

Malaxare quid uulgo
significet 171

Mastiche laudatissima
quæ 79

Deterior ibidem

Medicamēta quedam
quomodo excipiantur

seu ut uirgo incorpo-
ramur 238

Medicamenta reponen
da quantum opus est

sint sicca oportet 244
Medicamentorum ua-

ria repositio ibidem
 G 245 G 246

Medicamenta simplicia
quare et quibus rebus

humectentur 180
Medicamenta compo-

Medicamenta quedā

940

INDEX.

- quomodo confricen-
tur 193 194 &
195
Medicamenta compo-
ta hodie uariè nobis
seruantur 249
Medicamenta proban-
tur sapore 3. & sapo-
rum nomina ibidem
Medicamentorum sim-
plicium delectus sumen-
dus à situ, & loco, &
regione 7
Medicamentorum sim-
plicium delectus unde
sumendus 12
Medicamenta præpa-
rare quid 112
Medicamentorum sim-
plicium tritura 117
Ut teruntur ibidem
Medicamentorum te-
rendorum diuersi mo-
di 119
Medicamenta, que ab
duritiem, crassitiem,
lentorem, densitatem
aggrè separantur sunt
ualenter tundenda
ibidem
Medicamenta per se te-
renda que 135
Medicamenta quædam
tam sunt friabilia ut
etiam digitis attrita
leuigentur 146
Quædam multū diu-
que terenda sunt ibi-
dem
Medicamentorum sim-
plicium nomina 99
inde ad longum
Medulla 94
Mel sit uernū aut æsti-
uū non hybernū 72
Mel ab Anacardis ex-
trahi potest 202
Mel aqua dupla despu-
matur si alius humor
non exprimitur 224
Mel sæpè per se expu-
matur 225
Mellis optimi notæ 72
Metallica aëre cali-

INDEX.

do non igne nutriun-	Myrobalanorum præ-
tur 190	paratio secundum Me-
Metallica saepe humo-	suen 189
re aliquo nutriuntur	Myrrha quid, qualis
ibidem	bona, & qualis pesti-
Metallica feliciter pul-	ma 82
uerantur super lapi-	Myrobalanos multum
dem 144	tenuiter conteri iubet
Metallicorum & ter-	Mesues 125
reorum tritura 132	Myrobalani citrine
Metallica & lapides	57
ubilibet probe seruan-	Inde 58
tur si sordem & pulue-	Capule ibidem
rem uitabis 248	Emblice ibidem
Metallicorum & ter-	Bellerice ibidem
reorum delectus 86	Myrti bacce 63
Mineralia per se fe-	Myxæ descriptio. ibid.
re & seorsum terun-	
tur 155	N
Misy 88	
Mollitio solutioni & li-	N Ardi spicæ fa-
quationi proxima 170	culias & de-
Moschus 95	scriptio 45
Muccago ex gummis	Nimpheam colligen-
frequenter extrahi-	di tempus & quæ ser-
tur 204	uanda 52
Mumia Serapionis ibi.	Nitrum 90
	Nut

INDEX.

Nutritio infusionis spe	dem	
cies.	188	Oleum ouorum 380
		Oleum iuniperi ibi-
O		dem
		Olea ex animalibus fa-
O Cra	92	cienda uiua ipsa ani-
Odore proban-		malia recipiunt 381
tur medicamenta &		Oleum rosatum ibi-
odorum nomina	3	dem
Oesypus	95	Oleum melinum 382
Officium pharmaco-		Oleum mastichinum
pæi	8	ibidem
Olei boni præcipua si-		Oleum myrtinum ibi-
gna	71	dem
Oleum uirgo præstan-		Oleum nardinum 383
tissimum	ibidem	Oleum costinum ibi-
Oleum omphacinum		dem
ibidem		Oleum rutaceum ibi-
Oleum lauando minus		dem
est uerberandum	278	Oleum Euphorbij ibi-
Oleorum genera qua-		dem
tuor	378	Oleum castorij Nico-
Oleum amygdalarum		lai 384
dulcium & amara		Oleum uulpinum Me-
rum	379	sue ibidem
Oleum laurinum ibi-		Oleum lumbricorum

**

I N D E X.

<i>ibidem</i>	Oximellis simplicis cō-
Oleum hyeme largius	positio 326
miscetur emplastris	Oximel Scillinum ibi-
quam æstate 409	dem
Oliue balmades, seu co-	Oxi saccharum. 327
lymbades præstantio-	
res 64	P
Opiantes & rha & ri-	
bes quando leguntur	P Artium animalium
<i>ibidem</i>	tritura 133
Opium quale lauda-	Partium ab animali-
tur 76	bus sumptarum dele-
Opium cum alijs siccio-	ctus 93
ribus particulatim in-	Pharmacopæo non li-
iectum comminuitur	cet uti quid pro quo
129	(dicto) absque medici
Et cum humidioribus	consilio 109
dissolvitur <i>ibidem</i>	Pilularum tractatio
Opobalsanum 76	362
Opopanax optimus ibi-	Quare fuerunt inuen-
dem	te <i>ibidem</i> & 363
Et qualis improba-	Pilule auree Nicolai
tur 77	366
Opos quid 75	Pilule coccie rasis &
Optima Aloë 74	Mesue 367
Opus cyreniacus 78	Pilule sine quibus esse
	nol

INDEX.

De hac re opiniones	Diu coqui oportet
diuerſe ibidem	217 & 218
Quæ citius & quæ	Rha barbarum cum
tardius legantur ibi-	amigdalis facilius te-
dem	ritur 139
Radices quæ longius	Rha barbarum curio-
ſeruantur 35	ſe terendum 152
Radices quæ diu non	Rha pontici notæ 45
ſeruantur ibidem	Rha indicum ibidem
Radices exoticæ ut de-	Rosæ ut teruntur 123
ligentur 37	Rosæ præſantiſſimæ
Radicum Behen opti-	quæ 52
mæ notæ 39	& ubi ſiccandæ ibidē
Radix Bryoniæ 40	Rosarum quas præſe-
Raphanum ut facimus	rat Meſues 53
purgatricem 113	Rosæ quæ parum diu
Rarum quid 13	ſeruantur ibidem
Refrigeramus omnia	Rosas ſiccandi modus
calore preparata pri	177
uſquā reponamus 176	Et in umbra ſiccare
Repoſitio medicamen-	eſſet optatius ibidem.
torum 243	
Reſinarum delectus 79	
Rha barbarum & my-	
robalanos quando eſt	
conſilium aſtringere	

S

Saccharū quale præ
ſantiſſimum 73

** 3

INDEX.

Sagapenum	78	Scammonium unde de-	
Sal fossitius seu sal gem-		feratur & quale bo-	
ma	91	num	79
Sal armeniacus ibi-		Schœnanthum ex Ara-	
dem		bia rarissimè ad nos	
Sandaracha arsenico		defertur	53
affinis	86	Scilla bona qualis	46
Sanguis hirci	93	Scilla ut siccet	176
Sanguis draconis ibi-		Scillæ succus optimè ex	
dem		trahitur diebus qua-	
Santalum citrinum in-		draginta caniculari-	
uentu rarum	69	bus	199
Santalum album pesti-		Scoria quid	87
mum ibidem		Semina matura deli-	
Santalum rubrum me-		gantur	54
dium bonitate ibi-		Semina diu reposita ui-	
dem		res habent imbecillio-	
Saparum & syrupo-		res	55
rum sectio secunda		Semina propè uniuersa	
307		medio inter radi-	
Sapa quæ nobis para-		ces & herbas puluera-	
tur	308	ri desiderant	124
Sarcocolla lacte mulie-		Seminum multarum no-	
bri nutritur	188	mina ibidem	
Scammonium exactè te-		Semina terendi modi di-	
rendum	148	uersi	125
		Sem	

INDEX.

Semina syruporū com-	rum, in genere pro-
positioni decētia 309	pinquo sumitur ali-
Succi 310	quando 22
Semina purgantur cor-	Aliquando in genere
tice 272	diuerso ibidem
Semina utilius & in-	Spuma nitri 90
nocentius ubi seruan-	Squamma aeris qualis
tur 30	laudatur 87
Sennæ folliculo præci-	Stæchas exotica est ex
pue utimur & quē esse	Creta melior 53
debeat 65	Stæchas citria quid
Synapi alexandrinum	Dioscoridi, & quid
55	Galeno uocetur 54
Sericum crudum, inci-	Et ubi præstantissima
sum facile teritur	nascatur ibidem
139	Stercus pueri ad angi-
Serum lactis 94	nam idoneum 116
Seseli Masiliense, Aethi-	Stomachica crassius, te
opicum creticum	renda 153
Diosco. laudatur 55	Styrax 83
Siccatio quid 176	Quomodo adultera-
Sigillatio interpretapa-	tur 84
rationis differētijs nu-	Succi constantes & cor
meranda est 241	pulenti recentes in
Similitudo & dissimi-	emplastra ueniunt
litudo medicamento-	396

** 4

INDEX.

Succi sicciiores ut ra- rius sic liquores, Gum mi, resine, metallica, frequentissime in em plastra recipiuntur ibidem	Eius note 90 Syruporum materia o- mnis est à plantis 308 Syrupi quo in uase co- quantur 313 Syrupi ad iustam cras- sitiem coquuntur ibi- dem
Succinum quid 84 Succorum & aliarum plantæ partium tritu- ra 127	Syruporum composi- tio 315 Syrupi coquuntur in quo uis uase 319 Syrupus rosatus quæ pa- ratur 320 Syrupus uiolatus ibi- dem
Succorum extractio tri- tura & expressione constat 196	Syrupus ex cidonijs ibi- dem Syrupus de granatis 321
Succus ex omnibus fe- rè folijs uirentibus per se tritis exprimi potest 196	Syrupos compositos fa- ciendi modus 322 Syrupus saporis de po- mis ibidem
Suffitus quibus conse- rat 270	Syrupus portulacæ ibi- dem
Sulfur uiuum est opti- mum 89	

Syr

INDEX.

Syrupus Adiantinus Nicolao florentino.
ibidem 335

Syrupus Ziziphorum
323

Syrupus papaveris ibi-
dem

Syrupus acetatus 324

Syrupus acetatus cum
radicibus 325

Syrupus Bizātinus ibi-
dem

Syrup. de quinque radi-
cibus ibidem

Syrup. Absynthij 327

Syrup. menthe 328

Syrupus Epithymi 329

Syrup. stæchados 330

Syrupus Glycyrrhizæ
ibidem

Syrup. Hyssopi 331

Syrupus prassij 332

Syrupus intybi ibidem

Syrup. arthemisie 333

Syrup. Cichorij ex Gu-
lielmo placētino 334

Syrupus Cichorij ex

T

T Amaricis cor-
tex unde esse
debeat 70

Tempus in medicamen-
to deligendo multi-
plex obseruandum est.
28

Tenue quid 13

Terreorū delectus 86

Terebinthina resina
79

Hodie unde adueha-
tur ibidem

Terendi modi 117 &
118

Thlassi 55

Thamar indi 64

Thuris cortex 71

Thus quid 85

Thuris manna ibi-
dem

** 5

INDEX.

Tragacantha ibidem	lata	377
Thus persæpe miscetur emplastris 401	Trocischi de Succino Mesuæ ibidem	
Thymelææ folia ace- to nutriuntur 190	Turbith qualis laude- tur arabibus. 46	
Trociscus quid & cur hoc nomine appella- tus abundè in sectio- ne. 7. Mesuæ dictum 374	V	
Trocischi de Gallia mo- schata Mesuæ ibidè	V Ipere quando ca- piende 115	
Trocischi de Gallia mo- schata Nicolai Ale- xandri 375	Vnguis odoratus 96	
Trocischi aliptæ mo- schatæ ibidem	Vniones seu margari- tæ describuntur 97	
Trocischi aliptæ mo- schatæ Nicolai ibid.	Vuarum passarum quæ præstantiores 66	
Trocischi de Myrrha Nicol. 376	Et damascenarû quæ eligendæ ibidem	
Trocischi de agarico Mesuæ ibidem	Corinthiæ ibidem	
Trocischi de spodio ibi- dem	Vrendi modus non est omnibus unus 259	
Trocischi de terra sigil	Vrendi modi diuersi 260 & 261 & inde ad longum	
	Vstio assationis finitima 257	
	Vstionis causæ multæ 258	

INDEX.

- 258 & 259
Vnguentum unde dictum 384
Vnguentorum materiae quae 385
Vngueta quomodo fiunt ibi.
Vnguentum aureum Mesuae 386
Vnguentum pompholygos ibidem
Vnguentum basilicum 387
Vnguentum egyptiacum Mesuae ibidem
Vnguentum album rasis ibidem
Vnguentum desiccativum 388
Vnguentum enulatum ibidem
Vnguentum populeum 389
Vnguentum triphar-
- macum Mesuae ibidem
Vnguentum apostolorum & unde dictum. 390
- X**
- X**ylbalsamum recens probatur 69
Xu & quid significet. 196
- Z**
- Z**edoaria radix cuius emula 47
Zingiberis radice nota 46
Zingiber quale dantur. ibidem
- F I N I S.**

Lugduni,
EXCVDEBANT
PHILIBERTVS ROLLETVS,
ET BARTHOLOMAEVS
FRAENVS,
IMPENSIS HONESTISS^{IM}
SIMORVM VIRORVM
GVILIELMI ROVIL-
LII, ET ANTONII
CONSTAN-
TINI.



ni,
BANT
COLLITV
ORASTI
VESTI
ORVM
VIT
ENI

